

外科护理学

题号	预测题干	预测答案	星级
1	长期禁食，出现肌无力，心电图出现 U 波，怀疑发生低血钾，补钾液？	见尿补钾，尿量>40ml/L 浓度不宜过高<0.3% 不能静推	☆☆☆
2	各型休克的共同病理生理基础	有效循环血量锐减/组织灌注不足	☆☆☆
3	中心静脉压（CVP）正常值	5-12cmH ₂ O	☆☆
4	胰头癌最典型的临床表现	进行性加重的黄疸	☆☆☆
5	急性胰腺炎最常见的病因	胆道疾病	☆☆☆
6	对缺氧最敏感，常最先受损的是	脑，5-6 分钟发生不可逆脑死亡	☆☆
7	早期肝癌首选治疗方法	手术	☆☆☆
8	结肠癌最早出现的临床症状	排便习惯和粪便性状的改变	☆☆☆
9	最常见的先天性心脏畸形	室间隔缺损	☆☆☆
10	休克监测最常用及最简便的监测方法	尿量	☆☆☆
11	各型肺癌中预后最差	小细胞癌(未分化小细胞癌)	☆☆☆
12	小儿+哭闹+果酱样便	肠套叠	☆☆☆
13	蜘蛛痣常见于？	肝硬化	☆☆☆
14	镜下血尿	每高倍视野中平均见到 3 个红细胞	☆☆
15	镜下脓尿	每高倍视野中超过 5 个白细胞	☆☆
16	无形失水	皮肤蒸发和呼吸时失水，每日约 850ml，其中呼吸 350ml，皮肤蒸发 500ml	☆☆
17	细胞外液最主要的阳离子	细胞外液最主要的阳离子 Na ⁺	☆☆☆
18	细胞内液最主要的阳离子	细胞内液最主要的阳离子 K ⁺	☆☆☆
19	高钾血症病人应用钙剂的作用	对抗钾对心肌的抑制作用	☆☆☆

20	外科最常见脱水	等渗性脱水，缺水、缺钠同时存在，大量补液时首选平衡盐溶液	☆☆☆
21	幽门梗阻导致的电解质紊乱	低钾低氯碱中毒	☆☆☆
22	高钾血症典型心电图表现	T 波高尖	☆☆☆
23	高血钾抢救	透析疗法	☆☆☆
24	挤压伤	肾性肾衰最常见原因是挤压伤，因肌红蛋白大量释放引起肾小管阻塞、坏死	☆☆☆
25	DIC 病人最早的临床表现	取血时血液不易抽出，血易凝固	☆☆☆
26	甲状腺功能亢进病人术后常出现声音嘶哑，原因？	一侧喉返神经损伤，两侧喉返神经损伤导致失声、呼吸困难甚至窒息	☆☆☆
27	甲状腺大部切除术后病人出现声调降低？	术中损伤喉上神经外支，喉上神经内支损伤引起饮水呛咳	☆☆☆
28	甲状腺大部切除术后病人出现手足抽搐？	由于术中损伤了甲状旁腺	☆☆☆
29	甲状腺危象发生原因	术前准备不充分，甲亢症状没有很好控制	☆☆☆
30	急性乳腺炎主要病因	乳汁淤积和细菌入侵	☆☆☆
31	乳腺癌早期表现	患侧乳房出现无痛性、单发性小肿块	☆☆☆
32	乳腺癌患者患侧乳房皮肤出现“酒窝征”原因	癌肿侵犯 Cooper 韧带	☆☆☆
33	乳腺癌患者患侧乳房皮肤出现“橘皮样”改变的原因	癌细胞堵塞皮下淋巴管引起淋巴回流障碍	☆☆☆
34	乳腺癌淋巴转移常见部位	患侧腋窝淋巴结	☆☆
35	腹膜刺激征	腹部压痛、反跳痛和腹肌紧张	☆☆
36	消化性溃疡好发部位	胃溃疡好发于胃小弯，十二指肠好发于十二指肠球部	☆☆☆
37	降颅压最有效药物	20%甘露醇 250ml，15~30 分钟内快速静脉滴注	☆☆☆
38	颅前窝骨折	表现为眼睑青紫，眼结膜下出血，称“熊猫眼”	☆☆☆
39	硬脑膜外血肿典型的意识障碍	伤后出现“中间清醒期”	☆☆☆
40	脾破裂	引起低血容量性休克	☆☆☆