

大小便失禁，护士查房没有查看，第二天接班护士发现压疮，是什么责任

“后天之本”指的是

- A 肝
- B 心
- C 脾
- D 肺
- E 肾
- C

呼吸衰竭发生时，最早因缺氧损害的组织器官是

- A 大脑
- B 心脏
- C 肝脏
- D 脾脏
- E 肺脏
- A

重度脱水患儿第一天的静脉补液量是

- A.90~120ml/kg
- B.120~150ml/kg
- C.150~180ml/kg
- D.200~250ml/kg
- E.<50ml/kg
- C

墨菲征阳性多见于

- A.急性胆囊炎
- B.急性胰腺炎
- C.胃十二指肠溃疡穿孔
- D.胆总管结石
- E.胆道蛔虫
- A

患儿，男，3岁，因进食花生时突然剧咳，面色发绀，内镜下取出花生后，护士告诉家长该患儿可以进食的时间是

- A.24h 后
- B.即刻
- C.12h 后
- D.1h 后
- E.4h 后
- E

容易引起急性肾衰竭的损伤是

- A.严重挤压伤

- B.广泛擦伤
- c.严重撕裂伤
- D.多处刺伤
- E.冻伤

A

三尖瓣的解剖位置在

- A.左心室和主动脉之间
- B.右心室和肺动脉之间
- c.左心房和左心室之间
- D.右心房和右心室之间
- E.主动脉和肺动脉之间

D

患者，男性，45岁，风湿性心脏病伴心功能不全，双下肢及身体下垂部位严重水肿，该患者每日饮食中应控制

- A.摄入盐量不超过 0.5g
- B.摄入盐量不超过 2g
- c.摄入钠量不超过 0.5g
- D.摄入钠量不超过 2g
- E.摄入盐量不超过 4g

C

下列区域属于半污染区的是

- A.浴室
- B.值班室
- c.医护办公室
- D.配餐室
- E.病房

C

与消化性溃疡发生关系密切的细菌是

- A.链球菌
- B.霍乱弧菌
- C.幽门螺杆菌
- D.痢疾杆菌
- E.大肠杆菌

C

细菌性肺炎最常见的病原菌是

- A.克需伯杆菌
- B.铜绿假单胞菌
- c.大肠杆菌
- D.肺炎链球菌
- E.葡萄球菌

D

尸僵一般在死后几小时开始出现

- A.1~3 小时

- B.4~6 小时
- C.12~16 小时
- D.24 小时
- E.24~48 小时
- A

2.呼吸衰竭发生时，最早因缺氧损害的组织器官是:A

- A 大脑
- B 心脏
- c 肝脏
- D 脾脏
- E 肺脏

3.重度脱水患儿第一天的静脉补液量是:C

- A.90~120ml/kg
- B.120~150mk/kg
- C.150~180ml/kg
- D.200~250ml/kg
- E<50ml/kg

4.墨菲征阳性多见于:A

- A.急性胆囊炎
- B.急性胰腺炎
- C.胃十二指肠溃疡穿孔
- D.胆总管结石
- E.胆道蛔虫

5.患儿，男，3岁，因进食花生时突然剧咳，面色发绀，内镜下取出花生后，护士告诉家长该患儿可以进食的时间是：E

- A.24h 后
- B.即刻
- C.12h 后
- D.1h 后
- E.4h 后

6.容易引起急性肾衰竭的损伤是：A

- A.严重挤压伤
- B.广泛擦伤
- c.严重撕裂伤
- D.多处刺伤
- E.冻伤

7.三尖瓣的解剖位置在：D

- A.左心室和主动脉之间

- B.右心室和肺动脉之间
- c.左心房和左心室之间
- D.右心房和右心室之间
- E.主动脉和肺动脉之间

8.患者，男性，45岁，风湿性心脏病伴心功能不全，双下肢及身体下垂部位严重水肿，该患者每日饮食中应控制：C

- A.摄入盐量不超过 0.5g
- B.摄入盐量不超过 2g
- c.摄入钠量不超过 0.5g
- D.摄入钠量不超过 2g
- E.摄入盐量不超过 4g

9.下列区域属于半污染区的是:C

- A.浴室
- B.值班室
- C.医护办公室
- D.配餐室
- E.病房

10.与消化性溃疡发生关系密切的细菌是：C

- A.链球菌
- B.霍乱弧菌
- C.幽门螺杆菌
- D.翔疾杆菌
- E.大肠杆菌

11.细菌性肺炎最常见的病原菌是:D

- A.克雷伯杆菌
- B.铜绿假单胞菌
- c.大肠杆菌
- D.肺炎链球菌
- E.葡萄球菌

12.尸僵一般在死后几小时开始出现:A

- A.1~3 小时
- B.4~6 小时
- C.12~16 小时
- D.24 小时
- E.24~48 小时