

中医执业医师资格考试
考前全真模拟试卷（二）
（医学综合笔试部分）

报考类别：中医执业医师

第一单元考试日期：2021 年 8 月

考试时间：9：00—11：00 考生姓名：

准考证号：

考场号：

A1 型题答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。1.除下列哪一项外，均是《素问·上古天真论》指出的养生的重要原则

- A.法于阴阳
- B.和于术数
- C.起居有节
- D.延年益寿
- E.食饮有节

2.《素问·经脉别论》“府精神明，留于四藏”之“四藏”是指

- A.心肺肝脾
- B.心肺肝肾
- C.心肝脾肾
- D.心肺脾肾
- E.脾肺肝肾

3.据《灵枢·本神》，心有所忆谓之

- A.意
- B.心
- C.志
- D.思
- E.虑

4.《灵枢·决气》指出“一气化六气”，此“一气”指的是

- A.肾气
- B.营气
- C.卫气

D.水谷精微之气

E.元气

5.葛根黄芩黄连汤证的病机是

A.热盛于内，邪热下迫大肠

B.重在表证未解，外邪内迫肠道而下利

C.太阳少阳合病

D.大肠滑脱不禁

E.以上都不是

6.旋覆代赭汤证的主证是

A.腹中痛，心下痞硬，欲呕吐，肠鸣下利

B.心下痞硬而满，呕吐，干噎食臭，腹中雷鸣，下利

C.心下痞硬，噎气不除

D.心下痞，噎气不除，呕吐痰涎，头眩，脉弦紧

E.心下痞硬，干呕心烦不得安，谷不化，腹中雷鸣，下利

7.太阳病，关节疼痛而烦，脉沉而细，此名

A.湿痹

B.寒痹

C.风痹

D.热痹

E.风寒痹

8.瓜蒌薤白白酒汤证的病机是

A.痰涎壅盛，胸中痹阻

B.胸阳不振，痰饮上乘

C.饮邪上乘，胸中气滞

D.寒饮内停，逆而上冲

E.中阳不足，寒凝气滞

9.治疗产后三病时应注意

A.固护阳气

B.调补脾肾

C.固护津液

D.祛除瘀血

E.固护胃气

10.叶天士认为，温热夹痰湿之邪留滞三焦，治宜

A.辛凉散风

B.甘渗祛湿

C.透风于热外

D.渗湿于热下

E.分消走泄

11.中医学理论体系的确立标志为

A.《五十二病方》《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》

B.《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》

C.《五十二病方》《黄帝内经》《难经》《神农本草经》

D.《五十二病方》《黄帝内经》《伤寒杂病论》《神农本草经》

E.《五十二病方》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》

12.人体自身的整体性主要体现在

- A.脏腑一体和形神一体
- B.心脑一体和五脏一体
- C.五脏一体和形神一体
- D.脏腑一体和心脑一体
- E.五脏一体和经络一体

13.采取同病异治方法的原因是

- A.疾病相同
- B.症状不同
- C.阶段相同
- D.证候不同
- E.体征不同

14.气的概念源于

- A.阴阳说
- B.水地说
- C.五行说
- D.云气说
- E.元气说

15.“热者寒之”治则，所体现的阴阳关系是

- A.阴阳交感
- B.阴阳互根
- C.阴阳对立
- D.阴阳消长
- E.阴阳转化

16.脉象分阴阳，属于阴的脉象是

- A.浮
- B.大
- C.迟
- D.滑
- E.洪

17.“阴病治阳”的病理基础是

- A.阴虚
- B.阳虚
- C.阴盛
- D.阳盛
- E.阴阳两虚

18“壮水之主，以制阳光”体现的治则是

- A.阴病治阳
- B.阳病治阴
- C.热者寒之
- D.寒者热之
- E.阳中求阴

19.属于阳的药物性能是

- A.升、降

- B.辛、苦
- C.寒、温
- D.浮、沉
- E.温、热

20.藏象学说的主要思维方法是

- A.逻辑
- B.辨证
- C.演绎
- D.反证
- E.以象定脏

21.与精神意识思维活动关系最密切的脏是

- A.心
- B.肝
- C.脾
- D.肺
- E.肾

22.具有主通明生理特性的脏是

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

23.称为“娇脏”的是

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

24.具有促进脾胃运化作用的脏是

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

25.主管人体生长发育的脏是

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

26.化生“天癸”的物质基础是

- A.肝血
- B.肾精
- C.脾气

D.肺阴

E.心血

27.气血两虚病变多见的脏腑是

A.心与肺

B.心与肾

C.心与脾

D.脾与胃

E.肺与肝

28.“气之主”指的是

A.肝

B.心

C.脾

D.肺

E.肾

29.肝在体相合的是

A.脉

B.筋

C.骨

D.皮

E.肉

30.与冬气相通应的脏是

A.肝

B.心

C.脾

D.肺

E.肾

31.胃的生理功能是

A.受盛化物

B.传化糟粕

C.主持诸气

D.受纳腐熟

E.通调水道

32.“孤腑”指的是

A.胆

B.胃

C.小肠

D.三焦

E.膀胱

33.“元神之府”指的是

A.脑

B.胆

C.骨

D.髓

E.女子胞

34.与人体生长发育关系最密切的气是

- A.元气
- B.宗气
- C.营气
- D.卫气
- E.脏腑之气

35.治疗大出血时用益气固脱法的理论基础是

- A.气能生血
- B.气能行血
- C.气能摄血
- D.血能载气
- E.血能养气

36.五行中具有“润下”特性的是

- A.木
- B.火
- C.土
- D.金
- E.水

37.五行中，“水”的“子”行是

- A.金
- B.木
- C.土
- D.火
- E.水

38.肺病及脾的五行传变是

- A.母病及子
- B.相乘
- C.子病犯母
- D.相侮
- E.相克

39.五行学说认为病情较重的色脉关系是

- A.色与脉的五行属性相同
- B.色与脉的五行属性相生
- C.客色胜主色
- D.见其色反得其相胜之脉
- E.主色胜客色

40.六淫致病，具有发病急、传变快特点的邪气是

- A.风邪
- B.寒邪
- C.湿邪
- D.燥邪
- E.火邪

41.“见微知著”主要是指

- A.从轻微的表现预测严重的病变

B.从局部的微小变化测知整体情况

C.从隐蔽的症状测知明显的症状

D.从易忽略的体征中求得病情

E.运用特殊诊法诊断出病证

42.病人表现为得神提示的是

A.痰迷心窍，或痰火扰心，精神失常

B.精气充足，体健神旺

C.精气大伤，机能衰减，或邪气亢盛，功能障碍

D.精气不足，机能减退

E.精气衰竭，阴不敛阳，虚阳外越

43.满面通红的临床意义是

A.真寒假热

B.虚阳上越

C.邪热亢盛

D.阴虚火旺

E.阳气暴脱

44.根据《灵枢·五色》的分法，整个面部称为“阙”的部分是

A.鼻

B.耳门

C.眉间

D.颊侧

E.额

45.面黄虚浮，称为

A.黄胖

B.苍黄

C.阳黄

D.阴黄

E.萎黄

46.胃火亢盛可表现为

A.形瘦食少，舌淡苔白

B.卧床不起，骨瘦如柴

C.形瘦颧红，皮肤干焦

D.形瘦能食，舌红苔黄

E.形瘦气短，头晕眼花

47.小儿昏睡露睛的临床意义是

A.肝胆火炽

B.肺经郁热

C.肾精不足

D.心阴亏损

E.脾胃虚衰

48.根据五轮学说，瞳仁属

A.肺

B.心

C.脾

- D.肝
- E.肾

49.下列各项，口闭而难开、牙关紧闭属于

- A.口噤
- B.口僻
- C.口撮
- D.口振
- E.口动

50.下列各项，表现为颈前结喉处有肿物如瘤，可随吞咽移动的是

- A.瘰疬
- B.痰核
- C.瘰癧
- D.发颐
- E.梅核气

51.小儿食指络脉达于气关的临床意义是

- A.邪气入络
- B.邪气入经
- C.病情凶险
- D.邪入脏腑
- E.外感初起

52.面色青黄多见于

- A.肝脾不调
- B.小儿惊风或惊风先兆
- C.寒盛，疼痛
- D.心阳暴脱，心血瘀阻
- E.脾虚湿盛

53.呕吐物秽浊酸臭的临床意义是

- A.邪热犯胃，胃失和降
- B.胃阳不足，难以腐熟水谷
- C.暴饮暴食，宿食不化
- D.肝胆湿热或郁热
- E.胃有积热或胃脘宿有瘀血

54.下列各项，不会导致“但头汗出”的是

- A.中焦湿热上蒸
- B.上焦邪热郁蒸
- C.久病伴随阳泄
- D.病危虚阳上越
- E.阳虚不能固表

55.苔少无津的临床意义是

- A.寒湿证
- B.里热证
- C.表寒证
- D.虚寒证
- E.阴虚证

56.患者舌短缩，色淡白或青紫而湿润的临床意义是

- A.寒凝筋脉
- B.气血俱虚
- C.痰湿内蕴
- D.热盛伤津
- E.动风先兆

57.郑声的临床意义是

- A.心气虚弱
- B.宗气大虚
- C.神气不足
- D.痰扰神明
- E.脏气衰微，心神散乱

58.病人口气酸臭，脘腹胀满的临床意义是

- A.胃肠蕴热
- B.肝胃蕴热
- C.食积胃肠
- D.内有脓疡
- E.口腔不洁

59.寒痰湿浊停聚于肺，肺失肃降时的临床表现是

- A.咳声重浊沉闷
- B.咳声轻清低微
- C.咳声不扬，痰臭色黄，不易咯出
- D.咳有痰声，痰多容易咯出
- E.干咳无痰或少痰

60.小儿夏季长期发热，秋凉自愈的临床意义是

- A.血虚
- B.气虚
- C.阴虚
- D.气血两虚
- E.气阴两虚

61.小便频数，量少，色赤，刺痛的临床意义是

- A.膀胱湿热
- B.肾阳不足
- C.肾气不固
- D.结石阻塞
- E.膀胱失约

62.下列各项，不属于气分证临床表现的是

- A.心烦懊恼
- B.胸闷胸痛
- C.坐卧不安
- D.斑疹隐隐
- E.身热，汗出

63.下列各项，不属于代脉临床意义的是

- A.痛证

B.跌仆损伤

C.虚证

D.惊恐

E.食滞

64.易导致心气弛缓，神气不敛的情志是

A.过恐

B.悲哀

C.过喜

D.受惊

E.过怒

65.大黄的使用注意，下述说法不妥的是

A.妇女月经期慎用

B.妇女哺乳期慎用

C.孕妇便秘忌用

D.孕妇忌用

E.阴疽忌用

66.下列各项，不属温热性能所对应作用的是

A.温里

B.开窍

C.补火

D.温经

E.回阳

67.寒凝血瘀，月经不调，少腹冷痛，应选用药物的性味是

A.辛，凉

B.苦，温

C.辛，温

D.苦，寒

E.咸，寒

68.运用药物的归经理论还须考虑的是

A.药物的用量

B.药物的用法

C.药物的四气五味、升降浮沉

D.药物的采集

E.药物的炮制

69.治疗肺痈咳吐脓血，热毒疮疡，其功效是

A.祛风散寒除湿

B.燥湿健脾

C.清热解毒，排脓

D.回阳，温肺化痰

E.清热利尿通淋

70.药物“七情”的含义指的是

A.喜、怒、忧、思、悲、恐、惊

B.辛、甘、酸、苦、咸、淡、涩

C.相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反、单行

- D.寒、热、温、凉、平、有毒、无毒
- E.升、降、浮、沉

71. “十九畏”中与人参相畏的药物是

- A.密陀僧
- B.五灵脂
- C.狼毒
- D.郁金
- E.甘草

72. 下列各项，用药方法错误的是

- A.旋覆花包煎
- B.生大黄后下
- C.鹤草芽入煎服
- D.阿胶烔化兑服
- E.附子先煎

73. 有“夏月之麻黄”之称的药物是

- A.桂枝
- B.香薷
- C.紫苏
- D.防风
- E.生姜

74. 善于治疗阳明经眉棱骨痛的药物是

- A.连翘
- B.细辛
- C.白芷
- D.蔓荆子
- E.柴胡

75. 具有疏肝解郁行气功效的解表药物是

- A.薄荷
- B.牛蒡子
- C.桑叶
- D.菊花
- E.蔓荆子

76. 具有清实热、退虚热功效的药物是

- A.石膏
- B.知母
- C.黄芩
- D.苦参
- E.栀子

77. 治疗肺热咳嗽，当选用的药物是

- A.栀子
- B.大黄
- C.黄芩
- D.黄连
- E.黄柏

78.前人称为“疮家圣药”的药物是

- A.白芷
- B.连翘
- C.天花粉
- D.红藤
- E.蒲公英

79.均具有清热利湿、退黄疸功效的药物是

- A.猪苓、茯苓
- B.茯苓、薏苡仁
- C.金钱草、石韦
- D.茵陈、滑石
- E.茵陈、金钱草

80.对于血热所致的各种出血兼有瘀滞者，多选用的药物是

- A.三七、白及
- B.蒲黄、茜草
- C.大蓟、小蓟
- D.血余炭、槐花
- E.地榆、大蓟

81.半夏具有的功效是

- A.清热化痰
- B.润肺化痰
- C.降气祛痰
- D.燥湿化痰
- E.温肺化痰

82.治疗中气下陷，食少便溏，短气乏力，面目浮肿，小便不利者，应首选的药物是

- A.白术
- B.黄芪
- C.升麻
- D.党参
- E.山药

83.治疗脘腹或四肢挛急作痛，芍药应配伍的药物是

- A.甘草
- B.大枣
- C.党参
- D.山药
- E.白术

84.补骨脂具有的功效是

- A.明目止泻
- B.祛风除湿
- C.止汗安胎
- D.温脾止泻
- E.润肠通便

85.具有止血、补血功效的药物是

- A.川芎

- B.丹参
- C.鸡血藤
- D.阿胶
- E.茜草

86.下列各项，不属黄精主治病证的是

- A.癆嗽
- B.燥咳
- C.久咳
- D.便溏
- E.消渴

87.乌梅的功效是

- A.涩肠，止遗
- B.止带，止遗
- C.涩肠，生津
- D.涩肠，止带
- E.止带，止血

88.治疗脾肾阳虚，五更泄泻，补骨脂常配伍的药物是

- A.黄连
- B.肉豆蔻
- C.槟榔
- D.莲子
- E.乌梅

89.具有消食健胃、回乳消胀功效的药物是

- A.神曲
- B.山楂
- C.鸡内金
- D.稻芽
- E.麦芽

90.香附、乌药、木香具有的共同功效是

- A.降逆止呃
- B.疏肝解郁
- C.行气止痛
- D.行气导滞
- E.消肿散结

91.枳实的功效是

- A.行气宽中除胀为主
- B.行气消痰除痞为主
- C.燥湿化痰和胃为主
- D.理气和胃降逆为主
- E.行气止痛散结为主

92.治疗肝气郁滞之胁肋作痛，食积不化，应选用的药物是

- A.青皮
- B.陈皮
- C.柴胡

D.川楝子

E.香附

93.治寒疝疼痛，睾丸偏坠疼痛，应选用的药物是

A.肉桂

B.香附

C.小茴香

D.丁香

E.木香

94.卫生法的概念是指

A.国家立法机关颁布的卫生法律

B.国家行政机关颁布的卫生法规

C.国务院卫生行政部门颁布的规章

D.卫生行政部门颁布的技术规范

E.全部上述保障人体健康的法律规范的总和

95.下列哪部法律属于卫生法范畴

A.《中华人民共和国商标法》

B.《中华人民共和国专利法》

C.《中华人民共和国著作权法》

D.《中华人民共和国药品管理法》

E.《中华人民共和国合同法》

96.对违反卫生法律法规施行行政处罚的机关是

A.各级行政监察机关

B.各级党的纪律检查部门

C.各级人民法院

D.各级人民检察院

E.各级卫生行政主管部门

97.由国家特定的专门机关对违法者依其应负的法律所给予的惩罚措施是

A.违法主体

B.责任行为

C.民事行为

D.法律后果

E.法律制裁

98.医师甲经执业医师注册，在某医疗机构执业。一年后，该医师受聘到另一预防机构执业，对其改变执业地点和类别的行为

A.预防机构允许即可

B.无须经过准予注册的卫生行政部门办理变更注册手续

C.应到准予注册的卫生行政部门办理变更注册手续

D.任何组织和个人无权干涉

E.只要其医术高明，就不受限制

99.未经批准擅自开办医疗机构行医应承担的行政责任主要是

A.经济补偿

B.赔礼道歉

C.赔偿责任

D.行政处分

E.行政处罚

100.依据《中华人民共和国药品管理法》规定,合法的药品生产企业必须持有

- A.药品生产许可证、营业执照
- B.药品生产许可证、药品经营许可证
- C.药品生产许可证、制剂许可证
- D.药品经营许可证、制剂许可证
- E.制剂许可证、营业执照

101.药品作为特殊商品,其特殊性之一是具有两重性,而两重性主要体现在

- A.药品质量
- B.用药后果
- C.诊断、治疗
- D.功能主治
- E.针对性

102.下列的乙类传染病中依法采取甲类传染病的预防控制措施的是

- A.病毒性肝炎
- B.伤寒和副伤寒
- C.淋病、梅毒
- D.淋病、艾滋病
- E.肺炭疽、传染性非典型性肺炎

103.县级以上人民政府卫生行政主管部门应当指定机构负责开展突发事件的

- A.医疗救助方案
- B.预防控制体系
- C.应急演练
- D.技能培训
- E.日常监测

A2 型题答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。104.患者,男,25 岁。发热 1 周,前医以“青霉素”肌注后,热不退,伴恶寒,全身疼痛,头痛,无汗,舌淡苔薄白,脉浮紧。临床辨证是

- A.麻黄汤证
- B.桂枝汤证
- C.桂枝麻黄各半汤证
- D.葛根汤证
- E.麻杏石甘汤证

105.患者,症见四肢疼痛较剧,痛有定处,阴寒加重的临床意义是

- A.行痹
- B.热痹
- C.寒痹
- D.着痹
- E.风痹

106.患者,症见恶寒甚,发热不重,鼻塞,舌淡红苔薄白,脉浮紧,其临床意义是

- A.里寒证
- B.表热证
- C.表寒证

D.表里俱寒证

E.半表半里证

107.患者，内热烦躁，继而汗出热解，烦躁减轻，其临床意义是

A.由阳转阴

B.邪退正虚

C.里邪出表

D.邪盛入里

E.邪正相持

108.患者，症见烦躁，胸胁胀闷，头胀头痛，面红目赤，舌红苔黄，脉弦有力的临床意义是

A.怒伤证

B.忧伤证

C.思伤证

D.悲伤证

E.恐伤证

109.患者，泻痢日久，头晕目花，脱肛，气短疲乏，脘腹坠胀的临床意义是

A.气虚证

B.气陷证

C.气脱证

D.气滞证

E.气逆证

110.患者，大出血后出现气短，心悸，冷汗淋漓，四肢厥冷，脉微欲绝的临床意义是

A.气虚失血

B.气血两虚

C.气随血脱

D.气虚下陷

E.阴虚阳亢

111.患者，症见胸胁饱满，胀痛，随呼吸、咳嗽、转身而疼痛加剧者的临床意义是

A.饮停胸胁

B.饮停于胃

C.饮停于肠

D.水饮凌心

E.痰湿阻肺

112.患者，症见心悸怔忡，心胸憋闷刺痛，脉涩的临床意义是

A.瘀阻心脉证

B.痰阻心脉证

C.寒凝心脉证

D.气滞心脉证

E.心气虚证

113.患者，男，55岁。体胖，患“高血压”6年余，近2天来，自觉心前区闷痛，时感心悸，短气，舌淡苔白腻，脉沉弦的临床意义是

A.心脉痹阻证

B.痰迷心窍证

C.痰火扰心证

D.痰阻心脉证

E.瘀阻心脉证

114.患者，男，65岁。眩晕，耳鸣如蝉，健忘失眠，胁痛，腰膝酸痛，盗汗，舌红少苔，脉细数的临床意义是

A.肾精不足

B.肾阴虚

C.肝阴虚

D.肝肾阴虚

E.肝阳上亢 B1 型题答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中间选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。(115~116题共用选项)

A.饮停胸胁

B.饮停胸膈

C.饮停胃肠

D.饮停四肢肌肤

E.饮停膀胱

115.四饮中，溢饮的病机是

116.四饮中，支饮的病机是

(117~118题共用选项)

A.脾胃虚寒

B.水饮属寒，水停心下

C.水饮内停，气不化津，津不上承

D.服汤温解后，寒饮将去，津液暂未上承

E.因无汗，热不得外越，化燥伤津

117.原文“伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，或渴…小青龙汤主之”，其中“渴”的机理是

118.原文“伤寒，心下有水气者，咳而微喘，发热不渴…小青龙汤主之”，其中“不渴”的机理是

(119~120题共用选项)

A.脑

B.肝

C.心

D.五脏

E.经络

119.有机整体的“中心”是

120.有机整体的“五脏六腑之大主”是

(121~122题共用选项)

A.阳中之阴

B.阳中之阳

C.阴中之阴

D.阴中之阳

E.阴中之至阴

121.下午被称为

122.后半夜被称为

(123~124 题共用选项)

- A.酸
- B.苦
- C.甘
- D.辛
- E.咸

123.属于“水”的五味是

124.属于“木”的五味是

(125~126 题共用选项)

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

125.“君主之官”指的脏是

126.“相傅之官”指的脏是

(127~128 题共用选项)

- A.手指端
- B.足趾端
- C.头面部
- D.胸部内脏
- E.腹部内脏

127.手三阴经与足三阴经交接的部位是

128.足三阳经与足三阴经交接的部位是

(129~130 题共用选项)

- A.形体羸瘦，精神萎靡
- B.神识清醒，颧赤如妆
- C.神昏谵语，循衣摸床
- D.精神不振，倦怠乏力
- E.神志清楚，两目精彩

129.邪盛神乱的表现是

130.少神的表现是

(131~132 题共用选项)

- A.咳声低微
- B.干咳少痰
- C.咳声不扬
- D.咳如犬吠
- E.咳声紧闷

131.白喉病人咳嗽的特点是

132.热邪犯肺病人咳嗽的特点是

(133~134 题共用选项)

- A.太阳病证
- B.阳明经证
- C.阳明腑证

D.少阳病证

E.少阴病证

133.恶寒，头痛项强，脉浮，证属

134.寒热往来，胸胁苦满，脉弦，证属

(135～136 题共用选项)

A.风淫证

B.暑淫证

C.寒淫证

D.湿淫证

E.燥淫证

135.脘腹痞胀，口淡不渴，肠鸣腹泻，苔白滑，脉沉细的临床意义是

136.脘腹痞胀，纳呆呕恶，渴不多饮，便溏不爽，苔黄腻，脉滑数的临床意义是

(137～138 题共用选项)

A.腹中结块，按之聚散不定，或形如筋状久按转移不定

B.腹中肿块，推之不移，痛有定处

C.腹内肿块坚硬如石

D.腹中肿块，推之可移，痛无定处

E.右少腹痛而拒按，有包块应手

137.瘕聚的临床表现是

138.虫积的临床表现是

(139～140 题共用选项)

A.发散

B.缓急

C.收敛

D.泄降

E.软坚

139.辛味的作用是

140.咸味的作用是

(142～141 题共用选项)

A.武火急煎

B.文火久煎

C.武火久煎

D.文火略煎

E.不宜久煎

141.滋补药的煎法是

142.矿石贝壳药的煎法是

(144～143 题共用选项)

A.相使

B.相畏

C.相杀

D.相恶

E.相反

143.一种药物的功效能够被另一种药物减弱或消除，其配伍关系是

144.两种药物合用，能够产生毒性反应或副作用，其配伍关系是

(145~146 题共用选项)

- A.清利头目
- B.息风止痉
- C.解毒透疹
- D.清肝明目
- E.疏肝解郁

145.桑叶具有的功效是

146.薄荷具有的功效是

(147~148 题共用选项)

- A.龟甲
- B.龙骨
- C.鳖甲
- D.牡蛎
- E.赭石

147.具有潜阳补阴、软坚散结、收敛固涩功效的药物是

148.具有滋阴潜阳、软坚散结功效，善治阴虚风动的药物是

(149~150 题共用选项)

- A.劣药
- B.假药
- C.残次药品
- D.仿制药品
- E.特殊管理的药品

149.医疗机构未取得医疗机构制剂许可证,配制的制剂品是

150.精神药品是国家实行参考答案

12345678910DCADACABCE11121314151617181920BCDDCCBBEE21222324252627282930ABDA
EBCDBE31323334353637383940DDAACEBCDA41424344454647484950BBCCADEEAA515253545
55657585960BAAEEAECAE61626364656667686970ADECCBCCCC71727374757677787980BCBCA
BCBEB81828384858687888990DBADDDCBEC919293949596979899100AACEDDECEA1011021031
04105106107108109110BEEACCCABC111112113114115116117118119120AADDDBCBCD121122
123124125126127128129130ADEABDDBCD131132133134135136137138139140DCADCDDAAE1
41142143144145146147148149150BBDEDA DCBE140-2 试卷标码: 1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中医执业医师资格考试

考前全真模拟试卷(二)

(医学综合笔试部分)

报考类别: 中医执业医师

第二单元考试日期: 2021 年 8 月

考试时间: 14:00—16:00 考生姓名:

准考证号:

考场号:

考前点睛课考前全真模拟解密

金英杰医学教育研究院编

第二单元全国免费热线：400-900-9392 网址：www.jinyingjie.com 中医执业医师资格考试考前全真模拟试卷（二）全国免费热线：400-900-9392 网址：www.jinyingjie.com 第二单元

A1 型题答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。1. “见肝之病，知肝传脾，当先实脾”，这是以下哪个层次的医生的认识

- A. 圣人
- B. 上工
- C. 中工
- D. 下工
- E. 庸工

2. 百合病的病位在

- A. 心
- B. 胸膈
- C. 心肺
- D. 心肾
- E. 肺肾

3. 血痹的主要症状是

- A. 关节疼痛
- B. 肢体局部麻木不仁
- C. 半身不遂
- D. 肢体疼痛
- E. 肢体肿胀

4. 桂枝加龙骨牡蛎汤证的临床表现，下列哪项不是

- A. 梦交
- B. 少腹弦急
- C. 头眩
- D. 发落
- E. 肠鸣

5. 胸痹的治疗原则是

- A. 温助心阳
- B. 扶正祛邪
- C. 宣痹通阳
- E. 温经通脉
- D. 活血化瘀

6. 桂枝汤组成的药物中除桂枝、生姜、大枣外，其余的药物是

- A. 麻黄、杏仁
- B. 葱白、豆豉

C.芍药、甘草

D.荆芥、防风

E.饴糖、芍药

7.大补阴丸中除熟地黄、猪脊髓、白蜜外，尚有

A.黄连、贝母、龟板

B.黄柏、知母、龟板

C.黄芩、知母、鳖甲

D.黄柏、当归、龟板

E.黄柏、贝母、鳖甲

8.止嗽散组成的药物中不含有

A.桔梗

B.荆芥

C.百部

D.前胡

E.紫菀

9.参苏饮与败毒散组成中均不含有的药物是

A.柴胡、前胡

B.羌活、苏叶

C.茯苓、半夏

D.黄连、黄柏

E.人参、甘草

10.九味羌活汤的功用是

A.散寒解表，祛风除湿

B.发汗解表，疏风止痛

C.宣肺散寒，除湿止痛

D.发汗祛湿，兼清里热

E.散寒除湿，通痹止痛

11.桂枝汤原方服法中要求“服已须臾，吸热稀粥一升余”的意义在于

A.护中以防伤胃

B.助汗以祛外邪

C.防止过汗伤阴

D.防止过汗伤阳

E.既防亡阳，又防亡阴

12.参苏饮主治证的病因病机是

A.外感风寒，内有痰热

B.外感风寒，内有痰湿

C.外感风寒，内有蕴热

D.外感风寒，内停饮水

E.外感风寒，内伤湿滞

13.大陷胸汤的药物组成是

A.大黄、厚朴、枳实

B.大黄、芒硝、甘遂

C.大黄、芒硝、厚朴

D.芒硝、枳实、甘遂

E. 芫花、甘遂、大戟

14. 左归丸和右归丸组成的药物中均含有

A. 黄芪、人参

B. 白术、当归

C. 人参、麦冬

D. 熟地、山药

E. 远志、菖蒲

15. 功用为泻热逐水的方剂是

A. 十枣汤

B. 大承气汤

C. 大陷胸汤

D. 济川煎

E. 大黄牡丹汤

16. 下列哪项不是大承气汤的主治范围

A. 热结旁流

B. 热厥

C. 痉病

D. 发狂

E. 下利清谷

17. 四逆散中一升一降配伍的药物是

A. 柴胡配芍药

B. 柴胡配甘草

C. 柴胡配枳实

D. 芍药配甘草

E. 枳实配芍药

18. 逍遥散中配伍薄荷的用意是

A. 疏肝解郁

B. 散肝透邪

C. 疏郁透邪

D. 疏肝散热

E. 清利头目

19. 以下不属于香薷散药物组成的是

A. 香薷

B. 白扁豆

C. 枳实

D. 厚朴

E. 酒

20. 下列何药不属于暖肝煎的组成药物

A. 枸杞子

B. 沉香

C. 小茴香

D. 茯苓

E. 炮附子

21. 大建中汤和小建中汤组成中均含有的药物是

- A.附子
- B.蜀椒
- C.干姜
- D.人参
- E.饴糖

22.暖肝煎中以肉桂、小茴为君药的配伍意义是

- A.行气散寒止痛
- B.疏肝理气止痛
- C.温肾暖肝散寒
- D.健脾温胃止呕
- E.温肾健脾行气

23.肾气丸和地黄饮子两方组成中均含有的药物是

- A.炮附子、官桂
- B.炮附子、桂枝
- C.炮附子、山茱萸
- D.干地黄、山茱萸
- E.熟地黄、山茱萸

24.归脾汤的功用是

- A.健脾益气，宁心安神
- B.益气补血，健脾养心
- C.健脾养心，益气摄血
- D.滋阴清热，补心安神
- E.健脾升阳，渗湿止泻

25.右归丸的功用是

- A.温补肾阳，填精益髓
- B.滋阴补肾，填精益髓
- C.温肾化气，利水消肿
- D.温肾壮阳，涩精止遗
- E.温补肾阳，涩精缩尿

26.当归补血汤重用黄芪为君，意在

- A.补气固表
- B.补气行血
- C.补气生血
- D.补气行水
- E.补气托毒

27.属于固涩剂适应范围的病证是

- A.血热崩漏
- B.肺虚久咳
- C.火动遗精
- D.伤食泄泻
- E.热病多汗

28.九仙散组成的药物中含有

- A.乌药、生枳壳
- B.知母、密蒙花

- C.人参、桑白皮
- D.山药、五味子
- E.诃子、炙黄芪

29.增液汤的药物组成中含有

- A.玉液汤
- B.炙甘草汤
- C.麦门冬汤
- D.养阴清肺汤
- E.清燥救肺汤

30.易黄汤的功用是

- A.清热解毒，收涩止带
- B.补益脾肾，清热祛湿，收涩止带
- C.疏肝健脾，化湿止带
- D.补气健脾，化湿止带
- E.健脾益肾，收涩止带

31.治疗五更泄泻的首选方剂是

- A.吴茱萸汤
- B.理中丸
- C.真人养脏汤
- D.四神丸
- E.金匮肾气丸

32.天王补心丹的辨证要点是指

- A.失眠，惊悸，舌红苔黄，脉细数
- B.失眠，心悸，手足心热，舌红少苔，脉细数
- C.虚烦失眠，咽干口燥，舌红，脉弦细
- D.精神恍惚，悲伤欲哭，舌红苔少，脉细
- E.心悸失眠，体倦食少，舌淡，脉细弱

33.酸枣仁汤主治证候的病因病机是

- A.心脾两虚，气血不足
- B.心阴不足，肝气失和
- C.心肾两亏，阴虚血少
- D.肝血不足，虚热内扰
- E.心阳偏亢，心肾不交

34.苏合香丸主治

- A.心绞痛属痰浊气滞血瘀者
- B.寒闭证
- C.暑秽
- D.热闭证
- E.痰热内闭心包证

35.越鞠丸组成的药物中不含有

- A.香附
- B.白术
- C.神曲
- D.川芎

E. 栀子

36. 小肠机械性肠梗阻的 X 线表现

- A. 小肠扩张，大量积气、积液
- B. 两膈下可见新月形透亮气体影
- C. 内积气
- D. 结肠内可见气体
- E. 腹部均致密，腰大肌清晰

37. 脑挫裂伤的影像学表现

- A. 颅内圆形均匀密度增高影，边界清楚，周围有环形密度减低影，中线移位
- B. 基底节区可见多发点状低密度影，边缘清晰
- C. 右额叶低密度区内散在斑点状高密度出血灶，中线向左移位
- D. 脑沟、脑池、脑裂内密度增高影
- E. 颅板下见梭形高密度影

38. 一侧胸腔积液的表现是

- A. 肺野大片致密，胸廓塌陷，纵隔向患侧移位
- B. 肺野大片致密，肋间隙增宽，纵隔向健侧移位
- C. 肺纹理增多、增粗、紊乱
- D. 肺野透亮度增加
- E. 一侧肺野团块状阴影

39. 心脏后前位 X 线片示心脏阴影向两侧增大，心缘弧度消失呈烧瓶状。应考虑的疾病是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 心包积液
- C. 心肌病
- D. 高血压性心脏病
- E. 肺源性心脏病

40. 退行性骨关节病主要的病变部位是

- A. 关节软骨
- B. 骨皮质
- C. 关节韧带
- D. 滑膜组织
- E. 骨膜

41. 骨软骨瘤的好发部位是

- A. 长骨骨干
- B. 长骨干骺端
- C. 短骨干骺端
- D. 长骨骨端
- E. 扁骨

42. 科勒斯骨折是指

- A. 桡骨近端骨折
- B. 桡骨远端骨折
- C. 尺骨远端骨折
- D. 尺骨近端骨折
- E. 肱骨骨折

43. 十二指肠溃疡的好发部位是

- A.降部
- B.升部
- C.水平部
- D.球部
- E.壶腹部

44.为观察肾的分泌、排泄功能，应做的检查是

- A.逆行肾盂造影
- B.静脉肾盂造影
- C.口服胆囊造影
- D.静脉胆道造影
- E.“T”管造影

45.正常成人右下肺动脉主干的直径一般为

- A.不超过 15 mm
- B.不超过 16 mm
- C.不超过 17 mm
- D.不超过 18 mm
- E.不超过 20 mm

46.胸膜粘连最常见的是

- A.肺尖部胸膜
- B.肋膈角处
- C.心膈角处
- D.纵隔胸膜
- E.叶间胸膜

47.支气管肺炎发生在小儿，主要表现是

- A.可出现三角形的肺不张，尖端指向肺门
- B.脊柱旁及心脏边缘部病变较多
- C.肺门增大、模糊，伴局限性肺气肿改变
- D.不局限于一个肺野或肺段的密度增高阴影
- E.两肺中下部内、外带，沿肺纹理分布的病变

48.肺结核的治愈阶段的 X 线表现是

- A.渗出
- B.增殖
- C.纤维化及钙化
- D.干酪性病灶
- E.空洞

49.下列关于 MRI 诊断的临床应用的描述,错误的是

- A.MRI 检查具有无 X 线辐射、无痛苦、无骨性伪影的特点
- B.MRI 具有高度的软组织分辨能力
- C.MRI 对肺癌的早期发现和诊断有重要意义
- D.MRI 对钙化与颅骨病变的诊断能力较差
- E.MRI 检查时间长，容易产生运动伪影

50.可引起 ST 段下移 0.07 mV 的疾病是

- A.急性心肌梗死
- B.心绞痛

C.急性心包炎

D.主动脉夹层动脉瘤

E.室壁瘤

51.左心室肥大的心电图可表现为

A. $RV_1 > 1.0 \text{ mV}$ 、 $RV_1 + SV_5 > 1.2 \text{ mV}$

B. V_3 、 V_4 导联呈 RS 型， R/S 接近于 1

C. V_5 、 V_6 导联以 R 波为主， $R/S > 1$ ， $RV_5 < 2.5 \text{ mV}$

D. V_1 至 V_5 ，R 波逐渐增大，而 S 波逐渐变小

E. $RV_5 > 2.5 \text{ mV}$ ， V_1 或 $RV_5 + SV_1 > 3.5 \sim 4.0 \text{ mV}$

52.反映下壁心肌梗死的导联是

A. V_1 、 V_2 、 V_3

B. I、II、III

C. I、 aVL 、 V_6

D. II、III、 aVF

E. V_7 、 V_8 、 V_9

53.变异型心绞痛

A.ST 段下垂型压低

B.ST 段上抬型压低

C.ST 段抬高，对应导联 ST 段压低

D.ST 段弓背向上抬高

E.ST 段弓背向下抬高

54.心电轴显著左偏的是

A. $0^\circ \sim +90^\circ$

B. $+30^\circ \sim +90^\circ$

C. $-30^\circ \sim -90^\circ$

D. $+120^\circ \sim +180^\circ$

E. $+90^\circ \sim +120^\circ$

55.典型心绞痛发作时，面对缺血区的导联 ST 段的改变为

A.延长

B.缩短

C.不变

D.下移

E.抬高

56.不符合 III 度房室传导阻滞心电图特征的是

A.心房率 $<$ 心室率

B.心房率 $>$ 心室率

C.P-P 间期相等

D.R-R 间期相等

E.QRS 波群形态可正常，也可呈宽大畸形

57.心电图示心率 180 次/分，QRS 波时间为 0.10 s，R-R 绝对整齐，心电图诊断是

A.窦性心动过速

B.阵发性室上性心动过速

C.阵发性室性心动过速

D.心房纤颤

E.心室颤动

58.右房肥大的心电图表现为

A.P 波呈双峰状

B.P 波增宽

C.P 波出现切迹

D.P 波尖锐高耸

E.P 波低平

59.慢性冠状动脉供血不足的心电图表现是

A.频发早搏

B.ST 段明显下降, T 波倒置

C.ST 段上抬

D.病理性 Q 波

E.窦性心动过缓

60.下列各项,可引起 U 波增高的是

A.低血钙

B.低血钾

C.高血压

D.冠心病

E.高血钠

61.肺吸虫病患者痰液直接涂片镜检发现增多的细胞是

A.中性粒细胞

B.鳞状上皮细胞

C.红细胞

D.嗜酸性粒细胞

E.柱状上皮细胞

62.干酪性肺炎患者痰液的颜色是

A.粉红色泡沫样痰

B.红色痰

C.棕褐色痰

D.铁锈色痰

E.黄绿色痰

63.肛裂患者粪便的性状是

A.冻状便

B.柏油样便

C.绿色便

D.鲜血便

E.暗红色果酱样便

64.间质性肾炎患者尿中常出现的管型是

A.透明管型

B.蜡样管型

C.白细胞管型

D.红细胞管型

E.脂肪管型

65.腹部脏器穿孔或热毒弥漫的临床表现是

- A. 胁的一侧或两侧疼痛
- B. 胃脘痛
- C. 全腹痛，伴压痛、反跳痛
- D. 脐外侧及下腹部突然剧烈绞痛，向大腿内侧及阴部放射，尿血
- E. 腹部持续性疼痛，阵发性加剧，伴腹胀、呕吐、便秘

66. 缺铁性贫血未治疗前，外周血的主要特点是

- A. 红细胞计数下降最明显
- B. 红细胞形态增大
- C. 网织红细胞升高
- D. 血红蛋白下降最明显
- E. 血小板下降最明显

67. 铁剂治疗缺铁性贫血后，首先出现的治疗反应是

- A. 红细胞总数升高
- B. 血清铁增加
- C. 血红蛋白升高
- D. 血清铁饱和度增加
- E. 网织红细胞升高

68. 引起继发性再生障碍性贫血最常见的药物是

- A. 磺胺嘧啶
- B. 西咪替丁
- C. 氯霉素
- D. 卡马西平
- E. 甲巯咪唑

69. 可出现牙龈肿胀的急性白血病是

- A. 急红白血病
- B. 急淋白血病
- C. 急粒白血病
- D. 急巨细胞白血病
- E. 急单白血病

70. 完全治愈白血病最有效的治疗方法是

- A. 化学药物治疗
- B. 免疫治疗
- C. 放射治疗
- D. 骨髓移植
- E. 营养及药物支持治疗

71. 不属甲亢高代谢综合征表现的是

- A. 怕热、多汗
- B. 多食善饥
- C. 体重锐减
- D. 糖耐量减低
- E. 血胆固醇升高

72. ^{131}I 碘治疗甲亢的作用机制是

- A. 释放 X 射线
- B. 释放 α 射线

C.释放 δ 射线

D.释放 γ 射线

E.释放 β 射线

73.咪唑类抗甲状腺药物的主要药理作用是

A.抑制甲状腺素的释放

B.抑制甲状腺素的合成

C.抑制碘的吸收

D.促进碘的吸收

E.抑制促甲状腺素的作用

74.II 型糖尿病的主要病因及发病机制是

A.环境因素

B.自身免疫反应

C.胰岛素抵抗及胰岛 β 细胞功能缺陷

D.病毒感染

E.中心型肥胖

75.糖尿病酮症酸中毒应用胰岛素的方法是

A.30U 短效胰岛素静注

B.30U 短效胰岛素皮注

C.短效胰岛素 5~10U/h 静滴

D.短效胰岛素 0.1U/(kg·h)静滴

E.鱼精蛋白锌胰岛素 5U/h 静滴

76.关于系统性红斑狼疮的有关病因,错误的是

A.遗传因素

B.雌激素水平升高

C.紫外线

D.感染

E.输血

77.诊断系统性红斑狼疮常用而有价值的病理检查是

A.肾穿刺

B.骨髓穿刺

C.肺穿刺

D.淋巴结活检

E.皮肤狼疮带试验

78.关于重症胰腺炎血清脂肪酶酶的叙述,以下哪项正确

A.在发病后 2~12 小时开始升高

B.在发病后 8~12 小时开始升高

C.在发病后 8~14 小时开始升高

D.在发病后 12~14 小时开始升高

E.在发病后 24~72 小时开始升高

79.患者有长期高血压病史,因突发心悸、气短来医院急诊,心电图表现为连续出现的房性早搏,其心电图诊断是

A.偶发房性早搏

B.频发房性早搏

C.室性心动过速

- D.房性心动过速
- E.交界性心动过速

80.患者既往有风心病史，活动时突然出现“三偏”综合征表现，确诊为脑梗死，该患者最可能的诊断是

- A.主动脉瓣狭窄合并房颤
- B.主动脉瓣关闭不全
- C.二尖瓣关闭不全伴心力衰竭
- D.三尖瓣狭窄
- E.二尖瓣狭窄并发房颤

81.诊断慢性胃炎最可靠的方法是

- A.X线钡餐检查
- B.胃液分析
- C.胃镜加活检
- D.血清胃泌素测定
- E.大便隐血试验

82.血清胃泌素水平降低，应考虑的诊断是

- A.慢性萎缩性胃体炎
- B.慢性非萎缩性胃炎
- C.慢性萎缩性胃窦炎
- D.胃息肉
- E.胃泌素瘤

83.胃溃疡的好发部位是

- A.胃小弯
- B.胃底
- C.胃大弯
- D.胃窦部
- E.贲门

84.治疗消化性溃疡的药物中，属胃黏膜保护剂的是

- A.米索前列醇
- B.氢氧化铝
- C.西咪替丁
- D.奥美拉唑
- E.山莨菪碱

85.胃癌的好发部位依次是

- A.胃窦、胃体、贲门
- B.贲门、胃窦、胃大弯
- C.胃体、贲门、胃窦
- D.胃小弯、胃大弯、胃窦
- E.胃窦、贲门、胃体

86.我国卫生部于1988年制定的医务人员医德规范7条内容中，不直接涉及医患关系的是

- A.第2条
- B.第3条
- C.第4条
- D.第5条

E.第6条

87.下列义务中患者应该知情同意后才能合理履行的是

- A.如实提供病情信息
- B.尊重医务人员的劳动
- C.避免将疾病传播给他人
- D.遵守住院规章制度
- E.支持医学生实习和见习

88.“危害公共卫生罪”是依据哪部法律定罪

- A.《中华人民共和国宪法》
- B.《中华人民共和国刑法》
- C.《中华人民共和国传染病防治法》
- D.《中华人民共和国食品安全法》
- E.《中华人民共和国执业医师法》

89.卫生法所涉及的民事责任主要形式是

- A.行政处罚
- B.刑事处罚
- C.损害责任
- D.赔偿损失
- E.侵害自由权

90.卫生法中民事责任的主要特征是

- A.既包括财产处罚，也包括人身处罚
- B.只能由特定的国家机关依照法律赋予的权力和程序而实施
- C.只能由人民法院依法适用
- D.可以剥夺其政治权利、人身自由甚至生命
- E.是补偿当事人的损失

91.我国《民法》主要调整平等主体之间所发生的

- A.财产关系
- B.社会关系
- C.因果关系
- D.公民关系
- E.经济关系

92.桑螵蛸散与天王补心丹两方组成中均含有的药物是

- A.龙骨、人参
- B.人参、菖蒲
- C.菖蒲、远志
- D.远志、当归
- E.当归、石斛

93.苏子降气汤中配伍肉桂的主要用意是

- A.温阳散寒
- B.温通经脉
- C.补益气血
- D.温肾纳气
- E.散寒止痛

94.羚角钩藤汤与天麻钩藤饮组成的药物中均含有

- A.霜桑叶
- B.茯神木
- C.桑寄生
- D.夜交藤
- E.益母草

95.小活络丹组成的药物中，不含有

- A.川乌
- B.乳香
- C.没药
- D.半夏
- E.地龙

96.羚角钩藤汤中配伍霜桑叶和滁菊花的用意是

- A.清肝明目
- B.疏肝解郁
- C.清热平肝
- D.祛风解痉
- E.息风止痉

97.症见口眼喎斜，或面肌抽动，舌淡红，苔白者，宜用

- A.补阳还五汤
- B.大秦艽汤
- C.镇肝息风汤
- D.牵正散
- E.小活络丹

98.肝郁血虚，脾失健运，两胁作痛，神疲、食少，脉弦而虚者。宜选用的方剂是

- A.健脾丸
- B.逍遥散
- C.一贯煎
- D.越鞠丸
- E.保和丸

99.大黄在枳实导滞丸中的作用是

- A.泄热通便
- B.攻下寒积
- C.以泻代清
- D.泄热逐瘀
- E.攻积泻热

100.四逆汤与四逆散组成中均含有的药物是

- A.柴胡
- B.枳实
- C.干姜
- D.芍药
- E.甘草

101.阳明温病，津亏便秘者，治当首选

- A.济川煎
- B.增液汤

C.麦门冬汤

D.麻子仁丸

E.地黄饮子

102.百合固金汤中少佐桔梗的主要用意是

A.解毒利咽消肿

B.利咽消肿散结

C.宣肺化痰利咽

D.生津润肺利咽

E.滋阴润肺解毒

103.防己黄及汤中黄芪的主要作用是

A.固表止汗

B.实卫御风

C.健脾升阳

D.祛风行水

E.益气利水

104.由黄连、半夏、瓜蒌实组成的方剂是

A.半夏泻心汤

B.大陷胸汤

C.滚痰丸

D.小陷胸汤

E.清气化痰丸

105.临床分级为轻、中度的溃疡性结肠炎的首选治疗药物是

A.强的松

B.6-MP

C.柳氮磺吡啶

D.替硝唑

E.羟氨苄青霉素

A2 型题答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。106.男性患者，42 岁，胃溃疡史 12 年，近 2 个月上腹痛失去原规律性，伴反酸、嗳气，内科治疗，急需的检查是

A.钡餐检查

B.B 超检查

C.胃酸测定

D.便隐血试验

E.胃镜+活检检查

107.男性患者，50 岁，胃溃疡病史 12 年，近 1 个月来疼痛的节律性消失，食欲减退，体重减轻，粪便隐血试验持续（+++），应首先考虑的诊断是

A.癌变

B.慢性穿孔

C.幽门梗阻

D.Hp 感染

E.消化道出血

108. 男性患者，29 岁，慢性腹泻 3 年余，大便 4~5 次/日，近日劳累后病情加重，大便增加至 7~9 次/日，多为肉眼脓血便，伴腹痛及发热，排便后腹痛可缓解，已应用柳氮磺吡啶治疗，症状缓解不佳，应给予的进一步治疗是

- A. 克拉霉素
- B. 诺氟沙星
- C. 泼尼松
- D. 环孢素 A
- E. 环磷酰胺

109. 女性患者，54 岁，腹部 B 超检查发现肝占位性病变，查肝功能正常。最有助于诊断或排除原发性肝癌的检查项目是

- A. γ -GT
- B. AFP
- C. AST
- D. ALT
- E. LPH

110. 某男，50 岁，既往体健，体检时发现肝右季肋下 2 cm，质硬无压痛，脾可触及，ALT 正常范围，肝穿刺病理：假小叶形成，诊断是

- A. 慢性活动性肝病
- B. 慢性持续性肝炎
- C. 代偿期肝硬化
- D. 肝脓肿
- E. 肝纤维化

111. 男性患者，32 岁，慢性肾炎，肾功能正常，有大量蛋白尿，饮食治疗每天适宜的蛋白质摄入量是

- A. 0.5 g/kg
- B. 1 g/kg
- C. 1.5 g/kg
- D. 2 g/kg
- E. 2.5 g/kg

112. 女性患者，26 岁，因尿痛、尿频、尿急诊断为急性膀胱炎，应首选的抗生素是

- A. 氧氟沙星
- B. 青霉素
- C. 罗红霉素
- D. 头孢唑啉
- E. 克拉霉素

113. 患者，女，30 岁，因月经量多 1 年，出现贫血表现，拟诊断为缺铁性贫血，可作为缺铁依据的检查结果是

- A. 血清铁蛋白 $<12 \mu\text{g/L}$
- B. 总铁结合力 $>64.4 \mu\text{mmo/L}$
- C. 血清铁 $<8.9 \mu\text{mmo/L}$
- D. 转铁蛋白饱和度 $<15\%$
- E. $\text{FEp} > 4.5 \mu\text{g/gHb}$

114. 男性患者，19 岁，发热、反复感染、周身乏力 2 个月，骨髓检查确诊为急性白血病，有助于白血病分类鉴别的检查是

- A.骨髓象
- B.血液一般检查
- C.免疫学检查
- D.细胞化学染色
- E.全身 MRI 检查

115.某男，50 岁，确诊为慢性髓细胞白血病慢性期。首选治疗是

- A.骨髓移植
- B.泼尼松
- C.长春新碱
- D.羟基脲
- E.环磷酰胺

116.男性患者，38 岁，间歇性左下腹痛 5 小时，解脓血便 2 个月，反复抗菌药物治疗无效。查体：腹平软，左下腹轻压痛，未扪及包块。根据以上资料，最有可能的诊断是

- A.克隆病
- B.溃疡性结肠炎
- C.结肠癌
- D.慢性细菌性痢疾
- E.慢性阿米巴痢疾

B1 型题答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中间选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。（117～128 题共用选项）

- A.脾肺气虚，自汗易感者
- B.脾胃气虚，食少脘胀者
- C.气血不足，心悸怔忡者
- D.脾阳不足，吐衄便血者
- E.肝肾不足，腰膝酸软者

117.炙甘草汤和归脾汤均可用治

118.玉屏风散和补中益气汤均可用治

（119～120 题共用选项）

- A.六味地黄丸
- B.知柏地黄丸
- C.桑螵蛸散
- D.金锁固精丸
- E.大补阴丸

119.心肾两虚而遗尿滑精者，可用

120.肾虚精关不固而遗精滑泄者，可用

（121～122 题共用选项）

- A.清营汤
- B.天王补心丹
- C.百合固金汤
- D.清燥救肺汤
- E.朱砂安神丸

121.方中人参、玄参、丹参同用的方剂是

122.组成中含有生地、当归、甘草的方剂是

(123~124 题共用选项)

- A.归脾汤
- B.酸枣仁汤
- C.天王补心丹
- D.朱砂安神丸
- E.甘麦大枣汤

123.心脾两虚，气血不足而健忘失眠者，治宜选用

124.肝血不足，虚热内扰而心悸失眠者，治宜选用

(125~126 题共用选项)

- A.干姜、茯苓
- B.肉桂、当归
- C.人参、大枣
- D.柴胡、苏叶
- E.干姜、半夏

125.旋覆代赭汤组成的药物中含有

126.苏子降气汤组成的药物中含有

(127~128 题共用选项)

- A.胆囊不肿大，明显黄疸
- B.胆囊不肿大，墨菲征阴性
- C.胆囊肿大、实性感
- D.胆囊肿大、囊性感、有压痛
- E.胆囊肿大、囊性感、无压痛，黄疸渐进性加深

127.急性胆囊炎时触诊胆囊的表现

128.胰头癌时触诊胆囊的表现

(129~130 题共用选项)

- A.胃肠胀气
- B.急性肝炎
- C.急性胃肠穿孔
- D.右下肺不张
- E.肺气肿

129.肝浊音界消失见于

130.肝浊音界上移见于

(131~132 题共用选项)

- A.右锁骨中线与肋缘交界处
- B.脐与器前上棘连线的中外 1/3 交界处
- C.脐水平线上腹直肌外缘
- D.髂前上棘水平腹直肌外缘
- E.第 12 肋与腰肌外缘交角的顶点

131.胆囊点位于

132.上输尿管压痛点位于

(133~134 题共用选项)

- A.匙状甲
- B.杵状指(趾)
- C.肢端肥大症

D.爪形手

E.指间关节梭形

133.类风湿性关节炎常出现的体征是

134.支气管扩张常出现的体征是

(135~136 题共用选项)

A.水冲脉

B.交替脉

C.重搏脉

D.奇脉

E.无脉

135.符合左心功能不全的体征是

136.符合甲状腺功能亢进症的体征是

(137~138 题共用选项)

A.10 天内

B.2 周

C.1 个月

D.2 个月

E.3 个月

137.缺铁性贫血患者应用铁剂治疗后网织红细胞开始升高的时间是

138.缺铁性贫血患者应用铁剂治疗后血红蛋白恢复正常的时间是

(139~140 题共用选项)

A.VDLP 方案

B.维 A 酸

C.白消安

D.丙酸睾酮

E.硫酸亚铁

139.急性早幼粒白血病诱导缓解选用的是

140.急淋白血病治疗选用的是

(141~142 题共用选项)

A.基本正常

B.增高

C.降低

D.缺乏

E.降低或缺乏

141.慢性萎缩性胃炎血清胃泌素水平

142.慢性萎缩性胃体炎血清胃泌素水平

(143~144 题共用选项)

A.出血倾向

B.黄疸

C.腹水

D.蜘蛛痣、肝掌

E.肝臭

143.肝硬化肝功能减退，雌激素增多的表现是

144.肝硬化门静脉高压的表现是

(145~146 题共用选项)

- A.休克
- B.恶心呕吐
- C.腹痛
- D.黄疸
- E.发热

145.急性胰腺炎的主要症状是

146.重症急性胰腺炎的重要特征是

(147~148 题共用选项)

- A.合理配伍、细致观察
- B.节约费用、公正分配
- C.对症下药、剂量安全
- D.关心体贴、细致入微
- E.知情同意、保守医密

147.明确疾病的诊断和药物的性能,选择治本或标本兼治的药物符合

148.根据病情的轻重缓急,进行全面考虑,合理使用药物符合

(149~150 题共用选项)

- A.仿制药品
- B.残次药品
- C.特殊管理的药品
- D.假药
- E.劣药

149.麻醉药品是国家实行

150.精神药品是国家明文规定实行参考答案

12345678910BCBECCBDDDD11121314151617181920BBBCCECDCE21222324252627282930ECCBA
CBCCB31323334353637383940DBDBBACBBA41424344454647484950BBDBABCCCB5152535455
5657585960EDCCDABDBB61626364656667686970BEDCCDECED71727374757677787980EEBCDE
EEDE81828384858687888990CCAAEEEBDE919293949596979899100ADDBDCDBEE10110210310
4105106107108109110BBEDCEACBC111112113114115116117118119120BAADDBCACD1211221
23124125126127128129130BEABCBD ECD131132133134135136137138139140ACEBBAADBA141
142143144145146147148149150CBDCACACACC140-2 试卷标码: 1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中医执业医师资格考试

考前全真模拟试卷(二)

(医学综合笔试部分)

报考类别: 中医执业医师

第三单元考试日期: 2021 年 8 月

考试时间: 9:00—11:00 考生姓名:

准考证号:

考场号:

第三单元

A1 型题答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。1.感冒的基本病机是

- A.邪犯于肺，肺气上逆
- B.卫表不和，肺失宣肃
- C.风热犯表，卫表失和
- D.风寒外束，卫阳被郁
- E.暑湿遏表，卫表不和

2.治疗咳嗽之风寒袭肺证，应首选的方剂是

- A.桑菊饮
- B.三拗汤合止嗽散
- C.桑杏汤
- D.荆防达表汤
- E.沙参麦冬汤

3.下列关于哮病的各项叙述中,错误的是

- A.呈反复发作，常为突然发作，平时可一如常人
- B.发作时，喉中有明显哮鸣声，呼吸困难，可于数分钟或数小时后缓解
- C.可见鼻痒、喷嚏、咳嗽、胸闷等先兆症状
- D.与先天禀赋有关，全体家族都有哮病史
- E.常因气候突变、环境因素、饮食不当、情志失调等诱发

4.治疗实喘表寒肺热证，首选的方剂是

- A.麻杏石甘汤
- B.桑白皮汤
- C.麻黄汤合华盖散
- D.射干麻黄汤
- E.麻黄连翘赤小豆汤

5.肺痈患者的脓血痰吐入水中，结果是

- A.痈脓浮在水上
- B.痈脓悬浮在水中
- C.痈脓沉入水底
- D.痈脓溶解在水中
- E.痰分成三层

6.肺痿的基本病机是

- A.虚体虫侵，瘀血内停
- B.虚体虫侵，阳气虚衰
- C.虚体虫侵，气虚不足

- D.虚体虫侵，血虚不足
E.虚体虫侵，阴虚火旺
- 7.肺胀最特征性的主症是
A.发作性痰鸣气喘
B.喘促气急
C.咳嗽咳痰
D.胸部膨满，憋闷如塞
E.胸胁饱满，咳唾引痛
- 8.治疗肺痿之上热下寒证，应首选的方剂是
A.麻黄升麻汤
B.甘草干姜汤
C.清燥救肺汤
D.七味都气丸
E.麦门冬汤
- 9.下列选项中，属于惊悸与怔忡鉴别要点
A.惊悸为持续性，怔忡为阵发性
B.怔忡日久不愈，可转化为惊悸
C.怔忡为上下冲逆，发自少腹
D.惊悸不能自控，活动后加重
E.惊悸发生多与情绪有关，怔忡无精神因素亦可发生
- 10.胸痹的辨证，应首辨的要点是
A.标本虚实
B.病情轻重
C.寒热虚实
D.脉象变化
E.外感内伤
- 11.下列各项,不符合心衰气虚血瘀证临床表现的是
A.胸闷气短
B.动则诱发加重
C.神疲乏力
D.口唇发绀
E.脉微欲绝
- 12.治疗不寐痰热扰心证,首选的方剂是
A.涤痰汤
B.礞石滚痰丸
C.半夏白术天麻汤
D.羚角钩藤汤
E.黄连温胆汤
- 13.太阳经头痛可选用的引经药物是
A.羌活、白芷
B.细辛、葛根
C.川芎、吴茱萸
D.柴胡、黄芩
E.羌活、川芎

14. 眩晕痰浊上蒙证，若痰郁化火，应选用的方剂是

- A. 黄连温胆汤
- B. 苓桂术甘汤
- C. 清金化痰汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 半夏厚朴汤

15. 下列各项，不属中风病因的是

- A. 内伤积损
- B. 饮食不节
- C. 气虚邪中
- D. 疮毒内侵
- E. 劳欲过度

16. 下列属于癫狂初期治则的是

- A. 醒脑开窍
- B. 补益心脾
- C. 祛风通络
- D. 育阴养血
- E. 理气解郁

17. 下列各项中，属于痫病临床特征的是

- A. 多发生于老年，有家族史
- B. 两目上视，四肢抽搐，口吐涎沫
- C. 典型发作时突然昏仆，半身不遂，口眼喎斜
- D. 突然发作，毫无征兆
- E. 面色苍白，四肢厥冷

18. 痴呆痰浊蒙窍证，若风痰瘀阻，应选用的方剂是

- A. 半夏厚朴汤
- B. 半夏白术天麻汤
- C. 天麻钩藤饮
- D. 二陈汤
- E. 黄连温胆汤

19. 治疗胃痛寒邪客胃证，应首选的方剂是

- A. 吴茱萸汤
- B. 苏合香散合良附丸
- C. 桂枝人参汤
- D. 小建中汤
- E. 当归建中汤

20. 下列关于胃痞主症的各项叙述，错误的是

- A. 自觉心下痞塞，胸膈胀满
- B. 胸闷、气短
- C. 压之无痛
- D. 触之无形
- E. 按之柔软

21. 呕吐总的发病机理是

- A. 中焦气机不利，脾胃升降失职

B.胃气阻滞，胃失和降，不通则痛

C.胃失和降，膈间气机不利

D.胃失和降，胃气上逆

E.痰饮内停，中阳不振，胃气上逆

22.治疗噎膈痰气交阻证，首选的方剂是

A.启膈散

B.通幽汤

C.沙参麦冬汤

D.补气运脾汤

E.玉枢丹

23.治疗呃逆胃阴不足证，首选的方剂是

A.一贯煎

B.竹叶石膏汤

C.理中丸

D.益胃汤

E.五磨饮子

24.腹痛发生的基本病机是

A.外邪内传，阻塞气机

B.脏腑气机阻滞，经脉痹阻

C.肝脾湿热，络脉不和

D.肝气郁结，胃失和降

E.食滞肠胃，痞塞不通

25.治疗泄泻肝气乘脾证，应首选的方剂是

A.柴胡疏肝散

B.痛泻要方

C.五磨饮子

D.四七汤

E.参苓白术散

26.治疗寒湿痢首选的方剂是

A.芍药汤

B.不换金正气散

C.白头翁汤

D.驻车丸

E.真人养脏汤

27.便秘的基本病机是

A.肝气郁结

B.肺失肃降

C.肝胃不和

D.大肠传导失常

E.脾失运化

28.胁痛病的病理因素是

A.气滞

B.痰饮

C.水湿

D.热毒

E.风热

29.治疗黄疸消退后湿热留恋证，首选的方剂是

A.平胃散

B.归芍六君子汤

C.茵陈五苓散

D.茵陈四苓散

E.黄连温胆汤

30.积证是指结块出现在

A.身体任何部位

B.颈部

C.胸腔内

D.腹腔内

E.腹壁上

31.治疗聚证肝气郁结证首选的方剂是

A.小承气汤

B.四逆散

C.平胃散

D.六磨汤

E.逍遥散

32.鼓胀的基本病机是

A.肝、脾、肾受损，气、瘀、水停腹中

B.肝、脾、肾受损，痰、瘀、水停腹中

C.肝、脾受损，气、瘀、水停腹中

D.肺、脾、肾受损，水、瘀、饮停腹中

E.脾、肾受损，瘀、水停腹中

33.癭病的病因不包括

A.饮食失宜

B.情志内伤

C.感受外邪

D.水土失宜

E.体质因素

34.疟疾的治疗原则是

A.祛邪截疟

B.解毒除瘴

C.扶正截疟

D.祛瘀化痰软坚

E.灭蚊截疟

35.治疗水肿湿热壅盛证，应首选的方剂是

A.疏凿饮子

B.防己汤

C.舟车丸

D.己椒藜黄丸

E.八正散

36.治疗淋证之热淋，应首选的方剂是

- A.小蓟饮子
- B.补中益气汤
- C.八正散
- D.石韦散
- E.程氏萆薢分清饮

37.癃闭的基本病机是

- A.膀胱气化失调
- B.膀胱气化不利
- C.膀胱气化无权
- D.肾失封藏
- E.肾脏分清泌浊失常

38.阳痿湿热下注证的证机概要是

- A.肝郁气滞，血行不畅，宗筋所聚无能
- B.心脾两虚，气血乏源，宗筋失养
- C.惊恐伤肾，肾精破散，心气逆乱，气血不达宗筋
- D.湿热下注肝经，宗筋经络失畅
- E.命门火衰，精气虚冷，宗筋失养

39.下列各项，不符合郁证临床表现的是

- A.忧郁不畅，情绪不宁，胸胁胀满疼痛
- B.咽中如有异物梗塞
- C.大多数有情志内伤的病史
- D.病情的反复常与情志因素密切相关
- E.多发于老年男性

40.治疗鼻衄热邪犯肺证，应首选的方剂是

- A.桑菊饮
- B.玉女煎
- C.清营汤
- D.龙胆泻肝汤
- E.泻心汤

41.按痰饮停积的部位分类，饮留胃肠的是

- A.痰饮
- B.支饮
- C.溢饮
- D.悬饮
- E.伏饮

42.消渴“下消”的突出症状是

- A.消谷善饥
- B.烦热多汗
- C.腰膝酸软
- D.烦渴引饮
- E.尿频量多

43.治疗汗证阴虚火旺证的首选方剂是

- A.青蒿鳖甲汤

- B.知柏地黄丸
- C.当归六黄汤
- D.天王补心丹
- E.犀角地黄汤

44.治疗内伤发热血虚发热证，首选的方剂是

- A.清营汤
- B.清骨散
- C.归脾汤
- D.补中益气汤
- E.青蒿鳖甲汤

45.血虚证的治疗中，以益气生血为特点的经典方剂是

- A.归脾汤
- B.四物汤
- C.当归补血汤
- D.保元汤
- E.炙甘草汤

46.下列关于厥证描述中，错误的是

- A 突然昏倒，不省人事
- B 昏厥时间较长，甚至一厥不复
- C 短时下苏醒，醒后无偏瘫
- D 伴有号叫、抽搐、口吐涎沫、两目上视、小便失禁等
- E 发病前或有精神刺激，或有大失血病史

47.治疗痹证的着痹，应首选的方剂是

- A.薏苡仁汤
- B.宣痹汤
- C.乌头汤
- D.防风汤
- E.独活寄生汤

48.下列各项，不符合痿证临床特征的是

- A.肢体筋脉弛缓
- B.肢体软弱无力
- C.肢体运动不利
- D.肢体关节疼痛
- E.可有肌肉萎缩

49.治疗颤证阳气虚衰证，应首选的方剂是

- A.附子理中丸
- B.龟鹿二仙膏
- C.金匱肾气丸
- D.人参养荣汤
- E.地黄饮子

50.腰痛的基本病机是

- A.风、寒、湿邪痹阻经脉
- B.筋脉痹阻，腰府失养
- C.气滞血瘀，经脉不通

D.劳力扭伤，经脉不通

E.肾精亏虚，腰府失养

51.足三阳经在下肢的分布规律是

A.太阳在前，阳明在中，少阳在后

B.太阳在前，少阳在中，阳明在后

C.少阳在前，太阳在中，阳明在后

D.阳明在前，太阳在中，少阳在后

E.阳明在前，少阳在中，太阳在后

52.不属于经络作用的是

A.联系脏腑，沟通内外

B.传导感应，调整虚实

C.运行气血，协调阴阳

D.抗御病邪，反映病候

E.蓄积渗灌气血

53.手厥阴心包经的主治特点是

A.心病

B.心、胃病

C.肺、喉病

D.肝病、脾胃病

E.肾、肺、咽喉病

54.督脉之络穴位于

A.头项部

B.上腹部

C.下腹部

D.胸胁部

E.尾骶部

55.大肠的募穴是

A.下脘

B.中脘

C.梁门

D.水道

E.天枢

56.眉间至后发际正中的骨度分寸是

A.12 寸

B.13 寸

C.14 寸

D.15 寸

E.16 寸

57.不属于尺泽穴主治病证的是

A.咯血、咽喉肿痛

B.咳嗽、气喘

C.急性腹痛、吐泻

D.肘臂挛痛、小儿惊风

E.齿痛、口眼喎斜

58.下列腧穴中，治疗高血压首选

- A.曲泽
- B.尺泽
- C.曲池
- D.中渚
- E.小海

59.位于股前区，髌底上 2 寸，股外侧肌与股直肌肌腱之间的腧穴是

- A.血海
- B.梁丘
- C.归来
- D.扶突
- E.条口

60.位于耳屏游离缘下部尖端，即耳屏 2 区后缘处的耳穴是

- A.屏尖
- B.屏间前
- C.肾上腺
- D.下屏
- E.外耳

61.下列各项中，属于近部选穴的是

- A.头痛取膈俞
- B.脱肛取百会
- C.咳嗽取列缺
- D.鼻病选迎香
- E.鼻病选合谷

62.治疗面痛属于风热证者，除主穴外，应加用

- A.列缺、风池
- B.曲池、外关
- C.内关、三阴交
- D.行间、内庭
- E.太溪、风池

63.针灸治疗带下，主选的经穴是

- A.任脉、足少阳、足太阴经穴
- B.任脉、足阳明、足厥阴经穴
- C.任脉、足少阴、足太阴经穴
- D.带脉、足少阳、足太阴经穴
- E.带脉、足少阴、足厥阴经穴

64.治疗落枕的主穴是

- A.天柱、肩井、天髎、肩贞、合谷
- B.天柱、养老、后溪、阳池、合谷
- C.阿是穴、外关、天髎、肩井、合谷
- D.阿是穴、外劳宫、后溪、悬钟、天柱
- E.后溪、外劳宫、外关、束骨、昆仑

65.治疗耳聋虚证，应主选的是听宫、翳风以及

- A.合谷、神门

- B.百会、风池
- C.太溪、肾俞
- D.中渚、侠溪
- E.太冲、太溪

66.治疗心绞痛的主穴是

- A.内关、血海、太冲、膻中
- B.内关、郄门、阴郄、膻中
- C.外关、郄门、阴郄、膻中
- D.外关、血海、太冲、神门
- E.心俞、血海、膻中、神门

67.大包穴位于侧胸部腋中线上

- A.当第3肋间隙处
- B.当第4肋间隙处
- C.当第5肋间隙处
- D.当第6肋间隙处
- E.当第7肋间隙处

68.阴郄穴位于尺侧腕屈肌腱的桡侧缘，腕掌侧远端横纹上

- A.0.5寸
- B.1寸
- C.1.5寸
- D.2寸
- E.2.5寸

69.按对应顺序，耳门、听宫、听会所属的经分别是

- A.胆经、三焦经、小肠经
- B.三焦经、胆经、小肠经
- C.三焦经、小肠经、胆经
- D.胆经、小肠经、三焦经
- E.小肠经、胆经、三焦经

70.膏肓穴的定位是

- A.在脊柱区，第2胸椎棘突下，后正中线旁开3寸
- B.在脊柱区，第3胸椎棘突下，后正中线旁开3寸
- C.在脊柱区，第4胸椎棘突下，后正中线旁开3寸
- D.在脊柱区，第5胸椎棘突下，后正中线旁开3寸
- E.在脊柱区，第6胸椎棘突下，后正中线旁开3寸

71.下列各项中，不属于照海穴主治病证的是

- A.不寐，癫痫
- B.呕吐涎沫，吐舌
- C.月经不调，带下
- D.小便频数，癃闭
- E.咽喉干痛，目赤肿痛

72.在肘前区，肘横纹上，肱二头肌腱的尺侧缘凹陷中的腧穴是

- A.少海
- B.小海
- C.曲泽

D.曲池

E.尺泽

73.下列不属于支沟穴主治病证的是

A.失眠、癲狂病

B.便秘、热病

C.耳鸣、耳聋

D.暴暗、瘰癧

E.胁肋疼痛

74.位于头部，眉上1寸，瞳孔直上的腧穴是

A.承泣

B.阳白

C.睛明

D.四白

E.隐白

75.期门穴位于胸部，前正中线旁开4寸

A.第3肋间隙

B.第4肋间隙

C.第5肋间隙

D.第6肋间隙

E.第7肋间隙

76.上星穴的定位是

A.在头部，前发际正中

B.在头部，前发际正中直上0.5寸

C.在头部，前发际正中直上1寸

D.在头部，前发际正中直上1.5寸

E.在头部，前发际正中直上2寸

77.气海穴的定位是在下腹部，前正中线上

A.脐中下0.5寸

B.脐中下1寸

C.脐中下1.5寸

D.脐中下2寸

E.脐中下2.5寸

78.安眠的定位是

A.在项部，当翳风穴与风池穴连线的中点处

B.在头部，当眉梢与目外眦之间，向后约一横指的凹陷处

C.在面颊部，耳垂前0.5~1寸处

D.在头部，当眉梢与目外眦之间，向后约二横指的凹陷处

E.在脊柱区，横平第7颈椎棘突下，后正中线旁开0.5寸

79.属于捻转补泻中补法的操作是

A.捻转角度小，用力轻，频率慢，操作时间短

B.捻转角度小，用力重，频率慢，操作时间短

C.捻转角度大，用力轻，频率快，操作时间短

D.捻转角度小，用力轻，频率慢，操作时间长

E.捻转角度大，用力轻，频率慢，操作时间短

80. 以下各项中, 不属于走罐法适宜施术后部位的是

- A. 脊背
- B. 头部
- C. 腰臀
- D. 大腿
- E. 肩胛

81. 具有镇静、止痛、缓解肌肉痉挛作用的电针波型是

- A. 疏波
- B. 密波
- C. 疏密波
- D. 断续波
- E. 锯齿波

82. 光明穴可以治疗的病证是

- A. 痴呆
- B. 热病
- C. 失眠
- D. 乳房胀痛
- E. 足附肿痛

A2 型题答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。83. 王某, 男, 45 岁。发热 1 天, 微恶风, 汗少, 肢体酸重, 头昏重胀痛, 咳嗽痰黏, 鼻流浊涕, 心烦口渴, 渴不多饮, 胸闷脘痞, 泛恶, 腹胀便溏, 舌苔薄黄而腻, 脉濡数。其治疗应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 加减葳蕤汤
- C. 荆防达表汤
- D. 新加香薷饮
- E. 参苏饮

84. 患者, 女, 45 岁。咳嗽 2 月, 呈阵发性, 咳时面赤, 咽干口苦, 常感痰滞咽喉而咯之难出, 量少质黏, 胸胁胀痛, 咳时引痛, 舌红, 舌苔薄黄, 脉弦数。此病证的治法是

- A. 清热肃肺, 豁痰止咳
- B. 燥湿化痰, 理气止咳
- C. 清肺泻肝, 顺气降火
- D. 滋阴润肺, 化痰止咳
- E. 疏风清肺, 润燥止咳

85. 马某, 女, 35 岁, 反复发作气急痰鸣 6 年余。10 分钟前受寒复发, 喉中哮鸣如水鸡声, 呼吸急促, 喘憋气逆, 胸膈满闷如塞, 咳不甚, 痰少咯吐不爽, 色白而多泡沫, 渴喜热饮, 形寒怕冷, 面色青晦, 舌苔白滑, 脉浮紧。此病证的治法是

- A. 清热宣肺, 化痰定喘
- B. 宣肺散寒, 化痰平喘
- C. 解表散寒, 清化痰热
- D. 祛风涤痰, 降气平喘
- E. 补肺纳肾, 降气化痰

86. 王某, 男, 25 岁。咳吐大量脓痰, 痰血相兼, 腥臭异常, 胸中烦满而痛, 身热面赤, 烦渴喜饮, 舌苔黄腻, 舌质红, 脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A.银翘散
- B.《千金》苇茎汤
- C.加味桔梗汤
- D.桔梗杏仁煎
- E.如金解毒散

87.李某，女，57岁。有心悸病史5年余，平素心悸气短，面色无华，倦怠乏力，纳呆食少，舌淡红，脉细弱。治疗应选用的方剂为

- A.炙甘草汤
- B.参苓白术散
- C.归脾汤
- D.六味地黄丸
- E.当归补血汤

88.赵某，男，53岁，胸部闷痛2年。今日因受寒而猝然心痛如绞，心痛彻背，喘不得卧，手足不温，冷汗自出，面色苍白，苔薄白，脉沉紧。其治疗的首选方剂是

- A.枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- B.生脉散合人参养荣汤
- C.天王补心丹合炙甘草汤
- D.人参养荣汤合桃红四物汤
- E.参附汤合右归饮

89.王某，男，58岁。近年来心烦不寐，入睡困难，心悸多梦，腰膝酸软，潮热盗汗，咽干少津，舌红少苔，脉细数。治疗此病证首选方剂是

- A.左归丸合酸枣仁汤
- B.六味地黄丸合交泰丸
- C.安神定志丸合酸枣仁汤
- D.六味地黄丸合安神定志丸
- E.右归丸合酸枣仁汤

90.崔某，男，43岁。3年来头晕伴头目胀痛，口苦，遇郁怒而加重，颜面潮红，急躁易怒，肢麻震颤，舌红苔黄，脉弦数。其治疗应首选的方剂是

- A.天麻钩藤饮
- B.归脾汤
- C.左归丸
- D.半夏白术天麻汤
- E.通窍活血汤

91.李某，男，49岁。头晕头痛，手足麻木，突然发生口舌歪斜，口角流涎，舌强语塞，半身不遂，舌质紫暗有瘀斑，苔薄白，脉弦涩。此病证的证机概要是

- A.肝阳化风，风痰上扰，经脉闭阻
- B.肝阳暴张，痰火壅盛，气血上逆，神窍闭阻
- C.痰浊偏盛，上壅清窍，内蒙心神，神机闭塞
- D.气血运行不利
- E.肝火偏旺，阳亢化风，横窜络脉

92.李某，男，32岁。平素急躁易怒，头痛失眠5日。今日突发狂乱无知，骂詈号叫，不避亲疏，不食不眠，舌质红绛，苔黄腻，脉滑数。其诊断为

- A.癫证痰气郁结证
- B.狂证痰热瘀结证

C.肝阳头痛

D.狂证痰火扰神证

E.狂证火盛阴伤证

93.王某，男，36岁。有癫痫病史10年。反复发作不愈，神疲乏力，心悸气短，面色苍白，体瘦纳呆，舌质淡，苔白腻，脉沉细而弱。此病证的证机概要是

A.心肾精血亏虚，髓海不足，脑失所养

B.瘀血阻窍，脑络闭塞，脑神失养

C.气血耗伤，心脾两伤，心神失养

D.痰浊蕴结，气郁化火，上扰脑神

E.痰浊中阻，上蒙清窍，清阳不升

94.李某，女，82岁。平素时常头晕，沉默寡言。近年来智力衰退，终日无语，呆若木鸡，不思饮食，痞满不适，头重如裹，舌质淡，苔白腻，脉滑。其诊断为

A.癫证痰气郁结证

B.郁证痰气郁结证

C.痴呆痰浊蒙窍证

D.癫证心脾两虚证

E.痴呆髓海不足证

95.陈某，女，45岁。反复胃脘疼痛6年，胃脘隐隐灼痛，似饥而不欲食，口燥咽干，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细数。此病证的证机概要是

A.胃阴亏耗，胃失濡养

B.脾虚胃寒，失于温养

C.湿热蕴结，胃气痞阻

D.寒凝胃脘，阳气被遏，气机阻滞

E.肝气郁结，横逆犯胃，胃气阻滞

96.王某，男，55岁。反复呕吐1月，呕吐清水痰涎，脘闷不食，头眩心悸，舌苔白腻，脉滑。治疗应首选的方剂是

A.半夏白术天麻汤

B.平胃散合甘草干姜茯苓白术汤

C.实脾饮

D.小半夏汤合苓桂术甘汤

E.藿香正气散

97.姜某，男，45岁。平素喜辛辣香燥之品，5分钟前出现呃逆，呃声洪亮有力，冲逆而出，口臭烦渴，多喜冷饮，脘腹满闷，大便秘结，小便短赤，苔黄燥，脉滑数。治疗应首选的方剂是

A.丁香散

B.五磨饮子

C.益胃汤

D.竹叶石膏汤

E.清胃散

98.利某，女，30岁。今日早上受凉后出现腹痛拘急，得温痛减，口淡不渴，形寒肢冷，小便清长，大便清稀，舌质淡，苔白腻，脉沉紧。其治法应是

A.消食导滞，理气止痛

B.散寒温里，理气止痛

C.疏肝解郁，理气止痛

- D.活血化瘀，和络止痛
- E.温中补虚，缓急止痛

99.李某，女，40岁。昨天晚上贪凉饮冷，今日早上出现腹泻，泄泻清稀如水样，脘闷食少，腹痛肠鸣，头痛，肢体酸痛，舌苔白腻，脉濡缓。其诊断是

- A.腹痛寒邪内阻证
- B.胃痛脾胃虚寒证
- C.泄泻寒湿内停证
- D.腹痛中虚脏寒证
- E.泄泻肾阳虚衰证

100.陆某，女，14岁。昨日骤然痢下鲜紫脓血，腹痛剧烈，后重感特著，壮热口渴，头痛烦躁，恶心呕吐，舌质红绛，舌苔黄燥，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A.白芍汤
- B.白头翁汤
- C.驻车丸
- E.清中汤
- D.葛根芩连汤

101.童某，女，48岁。5年来目睛及肌肤发黄反复出现，黄色晦暗不泽，肢软乏力，大便溏薄，舌质淡苔薄，脉濡细。治疗此病证首选的方剂是

- A.黄芪建中汤
- B.归芍六君子汤
- C.茵陈术附汤
- D.逍遥散合鳖甲煎丸
- E.茵陈四苓散

102.杜某，女，46岁。1年来腹大胀满，形似蛙腹，朝宽暮急，面色苍黄，脘闷纳呆，肢冷浮肿，小便短少不利，舌淡胖，苔淡白，脉沉细无力。治疗此病证首选的方剂是

- A.实脾饮
- B.调营饮
- C.茵陈术附汤
- D.柴胡疏肝散合胃苓汤
- E.附子理苓汤

103.陈某，男，65岁，有前列腺肥大史7年。近1年小便不畅，尿如细线，甚则阻塞不通，小腹胀满疼痛，舌紫暗，或有瘀点，脉涩。其诊断是

- A.淋证石淋
- B.淋证劳淋
- C.癃闭脾气不升证
- D.癃闭膀胱湿热证
- E.癃闭浊瘀阻塞证

104.患者，男，32岁。皮肤出现青紫斑点5日，伴有鼻衄，口渴，便秘，舌红，苔黄，脉弦数。治疗本病首选的方剂是

- A.泻白散
- B.十灰散
- C.茜根散
- D.归脾汤
- E.黄土汤

105.患者，男，36岁。发热而欲近衣，形寒怯冷，四肢不温，少气懒言，头晕嗜卧，腰膝酸软，纳少便溏，面色白，舌质淡胖，边有齿痕，苔白润，脉沉细无力。此时的证候诊断是

- A.气虚发热证
- B.血虚发热证
- C.阴虚发热证
- D.阳虚发热证
- E.气郁发热证

106.赵某，女，66岁。右手掌指关节疼痛，痛势较剧，部位固定，遇寒则痛甚，得热则痛缓，关节屈伸不利。舌质淡，舌苔薄白，脉弦紧。其治疗应首选的方剂是

- A.宣痹汤
- B.防风汤
- C.薏苡仁汤
- D.乌头汤
- E.双合汤

107.患者一侧头痛反复发作，并常伴恶心、呕吐，对光及声音过敏者，针灸治疗除局部穴外，宜主取的是

- A.督脉及手、足太阳经穴
- B.督脉及手、足少阳经穴
- C.督脉及手、足阳明经穴
- D.足厥阴及手、足阳明经穴
- E.足厥阴及手、足少阳经穴

108.患者突然出现右半身活动不利，舌强语謇，兼眩晕头痛，烦躁，舌红，苔黄，脉弦而有力。针灸治疗除主穴外，应加用

- A.丰隆、合谷
- B.曲池、内庭
- C.太冲、太溪
- D.足三里、气海
- E.太溪、风池

109.患者3个月前突发高热，热退后出现周身乏力，下肢痿软无力，食少腹胀便溏，神疲乏力。治疗应主选的是

- A.手足少阳经穴、夹脊穴
- B.手足阳明经穴、夹脊穴
- C.手足太阳经穴、夹脊穴
- D.手足太阴经穴、夹脊穴
- E.手足厥阴经穴、夹脊穴

110.患者平素多思善疑，胆小怕事，现症精神抑郁善忧，失眠健忘，纳差，面色不华，舌淡，脉细。治疗除主穴外，还应加用

- A.膻中、期门
- B.行间、侠溪
- C.肝俞、肾俞、三阴交
- D.通里、太溪、三阴交
- E.心俞、脾俞、足三里

111.患者气逆咳嗽，引胁作痛，痰少而黏，面赤咽干，苔黄少津，脉弦数。针灸治疗应选取

- A.列缺、合谷、肺俞、风门、太渊

- B.列缺、合谷、肺俞、大椎、曲池
C.太渊、三阴交、肺俞、丰隆、阴陵泉
D.太渊、三阴交、肺俞、行间、鱼际
E.太渊、足三里、肺俞、膏肓、内庭

112.患者胃脘疼痛，时胀痛或刺痛，针灸治疗应取的腧穴是

- A.胃俞、脾俞、太冲
B.期门、阳陵泉、中脘
C.三阴交、膈俞、中脘
D.足三里、内关、中脘
E.合谷、太冲、中脘

113.患者大便排出困难，腹中冷痛，面色白，畏寒喜暖，小便清长，舌淡苔白，脉沉迟治疗除主穴外，还应加用

- A.合谷、内庭
B.太冲、中脘
C.脾俞、气海
D.神阙、关元
E.足三里、气海

114.患者烦渴多饮，口干舌燥，尿量频多，舌边尖红，苔薄黄，脉数。治疗应选用的是

- A.足阳明、手阳明、足太阴经穴
B.相应募穴、手阳明、足太阴经穴
C.相应背俞穴、足少阴、足太阴经穴
D.相应背俞穴、足少阴、手太阴经穴
E.相应募穴、足少阴、足太阴经穴

115.患者，女，25岁。月经周期不规律，经量少，色淡，腰骶酸痛，头晕，舌淡苔白，脉沉弱，针灸治疗应主选的经脉是

- A.任脉、足少阴经
B.任脉、足厥阴经
C.任脉、足太阴经
D.带脉、冲脉、任脉
E.任脉、督脉、冲脉

116.患者产后乳少，或见乳房胀满疼痛，或见乳房柔软无胀感，针灸治疗应选用

- A.乳根、太冲、期门
B.乳根、膻中、少泽
C.肝俞、太冲、期门
D.乳根、脾俞、足三里
E.中脘、天枢、期门

B1 型题答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从
中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。(117~118 题共用选项)

- A.干咳无痰，咽喉干痛，唇鼻干燥
B.咳声重浊，痰多，痰出咳平，痰黏腻色白
C.咳嗽呈阵发性，咽干口苦，胸胁胀痛
D.咳嗽痰多，质稠色黄
E.干咳，咳声短促，痰中带血丝

117.咳嗽痰热郁肺证的主症特点是

118.咳嗽痰湿蕴肺证的主症特点是

(119~120 题共用选项)

- A.滋阴止咳
- B.滋阴降火
- C.益气养阴
- D.滋阴补阳
- E.滋阴润肺

119.肺癆之气阴耗伤的治法是

120.肺癆之肺阴亏虚的治法是

(121~122 题共用选项)

- A.头昏胀痛
- B.头痛如裹
- C.昏蒙重痛
- D.刺痛、痛点固定
- E.头痛且空,腰膝酸软

121.痰浊头痛的特点是

122.瘀血头痛的特点是

(123~124 题共用选项)

- A.半夏白术天麻汤
- B.涤痰汤
- C.当归活血饮
- D.七福饮
- E.还少丹

123.治疗痴呆脾肾两虚证,应首选的方剂是

124.治疗痴呆痰浊蒙窍证,应首选的方剂是

(125~126 题共用选项)

- A.胸膈痞胀,暖气则舒
- B.胸膈刺痛,痛处固定不移
- C.食道干涩,饮食难下
- D.泛吐痰涎,胸膈满闷
- E.水饮不下,面浮足肿

125.噎膈痰浊内阻者的主症特点是

126.噎膈瘀血内结者的主症特点是

(127~128 题共用选项)

- A.大承气汤
- B.龙胆泻肝汤
- C.大黄附子汤
- D.小柴胡汤
- E.大柴胡汤

127.腹痛寒邪内阻证,若寒实积聚,大便不通者,可改用

128.腹痛湿热壅滞证,若腹痛剧烈,寒热往来,大便秘结者,可改用

(129~130 题共用选项)

- A.藿香正气散

- B.理中丸
- C.参苓白术散
- D.四神丸
- E.痛泻要方

129.治疗泄泻寒邪内盛证，首选的方剂是

130.治疗泄泻肾阳虚衰证，首选的方剂是

(131~132 题共用选项)

- A.白头翁汤
- B.芍药汤
- C.沙参麦冬汤
- D.保和丸
- E.驻车丸

131.治疗湿热痢首选的方剂是

132.治疗阴虚痢首选的方剂是

(133~134 题共用选项)

- A.调节全身阴经经气
- B.涵蓄十二经气血
- C.调节六阴经经气
- D.调节肢体运动
- E.约束纵行躯干的诸条经脉

133.带脉的功能是

134.冲脉的功能是

(135~136 题共用选项)

- A.中风脱证、虚寒、下焦病
- B.目病、咽喉病、热病
- C.头后、肩胛病，神志病
- D.中风、昏迷、热病、头面病
- E.前头、口齿、咽喉病，胃肠病

135.任脉的主治是

136.督脉的主治是

(137~138 题共用选项)

- A.井穴
- B.荣穴
- C.输穴
- D.经穴
- E.合穴

137.急救时宜选用

138.治疗热症时宜选用

(139~140 题共用选项)

- A.阳池
- B.关冲
- C.中渚
- D.外关
- E.支沟

139.手少阳三焦经的原穴是

140.手少阳三焦经的输穴是

(141~142 题共用选项)

- A.少冲
- B.中冲
- C.太渊
- D.太白
- E.太冲

141.根据子母补泻取穴法,心经实证应选用

142.根据子母补泻取穴法,心包经虚证应选用

(143~144 题共用选项)

- A.2 寸
- B.3 寸
- C.5 寸
- D.7 寸
- E.9 寸

143.偏历位于阳溪穴与曲池穴连线上,腕背侧远端横纹上

144.手三里位于阳溪穴与曲池穴连线上,肘横纹下

(145~146 题共用选项)

- A.咳喘,口渴
- B.暴暗,瘰癧
- C.瘾疹,湿疹
- D.无汗,多汗
- E.惊悸,怔忡

145.曲池穴主治的病证是

146.扶突穴主治的病证是

(147~148 题共用选项)

- A.第2趾末节内侧趾甲根角侧后方0.1寸
- B.第2趾末节外侧趾甲根角侧后方0.1寸
- C.第4趾末节内侧趾甲根角侧后方0.1寸
- D.第4趾末节外侧趾甲根角侧后方0.1寸
- E.第3趾末节内侧趾甲根角侧后方0.1寸

147.厉兑穴位于

148.足窍阴穴位于

(149~150 题共用选项)

- A.梁丘
- B.归来
- C.梁门
- D.天枢
- E.厉兑

149.治疗便秘的腧穴是

150.治疗热病的腧穴是

12345678910BBDDACEDAEA11121314151617181920EEEADEBBBB21222324252627282930DADB
BBDDADD31323334353637383940EACAACADEA41424344454647484950AECCDDADEB515253545

55657585960EEBEEDECBC61626364656667686970DBADCBDACC71727374757677787980BCABD
CCAAB81828384858687888990BDDCBCCABA919293949596979899100ADCCADDBCB101102103
104105106107108109110AEFBDDECBE111112113114115116117118119120DDCCBDBCE12112
2123124125126127128129130CDEBDBCEAD131132133134135136137138139140BEEBADABAC1
41142143144145146147148149150DBBACBBDDE140-2 试卷标码：1602
将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中医执业医师资格考试
考前全真模拟试卷（二）
（医学综合笔试部分）

报考类别：中医执业医师
第四单元考试日期：2021年8月
考试时间：14：00—16：00 考生姓名：
准考证号：
考场号：

第四单元

A1型题答题说明

每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。1.外科疾病的发生，最常见的是

- A.风、湿
- B.热、火
- C.寒、湿
- D.暑、火
- E.风、热

2.疮疡化脓时，临床常见的疼痛性质是

- A.阵发痛
- B.持续痛
- C.烧灼痛
- D.胀裂痛
- E.跳啄痛

3.痰肿的临床特点是

- A.肿势高突，根盘收束
- B.坚硬如石，皮色不变
- C.肿势软如棉或硬如馒

- D.皮紧内软，喜怒有变
E.皮肤漫肿，其色青紫
- 4.阴证疮疡的首选外敷药物是
A.冲和膏
B.阳和解凝膏
C.太乙膏
D.疯油膏
E.玉露膏
- 5.辨别蛇头疔成脓与否的简便方法是
A.痛剧而呈搏动性者
B.应指验脓法
C.穿刺验脓法
D.痛甚脉数者
E.透光验脓法
- 6.治疗颈痈风热痰凝证，应首选的方剂是
A.仙方活命饮
B.黄连解毒汤
C.五味消毒饮
D.牛蒡解肌汤
E.五神汤
- 7.哪一种有头疽易致内陷
A.项后
B.四肢
C.颜面
D.少腹部
E.臁中
- 8.下列哪项不是乳岩肿块的特点
A.无痛无热
B.皮色不变
C.表面光滑
D.质地坚硬
E.推之不移
- 9.中医的“肉瘰”相当于西医的疾病是
A.颈部肿瘤
B.颈部淋巴结肿大
C.甲状腺腺瘤
D.甲亢
E.血管瘤
- 10.四海舒郁丸用于治疗
A.乳癖肝郁痰凝证
B.乳核肝气郁结证
C.乳岩肝郁痰凝证
D.气瘰肝郁气滞证
E.肉瘰气滞痰凝证

11. 下列各项中不属血瘤的特点的是

- A. 边界不清
- B. 触之如海绵状
- C. 柔软而局限
- D. 色泽鲜红或暗紫
- E. 盘曲如蚯蚓状

12. 相当于西医的恶性肿瘤颈部淋巴结转移的疾病是

- A. 茧唇
- B. 舌菌
- C. 失荣
- D. 颈瘤
- E. 石瘰

13. 急性湿疹的主要临床表现应除外哪一项

- A. 起病急，常对称分布
- B. 有糜烂、渗出
- C. 有红斑、丘疹
- D. 剧烈瘙痒
- E. 晨僵，关节肿痛

14. 下面的哪一种情况不符合白疔的皮损特点

- A. 束状发
- B. 搔抓后易糜烂，继发感染
- C. 表面覆盖多层干燥银白色鳞屑
- D. 刮除鳞屑则露出发亮的半透明的薄膜
- E. 指甲甲板可呈顶针状凹陷

15. 皮肤病的常见自觉症状不包括

- A. 瘙痒
- B. 疼痛
- C. 恶寒
- D. 灼热
- E. 麻木

16. 血栓外痔的好发部位是

- A. 截石位 3、7、11 点
- B. 截石位 6、12 点
- C. 截石位 3、9 点
- D. 截石位 5、7 点
- E. 截石位 2、5 点

17. 肛裂疼痛的特点是

- A. 周期性疼痛
- B. 间歇性疼痛
- C. 持续性疼痛
- D. 阵发性疼痛
- E. 转移性疼痛

18. 排便或增加腹压时，肛管直肠全层和部分乙状结肠脱出，长 8 cm 以上，呈圆柱形，环状皱会消失，色红，质软，常因括约肌松弛无力，以致肛门松弛。其脱肛的临床分是

- A.I 度
- B.II 度
- C.III度
- D.IV 度
- E.V 度

19.内痔是根据以下哪个症状进行分期的

- A.脱出
- B.出血
- C.流脓
- D.痔核大小
- E.疼痛程度

20.挂线疗法应用于高位肛漏的主要优点是

- A.没有疼痛
- B.不会造成肛门失禁
- C.疗程短
- D.引流好
- E.简便

21.深静脉血栓形成的最大危险性是

- A.水肿
- B.下肢坏死
- C.肺栓塞
- D.患肢增粗
- E.浅静脉扩张

22.运动试验是哪种周围血管病常用检查手段

- A.青蛇毒
- B.臁疮
- C.动脉硬化闭塞症
- D.下肢深静脉血栓形成
- E.血栓闭塞性脉管炎

23.参苓白术散加减可用于下列何病何证

- A.脱疽寒湿阻络证
- B.臁疮气虚血瘀证
- C.股肿气虚湿阻证
- D.筋瘤劳倦伤气证
- E.恶脉湿热证

24.下列哪项不是下肢静脉曲张的并发症

- A.曲张静脉破裂出血
- B.湿疹
- C.肿胀
- D.溃疡
- E.青蛇毒

25.下列关于蛇伤扩创排毒方法的叙述,错误的是

- A.沿牙痕纵行切开
- B.作十字形切开

- C.取出遗留的毒牙
D.伤口流血不止，仍可切开
E.切开后用双氧水反复冲洗
- 26.按照中国九分法计算烧伤面积，双上肢占
A.4.5%
B.9%
C.18%
D.36%
E.42%
- 27.《傅青主女科》治疗妇科病的侧重点是
A.培补气血，调理脾胃
B.强调阴阳相互作用
C.调理气血，补益脾肾
D.重视脾肾，倡命门学说
E.调经重脾胃
- 28.阴道的功能是
A.排出月经的通道
B.排恶露之出口
C.防御外邪入侵的第一道门户
D.阴阳交合的入口
E.娩出胎儿的产门
- 29.月经先期肾气虚证的治法是
A.益气养血，止血调经
B.补益肾气，调经止血
C.补脾益气，摄血调经
D.补益肾气，固冲调经
E.补益脾肾，摄血调经
- 30.艾附暖宫丸治疗月经后期的适应证候是
A.实寒证
B.肾虚证
C.气滞证
D.痰湿证
E.虚寒证
- 31.定经汤治疗月经先后无定期的适应证候是
A.气滞血瘀证
B.肾虚证
C.肝郁肾虚证
D.痰湿证
E.脾虚肝郁证
- 32.下列各项，不属于月经过少常见证候的是
A.血瘀证
B.肾虚证
C.气滞证
D.血虚证

E.痰湿证

33.经期延长的常见证候是

- A.气虚、血热、肾虚
- B.气虚、血瘀、气滞
- C.血热、血瘀、血虚
- D.血热、肝郁、气虚
- E.气虚、血热、血瘀

34.治疗经间期出血血瘀证，应首选的方剂是

- A.少腹逐瘀汤
- B.桂枝茯苓丸
- C.逐瘀止血汤
- D.桃红四物汤
- E.血府逐瘀汤

35.崩漏的主要病机是

- A.冲任不固，不能制约经血
- B.脾虚气不统血
- C.血热迫血妄行
- D.血瘀瘀阻冲任
- E.肾虚封藏失职

36.治疗闭经肾气亏损证，应首选的方剂是

- A.加減苁蓉菟丝子丸
- B.肾气丸
- C.归脾丸
- D.右归饮
- E.大补元煎

37.下列各项，不属于痛经常见病因的是

- A.气滞血瘀
- B.阴虚血热
- C.寒凝血瘀
- D.肾气亏损
- E.湿热瘀阻

38.治疗经行乳房胀痛肝肾亏虚证，应首选的方剂是

- A.一贯煎
- B.六味地黄丸
- C.左归丸
- D.沙参麦冬汤
- E.二至丸

39.治疗经行头痛肝火证，应首选的方剂是

- A.丹栀逍遥散
- B.羚角钩藤汤
- C.天麻钩藤饮
- D.一贯煎
- E.知柏地黄汤

40.治疗经行身痛血虚证，应首选的方剂是

- A.八珍汤
- B.四物汤
- C.当归补血汤
- D.小营煎
- E.滋血汤

41.治疗经行情志异常痰火上扰证，应首选的方剂是

- A.生铁落饮加味
- B.丹栀逍遥散加味
- C.甘麦大枣汤加味
- D.血府逐瘀汤
- E.补中益气汤

42.带下过多热毒蕴结证的带下特点是

- A.带下色白或淡黄，质稀薄
- B.带下黄绿如脓，臭秽难闻
- C.带下绵绵不断，质清稀如水
- D.带下色黄或赤白相兼，质稠
- E.带下色白质黏，呈豆渣样

43.下列各项，属异位妊娠病机实质的是

- A.先天肾气不足
- B.后天脾气受损
- C.少腹血瘀
- D.气滞
- E.脉络破损

44.治疗癥瘕气滞血瘀证，应首选的方剂是

- A.少腹逐瘀汤
- B.血府逐瘀汤
- C.大黄虫丸
- D.银甲丸
- E.桂枝茯苓丸

45.下列各项，不属于急性盆腔炎诊断要点的是

- A.小腹部肌紧张、压痛、反跳痛
- B.易疲劳，劳则复发
- C.赤白带下或恶露量多
- D.宫体触压痛，拒按
- E.小腹部疼痛难忍

46.治疗不孕症肾阳虚证，应首选的方剂是

- A.济生肾气丸
- B.金匱肾气丸
- C.温胞饮
- D.温冲汤
- E.二仙汤

47.正常新生儿出生时身长是

- A.45 cm
- B.48 cm

C.50 cm

D.54 cm

E.58 cm

48.“脏腑娇嫩，行气未充”说明小儿体质特点是

A.纯阳

B.阴亏

C.阳亢

D.稚阴

E.稚阴稚阳

49.看指纹的适用年龄是

A.3 岁以内

B.3~5 岁

D.8~12 岁

C.5~8 岁

E.12~18 岁

50.小儿脾胃病变常见原因

A.纳气功能失常

B.乳食积滞

C.呼吸功能失常

D.疏泄功能失常

E.外邪易从口鼻皮毛侵入

51.小儿的用药原则，下列描述错误的是

A.治疗及时准确

B.方药精简灵巧

C.重视先治而证

D.注意顾护脾胃

E.掌握用药剂量

52.小儿断奶的适当年龄是

A.4~6 个月

B.7~9 个月

C.8~12 个月

D.1 岁半

E.2 岁

53.小儿风热感冒与风寒感冒的鉴别要点是

A.恶风发热

B.恶寒发热

C.咽红肿痛

D.咳嗽不爽

E.咳嗽频作

54.乳蛾肺胃阴虚证应首选的方剂是

A.银翘马勃散

B.牛蒡甘桔汤

C.养阴清肺汤

D.普济消毒饮

E.荆防败毒散

55.小儿肺炎喘嗽的基本病机是

A.风热闭肺

B.风寒闭肺

C.肺气闭郁

D.阴虚肺热

E.毒热闭肺

56.治疗反复呼吸道感染肺脾气虚证应首选的方剂是

A.补中益气汤

B.黄芪桂枝五物汤

C.金匱肾气丸合理中丸

D.生脉散合沙参麦冬汤

E.玉屏风散合六君子汤

57.鹅口疮的发病，可由胎热内蕴，口腔不洁，感受秽毒之邪所致。其主要病变在

A.心肝

B.心肾

C.肝肾

D.心脾

E.肺脾

58.治疗口疮风热乘脾证，应首选的方剂是

A.导赤散

B.泻黄散

C.清胃散

D.凉膈散

E.银翘散

59.下列关于泄泻的叙述，错误的是

A.一年四季均可发生

B.夏秋季节发病率高

C.以大便次数增多，粪质稀薄为特征

D.5岁以下小儿发病率高

E.久泻迁延不愈者，易转为疳证

60.治疗积滞脾虚夹积证，应首选的方剂是

A.肥儿丸

B.健脾丸

C.保和丸

D.疳积散

E.资生健脾丸

61.急惊风的“四证”是指

A.风、火、积、热

B.风、痰、热、惊

C.痰、积、惊、热

D.惊、热、痰、火

E.痰、火、积、热

62.小儿遗尿的病机主要是

- A.肾气不足，膀胱虚寒
- B.肺脾气虚，水道失约
- C.心肾失交，水火不济
- D.肝经郁热，疏泄失司
- E.脾肾气虚，下元不固

63.奶麻好发季节是

- A.冬春
- B.春夏
- C.夏秋
- D.秋冬
- E.盛夏

64.紫癜血热妄行证的治法是

- A.疏风散邪，清热凉血
- B.滋阴降火，凉血止血
- C.清热解毒，益气摄血
- D.清气凉营，活血消斑
- E.清热解毒，凉血止血

65.下列各项，可降低人群易感性的是

- A.新生儿增加
- B.非流行区人口迁入
- C.免疫人口死亡等
- D.新的传染病出现或传入
- E.接种疫苗

66.复发是指

- A.在感染某种病原体基础上再次感染同一病原体
- B.传染病患者进入恢复期后，已稳定退热一段时间，潜伏于组织内的病原体再度繁殖，使发热等初发症状再度出现
- C.传染病患者在恢复期，体温未稳定下降至正常，又再度升高
- D.人体同时感染两种或两种以上的病原体
- E.传染病痊愈以后再次发病

67.根据演变过程，一般将急性传染病分为

- A.前驱期、出疹期、恢复期
- B.初期、极期、恢复期
- C.潜伏期、前驱期、症状明显期、恢复期
- D.体温上升期、极期、体温下降期
- E.早期、中期、晚期

68.大流行是指

- A.某传染病流行范围广，甚至超过国界或洲界
- B.某种传染病在某地区近几年发病率的一般水平
- C.某种传染病在某地区的发病率高于一般水平
- D.某种传染病病例的发病时间分布高度集中于一个短时间之内
- E.某种传染病在某一地区的发病率明显增加

69.下列各项，对诊断病毒性肝炎最有意义的是

- A.病程的长短

- B.病情的轻重
- C.血清转氨酶检查
- D.病原学检查
- E.肝穿刺活检

70.肺炎型流感最常见的人群是

- A.2 岁以下儿童
- B.学龄前儿童
- C.青少年
- D.老年
- E.孕妇

71.人禽流感的主要传播途径是

- A.血液
- B.虫媒
- C.消化道
- D.呼吸道
- E.母婴

72.HIV 主要侵犯机体的部位是

- A.神经系统
- B.内分泌系统
- C.呼吸系统
- D.循环系统
- E.免疫系统

73.流行性出血热病理损害最明显的器官是

- A.心脏
- B.肝脏
- C.脑实质
- D.肾脏
- E.肺

74.下列有关狂犬病毒的叙述，正确的是

- A.属弹状病毒科
- B.DNA 病毒
- C.野毒株毒力弱
- D.固定株毒力强
- E.60℃ 10 分钟可灭活

75.有关流脑和乙脑鉴别最有意义的是

- A.外周血白细胞明显升高
- B.脑膜刺激征明显
- C.高热、头痛、呕吐、昏迷
- D.皮肤瘀点瘀斑
- E.发病季节

76.典型流脑脑脊液改变是

- A.白细胞减少，蛋白正常，糖含量正常
- B.白细胞增多，蛋白升高，糖含量明显降低
- C.白细胞增多，蛋白升高，糖含量轻度降低

- D.白细胞减少,蛋白升高,糖含量正常
E.白细胞增多,蛋白降低,糖含量正常
77.长期发热的患者,诊断伤寒最可靠的依据是

- A.玫瑰疹
B.相对缓脉
C.肥达反应阳性
D.血嗜酸粒细胞消失
E.血培养阳性

78.下列急性菌痢患者的表现不典型的是

- A.里急后重
B.发热
C.呕吐
D.腹痛
E.黏液便

79.霍乱大流行最重要的传播形式是

- A.食物污染
B.苍蝇传播
C.接触患者
D.水源污染
E.接触带菌者

80.下列不属于影响传染病潜伏期长短的因素的是

- A.病原体的种类
B.所处环境
C.机体的免疫力
D.病原体的数量
E.病原体的毒力

81.我国慢性肝炎主要为

- A.甲型肝炎
B.乙型肝炎
C.丙型肝炎
D.丁型肝炎
E.戊型肝炎

82.野鼠型流行性出血热的流行特征是

- A.四季均有发病,无明显高峰
B.春季是发病高峰
C.发病高峰呈双峰状
D.发病高峰仅见于秋冬季
E.流行高峰在夏季

83.下列关于布鲁菌病临床特征的描述,正确的是

- A.发热并伴有寒战
B.血压升高
C.关节、肌肉疼痛
D.乏力,多汗,多疲劳不堪
E.眼结膜水肿

84.下列各项，不属医院感染的是

- A.无明显潜伏期的感染，在入院 48 小时后发生的感染
- B.本次感染直接与上次住院有关
- C.有明确潜伏期的感染，自入院时算起没有超过其平均潜伏期的感染
- D.新生儿经产道时获得的感染
- E.肿瘤患者住院化疗期间出现带状疱疹 A2 型题答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。85.患者，男，37 岁。右侧大腿突然拘挛不适，步履跛行，伴恶寒发热，纳呆倦怠，患侧大腿略内收，不能伸直，妨碍行走。诊断应是

- A.环跳疽
- B.流痰
- C.流注
- D.历节风
- E.跗骨疽

86.患者，男性，67 岁。项后结块红肿溃烂 3 周。患者 3 周前项后初发结块，有粟粒样脓头，相继融合溃烂。经切开扩创后，肿势渐退，腐肉渐净，新肉已生。但 3 天来，脓水转稀薄色灰，新肉生长停滞，状如镜面，光白板亮；全身虚热不退，形神委顿，纳食日减，腹痛便泄，自汗肢冷，气息低促。舌质淡红，苔薄白或无苔，脉虚大无力。其病机是

- A.走黄
- B.内陷
- C.火陷
- D.干陷
- E.虚陷

87.患者，女，23 岁。洗澡时偶然发现左侧乳头下方可及一椭圆形肿块，不红不热，边界清楚，推之可移，无明显疼痛，乳房局部皮肤无明显异常。伴胸闷叹息，舌苔薄白，脉弦，可能的诊断是

- A.乳漏
- B.乳核
- C.乳痈
- D.乳癖
- E.乳岩

88.患者，女，25 岁，右乳肿块 2 年，初起肿块如花生粒大小，逐渐增大，近期伴乳房坠胀疼痛，胸闷叹息，烦躁易怒，月经不调，查右乳外侧肿块呈圆形，直径约 4 cm，质韧硬，表面光滑，推之活动，无压痛，乳头及腋下未见异常。苔薄，脉弦滑。其中医诊断及方药应为

- A.乳癖逍遥蒺贝散加减
- B.乳漏六味地黄汤合清骨汤加减
- C.粉刺性乳痈柴胡清肝汤加减
- D.乳腐开郁散合消痈丸加减
- E.乳核逍遥散和桃红四物汤加减

89.患者，女，20 岁。结喉两侧弥漫性肿大，边界不清，皮色如常，无疼痛，诊为气瘰。治疗应首选

- A.四海舒郁丸

- B.柴胡清肝汤
- C.海藻玉壶汤
- D.逍遥散
- E.十全流气饮

90.小儿 5 个月，头面部、四肢皮肤潮红，红斑水疱，黄水淋漓、糜烂，结黄色痂皮，瘙痒，大便偏干，小便黄赤；苔黄腻，脉滑数。属婴儿湿疹，外用适宜方法

- A.炉甘石洗剂外用
- B.黄连油、蛋黄油外搽
- C.青黛散油外搽
- D.黄柏煎水或马齿苋合剂、2% 硼酸水外用冷湿敷
- E.黄柏霜外搽

91.患者，男，30 岁。肛门周围反复流脓水 3 年。检查：肛周多处外口，指诊截石位 6 点肛窦处触及凹陷性硬结，肛管直肠环弹性良好。其诊断是

- A.低位复杂肛漏
- B.高位复杂肛漏
- C.肛门部汗腺炎
- D.低位单纯肛漏
- E.高位单纯肛漏

92.患者，男，28 岁，大便带血，血色鲜红，便后脱出，不能自行回纳，须用手送回，无疼痛，可能的诊断是

- A.脱肛（I 度脱垂）
- B.脱肛（II 度脱垂）
- C.脱肛（III 度脱垂）
- D.内痔三期
- E.内痔二期

93.患者，男，45 岁。小便不畅，尿线变细或点滴而下，小腹胀满隐痛，舌质暗或有瘀点瘀斑，苔白或薄黄，脉弦或。治疗应首选

- A.少腹逐瘀汤
- B.石韦散
- C.八正散
- D.沉香散
- E.以上都不是

94.老年消渴患者，病史近 20 年，10 年前出现足部麻木、发凉不适，近 5 年症状加重，下肢乏力，伴有足趾疼痛，三周前洗脚后出现左足破溃，近一周足部溃疡发展迅速，伴脓性分泌物，肉色灰暗，周围组织红肿，昼夜疼痛，查舌红、苔黄腻、脉弦数，辨证用方宜选

- A.黄芪鳖甲汤加减
- B.温胆汤加减
- C.四妙勇安汤加减
- D.八珍汤加减
- E.阳和汤加减

95.患者月经提前 10 天，量多，经色深红，质稠，经行不畅，有块；时有少腹胀痛，乳房胀痛，口苦咽干，经期烦躁易怒，舌红，苔薄黄，脉弦数。应首先考虑的诊断是

- A.痛经
- B.月经先期

- C.月经过多
- D.经行乳房胀痛
- E.经行情志异常

96.患者月经周期延后，量正常，色暗红，有血块，小腹胀痛，胸胁乳房胀痛；舌质正常，苔薄白，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A.逍遥散
- B.血府逐瘀汤
- C.少腹逐瘀汤
- D.柴胡疏肝散
- E.乌药汤

97.患者月经先后无定期，量少，色淡暗，质清稀，腰骶酸痛，头晕耳鸣；舌淡，苔白，脉细弱。其治法是

- A.益气调经
- B.养血调经
- C.补肾调经
- D.健脾调经
- E.疏肝调经

98.患者经行涩少，色紫暗，有血块；小腹胀痛，血块排出后胀痛减轻；舌紫暗，脉沉涩。治疗应首选的方剂是

- A.丹栀逍遥散
- B.血府逐瘀汤
- C.少腹逐瘀汤
- D.桃红四物汤
- E.乌药汤

99.患者经期延长，量多，经色紫暗，有血块；经行小腹疼痛，拒按；舌质紫暗，脉弦涩。其证候是

- A.气滞证
- B.虚热证
- C.气虚证
- D.血瘀证
- E.气滞血瘀证

100.患者经来无期，量少，淋漓不尽，血色鲜红；面颊潮红，烦热少寐，咽干口渴，便结；舌红，少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A.上下相资汤
- C.固本止崩汤
- E.大补元煎
- B.滋阴固气汤
- D.补中益气汤

101.患者经前小腹灼热胀痛不适，时痛连腰骶，经期9~10天，量偏多，血色暗红，质稠黏；平素带下量多，色黄稠有臭气，小便黄热；舌质红，苔黄腻，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A.龙胆泻肝汤
- B.解毒活血汤
- C.清热调血汤
- D.知柏地黄丸

E. 草薢渗湿汤

102. 患者经前头痛，头晕目眩，形体肥胖，胸闷泛恶，平日带多稠黏，月经量少，色淡，面色不华；舌淡胖，苔白腻，脉濡，其治法是

- A. 健脾化湿，开窍止痛
- B. 燥湿化痰，通络止痛
- C. 行气化湿，开窍止痛
- D. 活血化瘀，行气止痛
- E. 疏肝理气，通络止痛

103. 患者经行前后，大便泄泻，经色淡，质清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，畏寒肢冷；舌淡，苔白，脉沉迟。治疗应首选的方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 八珍散
- C. 补中益气汤
- D. 四神丸合健固汤
- E. 左归丸

104. 患者带下过少，甚至全无，阴部干涩灼痛，阴部萎缩，性交疼痛，甚则性交干涩困难；头晕耳鸣，膝腰酸软，烘热汗出，烦热胸闷，夜寐不安，小便黄，大便干结；舌红，少苔，脉细数。其治法是

- A. 滋补肝肾，养精益血
- B. 补血益精，活血化瘀
- C. 补益肾气，固冲调经
- D. 滋肾益阴，清热利湿
- E. 益气养血，止带调冲

105. 患者停经 45 天，一周前查尿妊娠试验阳性，近 2 天恶心，呕吐酸水，恶闻油腻，口干口苦，胸满胁痛，舌淡红，苔微黄，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A. 香砂六君子汤
- B. 橘皮竹茹汤
- C. 左金丸
- D. 小半夏加茯苓汤
- E. 加味温胆汤

106. 患者产后下肢疼痛，麻木，发硬，重着，肿胀明显，屈伸不利，小腿压痛，恶露量少，色紫暗有血块，小腹疼痛，拒按，舌暗，苔白，脉弦涩。治疗应首选的方剂是

- A. 膈下逐瘀汤加味
- B. 血府逐瘀汤加味
- C. 养荣壮肾汤加味
- D. 少腹逐瘀汤加味
- E. 身痛逐瘀汤加味

107. 患儿，11 个月。恶寒发热，鼻塞流清涕喷嚏咳嗽，咽部不红，指纹浮红。其证候是

- A. 表虚
- B. 表热
- C. 表寒
- D. 里热
- E. 表实

108. 患儿，出生 5 天，孕期 8 月早产，啼哭无力，皮肤干皱，肌肉瘠薄，四肢不温，吮乳乏

力，呛乳溢乳，腹胀腹泻，甚而水肿，指纹淡。应首选的方剂是

- A.补肾地黄丸
- B.六味地黄丸
- C.金匱肾气丸
- D.大补阴丸
- E.保元汤

109.患儿，7个月。病起1天，发热，泄泻9次，大便稀薄如水，泻下急迫，恶心呕吐，阵阵啼哭，小便短黄。治疗应首选

- A.保和丸
- B.平胃散
- C.参苓白术散
- D.藿香正气散
- E.葛根黄芩黄连汤

110.患儿，4岁。素喜煎炸食物，近两月来不思进食，食少饮多，皮肤欠润，大便干结，舌质红，苔花剥。治疗应首选

- A.增液汤
- B.养胃增液汤
- C.沙参麦冬汤
- D.养阴清肺汤
- E.增液承气汤

111.患儿，1岁2个月。近日不思乳食，暖腐酸馒，脘腹胀满疼痛，大便酸臭，烦躁啼哭，夜眠不安，手足心热，舌质红，苔黄厚腻，指纹紫滞。治疗应首选的方剂是

- A.保和丸
- B.消乳丸
- C.健脾丸
- D.八珍汤
- E.肥儿丸

112.患儿，8岁。腹部疼痛，拘急疼痛，得温则舒，遇寒痛甚，痛处喜暖，面色苍白，痛甚者额冷汗出，或兼吐泻，小便清长，舌淡，苔白滑，脉沉弦紧。证属

- A.腹部中寒
- B.乳食积滞
- C.胃肠热结
- D.脾胃虚寒
- E.气滞血瘀

113.患儿，5岁。大便秘结，欲便不得，甚或胸胁痞满，腹胀疼痛，暖气频作，舌质红，苔薄白，脉弦。治宜

- A.消积导滞通便
- B.清热润肠通便
- C.理气导滞通便
- D.益气润肠通便
- E.养血润肠通便

114.患儿，3岁。平时易患感冒，自汗，偶有盗汗，汗出以头部、肩背部汗出明显，动则尤甚，神疲乏力，面色少华，舌淡，苔薄白，脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A.桂枝汤

B.黄芪桂枝五物汤

C.黄芪建中汤

D.玉屏风散合牡蛎散

E.生脉散合当归六黄汤

115.患儿，9岁。已患心肌炎2周，寒热起伏，胸闷憋气，心悸气短，肌肉酸痛，腹痛腹泻，倦怠乏力，恶心欲吐，舌质红，苔黄腻，脉濡数。其病机是

A.风热犯心

B.湿热侵心

C.气阴亏虚

D.心阳虚弱

E.痰瘀阻络

116.男孩，9岁。平时注意力不集中，学习成绩低下，多动难静，急躁易怒，冲动任性，难以自控，夜间盗汗，大便秘结，舌质红，舌苔薄，脉细弦。其治法是

A.养心安神，健脾益气

B.滋养肝肾，平肝潜阳

C.清热泻火，化痰宁心

D.安神定志，滋养肝肾

E.调和肝脾，佐以益气

117.患儿，3岁。高热持续3天，神昏谵语，突然两目上视，口吐白沫，手足抽动，四肢厥冷。其证候是

A.湿热疫毒

B.邪陷心肝

C.风热动风

D.气营两燔

E.脾肾阳虚

118.患儿，4岁。全身明显浮肿，频咳气急，胸闷心悸，不能平卧，烦躁不宁，面色苍白，唇指青紫，舌质暗红，舌苔白腻，脉沉细无力。治疗应首选的方剂是

A.龙胆泻肝汤合羚角钩藤汤

B.五味消毒饮合小蓟饮子

C.己椒蒴黄丸合参附汤

D.玉枢丹合小蓟饮子

E.参附龙牡救逆汤合小蓟饮子

B1型题答题说明
以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。（119～120题共用选项）

A.破血、补托

B.行气、滋养

C.行气、活血

D.温阳、散寒

E.清热、除湿

119.外科疾病发于多血少气之经者，治疗时应注重

120.外科疾病发于多血多气之经者，治疗时应注重

（121～122题共用选项）

A.不致出现过敏现象

- B.柔软、滑润，无板硬、黏着不适感
- C.不会刺激皮肤引起皮炎
- D.能使疮口早日愈合
- E.富有黏性，能固定患部，使患部减少活动

121.使用膏药的主要优点是

122.使用油膏的主要优点是

(123~124 题共用选项)

- A.寻常疣
- B.丝状疣
- C.下肢丹毒
- D.息肉
- E.颈部多发性疖肿

123.适用破镰法的是

124.适用挑治法的是

(125~126 题共用选项)

- A.实证
- B.癥疾
- C.瘕证
- D.瘀证
- E.虚实夹杂证

125.下腹包块质坚，推之不动，其辨证是

126.腹块时有时不明显，按之不坚，推之可动，其辨证是

(127~128 题共用选项)

- A.脾气虚证
- B.肾气虚证
- C.阳盛血热证
- D.肝郁血热证
- E.阴虚血热证

127.患者月经先期，量多，经色深红，质稠，有块；时有少腹胀痛，乳房胀痛，口苦咽干，经期烦躁易怒，舌红，苔薄黄，脉弦数。其证候是

128.患者月经先期，量多，色紫红，质黏稠，伴心烦，面红口干，小便短黄，大便燥结；舌质红，苔黄，脉数或滑数。其证候是

(129~130 题共用选项)

- A.六味地黄丸
- B.当归地黄饮
- C.小营煎
- D.八珍汤
- E.大补元煎

129.治疗月经过少肾虚证，应首选的方剂是

130.治疗月经过少血虚证，应首选的方剂是

(131~132 题共用选项)

- A.脾虚证
- B.肾虚证
- C.血瘀证

D.血热证

E.气滞证

131.逐瘀止血汤治疗崩漏的适应证候是

132.固冲汤治疗崩漏的适应证候是

(133~134 题共用选项)

A.益气养血, 健脾利水

B.理气行滞, 养血调经

C.健脾渗湿, 理气调经

D.温肾化气, 健脾利水

E.清热利湿, 健脾利水

133.经行浮肿脾肾阳虚证的治法是

134.经行浮肿气滞血瘀证的治法是

(135~136 题共用选项)

A.调脾健运

B.消积理脾

C.补益气血

D.清心泻火, 滋阴生津

E.温阳健脾, 利水消肿

135.疳积的主要治法是

136.口疳的主要治法是

(137~138 题共用选项)

A.易于冲动, 好动难静, 容易发怒, 常不能自控

B.兴趣多变, 做事有头无尾, 记忆力差

C.脑失精明, 学习成绩低下, 记忆力欠佳, 或有遗尿、腰酸乏力

D.注意力不集中, 情绪不稳定, 多梦烦躁

E.神思涣散, 活动过多, 动作笨拙

137.儿童多动症, 其病在肝者, 临床证候是

138.儿童多动症, 其病在肾者, 临床证候是

(139~140 题共用选项)

A.发病急骤, 高热, 抽搐, 昏迷, 头痛, 项强, 舌红苔黄

B.发病较急, 突然抽搐, 神昏惊叫, 四肢厥冷, 脉乱不整

C.高热不退, 神昏抽搐, 腹痛拒按, 便下脓血, 舌红苔腻

D.面色萎黄, 嗜睡露睛, 频繁抽搐, 舌淡苔白, 脉象沉弱

E.身热形瘦, 手足心热, 肢挛强直, 舌绛少苔, 脉细弦数

139.急惊风气营两燔证的主症是

140.急惊风湿热疫毒证的主症是

(141~142 题共用选项)

A.清热利湿, 通利膀胱

B.温补肾阳, 固涩膀胱

C.温补脾肾, 升提固摄

D.清热利湿, 泻肝止遗

E.培元益气, 安神固脬

141.尿频脾肾气虚证的治法是

142.遗尿肾气不足证的治法是

(143~144 题共用选项)

- A.热、咳、涕、泪，麻疹黏膜斑
- B.热、烦、汗出，皮疹透发
- C.疹没脱屑，低热不退
- D.热、烦、渴、饮，疹稠色暗，神昏抽搐
- E.热、咳、喘、痰，疹稠色暗

143.麻疹邪犯肺卫证的主要证候是

144.麻疹邪入肺胃证的主要证候是

(145~146 题共用选项)

- A.暗红色斑丘疹
- B.玫瑰色细小斑丘疹
- C.红色细小丘疹，密集成片
- D.丘疹、疱疹、结痂同时存在
- E.疹色紫暗或紫黑，形成斑块

145.水痘的皮疹特点是

146.丹痧的皮疹特点是

(147~148 题共用选项)

- A.电离辐射
- B.紫外线
- C.超声波
- D.洗手
- E.碘类消毒

147.上述各项，属灭菌法的是

148.上述各项，属高效消毒法的是

(149~150 题共用选项)

- A.痢疾志贺菌
- B.福氏志贺菌
- C.宋内志贺菌
- D.鲍氏志贺菌
- E.舒氏痢疾杆菌

149.抵抗力最强的痢疾杆菌是

150.感染后易转为慢性的痢疾杆菌是

参考答案

12345678910BECBEDACCD11121314151617181920ECEBCCACAB21222324252627282930CCCAD
CAADE31323334353637383940CCECAABABC41424344454647484950ABCCBCCEAB51525354555
657585960CCCCCEDEDB61626364656667686970BAAEEBCAEA71727374757677787980DEDADBE
CDB81828384858687888990BCCCCBEAD919293949596979899100ADDCBECDDA10110210310
4105106107108109110CBDABECEEB111112113114115116117118119120AACDBBBCAC1211221
23124125126127128129130EBCEBCDCBC131132133134135136137138139140CADBBDACAC141
142143144145146147148149150CBABDCABCB