

月度考试

- 1、(A1 型题) 下列哪种疾病一般无脾脏肿大
 - A.慢性粒细胞性白血病
 - B.骨髓纤维化
 - C.再生障碍性贫血
 - D.慢性淋巴细胞性白血病
 - E.溶血性贫血

- 2、(A1 型题) 鉴别慢性肾盂肾炎与慢性肾小球肾炎有效的是
 - A.血尿程度
 - B.高血压程度
 - C.肾功能减退程度
 - D.蛋白尿程度
 - E.影像检查示一侧肾缩小或表面凹凸不平

- 3、(A1 型题) 我国引起慢性肾功能衰竭最常见的原因是
 - A.遗传性肾小球肾炎
 - B.慢性肾盂肾炎
 - C.慢性肾小球肾炎
 - D.糖尿病肾病
 - E.高血压肾病

- 4、(A1 型题) 促进机体产热的最主要的激素是
 - A.生长素
 - B.肾上腺素
 - C.糖皮质激素
 - D.甲状腺激素
 - E.胰岛素

- 5、(A1 型题) 1 型和 2 型糖尿病鉴别时下列临床特征中以何为主
 - A.年轻与年老
 - B.消瘦与肥胖
 - C.并发症的多少与严重程度
 - D.有无明显“三多一少”症状
 - E.有无自发性酮症倾向

- 6、(A1 型题) 幽门梗阻所致持续呕吐可造成
 - A.低氯高钾性碱中毒
 - B.缺钾性酸中毒
 - C.低氯低钾性碱中毒

- D.低氯高钠性碱中毒
E.低氯低钾性酸中毒
- 7、(A1 型题) 循环骤停是指心脏不能搏出有效的血液供给主要脏器的需要,下列叙述哪项与其不符
A.心跳微弱
B.电机械分离,心电图有心室融合波
C.心室颤动
D.一侧心室颤动而另一侧心室完全停搏
E.心脏完全停搏
- 8、(A1 型题) 深 II 度烧伤的临床表现,下列错误的是
A.创面痛觉迟钝
B.创面多有水疱
C.有时在大腿可见树枝状栓塞血管
D.如无感染,创面 3~4 周愈合
E.愈合后多有增生性瘢痕
- 9、(A1 型题) 乳腺癌第 I 期,同时患者出现血尿及膀胱刺激症状,检查后认为是癌肿转移,按国际分期,该患者属于
A.T1N1M0
B.T1N0M1
C.T2N0M0
D.T2N1M0
E.T3N1M0
- 10、(A1 型题) 关于甲亢手术治疗的适应证,不正确的是
A.高功能腺瘤
B.青少年患者
C.甲状腺肿大压迫症状
D.中度以上原发甲亢
E.抗甲状腺药物或放射性 ^{131}I 治疗无效者
- 11、(A1 型题) 乳腺的淋巴输出途径,哪一项是不正确的
A.锁骨下和锁骨上淋巴结之间互相有交通
B.两侧乳房间皮下有交通淋巴管
C.一些淋巴结位于胸大小肌之间
D.胸骨旁淋巴结主要在第 2、3 肋间,沿胸廓内动静脉分布
E.两侧胸骨旁淋巴结没有直接的淋巴交通
- 12、(A1 型题) 下列哪一种疝是由内脏构成疝囊的一部分
A.脐疝
B.腹股沟斜疝
C.滑动性疝
D.嵌顿性疝

E.腹股沟直疝

13、(A1 型题) 子宫峡部形态学特征正确的是

- A.为下宽上窄的三角形
- B.非孕时长度为 1 cm
- C.妊娠期变软不明显
- D.下端为解剖学内口
- E.上端为不同黏膜交界处

14、(A1 型题) 阵发性室上性心动过速的发生机制主要是

- A.心肌缺血
- B.洋地黄中毒
- C.高血压
- D.折返机制
- E.感染性心内膜炎

15、(A1 型题) 肾绞痛的特点是

- A.持续性的胀痛
- B.疼痛持续时间长,不易缓解
- C.上腹部剧烈绞痛
- D.泌尿系结石典型的临床表现
- E.突发性剧烈绞痛并沿输尿管向下腹部放射

16、(A1 型题) 脊柱结核与脊柱转移性肿瘤的区别主要是

- A.结核为持续性疼痛,肿瘤为夜间疼痛
- B.结核活动受限
- C.结核血沉增快
- D.X 线片表现:脊柱结核一般椎间隙消失,而肿瘤椎间隙正常
- E.病变发生于脊柱的部位、节段不同

17、(A1 型题) 关于骨软骨瘤,下列哪项错误

- A.一般应手术切除
- B.多发生于长骨干骺端
- C.多见于青少年
- D.单发,1%患者可以恶变
- E.广基底的骨软骨瘤有明显恶变倾向

18、(A1 型题) 请用 Apgar 评分法,评定以下情况的新生儿为多少分:新生儿出生后,四肢青紫,吸痰器清理呼吸道时患儿有恶心表现,四肢活动,心搏 90 次/分,呼吸浅、慢不规则

- A.10 分
- B.7 分
- C.5 分
- D.3 分
- E.0 分

- 19、(A1 型题) 正确的组合项目是
- A.滴虫性阴道炎-豆腐渣样白带
 - B.外阴阴道假丝酵母菌病-泡沫状白带
 - C.宫颈癌-米汤样白带
 - D.老年性阴道炎-脓性白带
 - E.非特异性阴道炎-血性白带
- 20、(A1 型题) 细菌性阴道病最常见的病原体是
- A.金黄色葡萄球菌
 - B.加德纳菌
 - C.大肠埃希菌
 - D.溶血性链球菌
 - E.沙眼衣原体
- 21、(A1 型题) 为确定子宫内膜不规则脱落的诊断,进行诊刮的恰当时间为
- A.月经来临时
 - B.月经第 5 日
 - C.月经第 2 日
 - D.月经来潮 12 小时内
 - E.月经任何时期均可
- 22、(A1 型题) 患者用力屏气时,阴道口可见到子宫颈已达处女膜缘,临床诊断为
- A.子宫脱垂Ⅲ度
 - B.子宫脱垂Ⅱ度轻型
 - C.子宫脱垂Ⅱ度重型
 - D.子宫脱垂Ⅰ度轻型
 - E.子宫脱垂Ⅰ度重型
- 23、(A1 型题) 关于小儿消化道的解剖特点正确的是
- A.婴儿食管的黏膜纤弱,腺体丰富
 - B.新生儿胃容量 60~80 ml
 - C.年龄越小每次喂食的量应较年长儿少
 - D.新生儿食管下段括约肌发育不成熟,常发生胃食管反流
 - E.新生儿胃呈垂直位
- 24、(A1 型题) 女婴足月顺产,出生体重 3 200 g,生后 48 小时血清总胆红素 5 $\mu\text{mol/L}$ 。在检查黄疸原因尚未明确诊断时,首选治疗方法是
- A.白蛋白输注
 - B.换血
 - C.口服苯巴比妥
 - D.光照疗法
 - E.输血浆

- 25、(A1 型题) 先天性心脏病中最常见的类型是
- A. 动脉导管未闭
 - B. 房间隔缺损
 - C. 室间隔缺损
 - D. 法洛四联症
 - E. 肺动脉狭窄
- 26、(A1 型题) 法洛四联症患者喜蹲踞, 是因为
- A. 使心脑血管供血增加
 - B. 使劳累、气急缓解
 - C. 使腔静脉回心血量增加
 - D. 缓解漏斗部痉挛
 - E. 增加体循环阻力、减少右向左分流及回心血量
- 27、(A1 型题) 降低肺心病患者肺动脉高压的关键治疗是
- A. 呼吸兴奋剂
 - B. 氧疗
 - C. 强心剂
 - D. 支气管扩张剂
 - E. 利尿剂
- 28、(A1 型题) 以下哪一项是亚急性感染性心内膜炎的主要诊断标准
- A. 基础心脏病
 - B. 超声心动图发现赘生物
 - C. 栓塞、细菌性动脉瘤
 - D. 发热, 体温 $\geq 38^{\circ}\text{C}$
 - E. 肾小球肾炎、Osler 结节
- 29、(A1 型题) 符合中枢性瘫痪的临床特征是
- A. 肌张力增高
 - B. 有肌萎缩
 - C. 肌群瘫痪为主
 - D. 腱反射消失
 - E. 无病理反射
- 30、(A1 型题) 休克患者中心静脉压升高, 血压正常, 处理原则为
- A. 使用强心药物
 - B. 用缩血管药
 - C. 充分补液
 - D. 补液试验
 - E. 用扩血管药
- 31、(A1 型题) 用九分法计算成人烧伤面积, 下列错误的是
- A. 头颈部 9%

- B.两臀部 9%
C.躯干 27%
D.两上肢 18%
E.双下肢 41%
- 32、(A1 型题) 结石梗阻胆管并继发感染时,其典型的临床表现为 Charcot 三联征,即腹痛
A.胆囊肿大和休克
B.精神症状和黄疸
C.肝区叩痛和休克
D.寒战高热和黄疸
E.腹部肿块和黄疸
- 33、(A1 型题) 创伤性肝破裂后,腹腔内积血不凝固的主要原因是
A.肝外伤后经内因的作用,凝血酶原降低
B.出血被腹腔渗出液稀释
C.肝功能异常,凝血因子生成障碍
D.肝外伤后胆汁性血腹可不凝固
E.经腹膜脱纤维作用失去纤维蛋白
- 34、(A1 型题) 下列哪种说法不正确
A.股骨干骨折常产生短缩移位
B.股骨干骨折移位与肌牵拉有关
C.儿童骨干骨折可允许 3 cm 短缩移位
D.垂直悬吊牵引适用于 3 岁以下儿童股骨干骨折
E.成人股骨干骨折可采用持续骨牵引治疗
- 35、(A1 型题) 心脏病孕妇,为防止分娩时发生心衰,下列哪项处理是错误的
A.防止产后出血应给予麦角新碱
B.尽量缩短第二产程
C.高度面罩吸氧
D.适当应用镇静剂
E.胎儿娩出后腹部放沙袋
- 36、(A1 型题) 妊娠高血压综合征基本病理生理变化中最重要的是
A.水钠潴留
B.弥散性血管内凝血
C.全身小动脉痉挛
D.胎盘绒毛退行性变
E.肾小球肿胀
- 37、(A1 型题) 有关子宫脱垂病因下列哪项不正确
A.分娩时盆底肌、筋膜以及子宫韧带过度伸展、撕裂
B.产褥期过早体力劳动
C.长期腹压增加

- D.产褥期过早性生活
E.盆底组织先天发育不良或退行性病变
- 38、(A1 型题) 关于风湿热下列哪项是错误的
- A.是一种累及多系统的炎症性疾病
B.环形红斑和皮下结节、舞蹈病最常见
C.临床表现为发热,多数伴有有关节炎心脏炎
D.初发或再发多与 A 组乙型溶血性链菌感染有关
E.发病年龄以 6~15 岁多见
- 39、(A1 型题) 关于吸入性肺脓肿,不正确的是
- A.多属厌氧菌为主的混合感染
B.好发于右上叶后段和右或左下叶背段
C.有效抗生素治疗,不应少于 8 周
D.病后 10 天咳大量脓痰,且常有恶臭味
E.空洞内壁上凹凸不平,为偏中心的空洞
- 40、(A1 型题) 使慢性粒细胞白血病达到血液学缓解的首选药物是
- A.白消安
B. α 干扰素
C.靛玉红
D.TKI
E.环磷酰胺
- 41、(A1 型题) 下列何种症状不属于精神分裂症的阳性症状
- A.妄想
B.思维形式障碍
C.生活懒散
D.怪异行为
E.幻觉
- 42、(A1 型题) 诊断休克的主要依据
- A.尿少
B.脉率变快
C.血压下降
D.动脉氧分压 < 60 mmHg
E.临床表现
- 43、(A1 型题) 乳腺癌术后必须辅以放疗、化疗的术式是
- A.保留乳房的乳腺癌根治术
B.乳腺癌扩大根治术
C.乳腺癌改良根治术
D.乳腺癌根治术
E.全乳房切除术

- 44、(A1 型题) 胃癌的主要转移途径是
- A.肝转移
 - B.淋巴转移
 - C.骨转移
 - D.肺转移
 - E.腹腔种植转移
- 45、(A1 型题) 克罗恩病的手术指征不包括
- A.肠内瘘
 - B.慢性肠穿孔
 - C.持续出血
 - D.肠管狭窄
 - E.发热、腹痛、体重下降
- 46、(A1 型题) 急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的原因是
- A.胆总管癌
 - B.胆总管末端狭窄
 - C.胆道出血继发感染
 - D.胆总管结石
 - E.先天性胆总管扩张症
- 47、(A1 型题) 肱骨外科颈的解剖部位是
- A.肱骨大小结节交界处
 - B.肱骨大小结节移行肱骨干之交界处
 - C.肱骨头周围环形沟
 - D.肱骨上端之骨端
 - E.肱骨中上 1/3 交界处
- 48、(A1 型题) 孕妇在产前检查时,手测宫底高度在脐下 1 横指,其孕周大致为
- A.24 周末
 - B.20~24 周之间
 - C.20 周末
 - D.24~28 周之间
 - E.16~20 周之间
- 49、(A1 型题) 对于宫缩乏力,应用催产素的注意事项,下列哪项是正确的
- A.适用于不协调性子宫收缩乏力
 - B.常用肌肉注射法
 - C.用药后如宫缩越强,效果越佳
 - D.出现胎儿窘迫时立即停药(宫口未开全)
 - E.适用于中骨盆,出口狭窄,第二产程延长者
- 50、(A1 型题) 苯丙酮尿症患儿临床上最突出的表现是

- A.尿和汗液有鼠尿味
B.毛发、皮肤色泽变浅
C.肌张力增高
D.智力低下
E.惊厥
- 51、(A1 型题) 以下哪项不属于新生儿生理性黄疸典型的临床表现
A.生后第 3 天出现皮肤、巩膜黄染
B.生后第 10 天黄疸基本消退
C.TBil 75 $\mu\text{mol/L}$,CB 67 $\mu\text{mol/L}$
D.ALT 30 U,AST 28 U
E.精神状态和食欲良好
- 52、(A1 型题) 以下哪种疾病较少引起亚急性感染性心内膜炎
A.室间隔缺损
B.二尖瓣狭窄合并心房颤动
C.二尖瓣关闭不全
D.主动脉瓣关闭不全
E.动脉导管未闭
- 53、(A1 型题) 癫痫的诊断最重要的辅助检查手段是
A.目睹其发作
B.头部 CT 扫描
C.脑电图改变
D.确切的病史
E.有无家族史
- 54、(A1 型题) 正常情况下胰液进入十二指肠首先被激活的是
A.激肽释放酶原
B.糜蛋白酶原
C.胰蛋白酶原
D.前磷脂酶
E.肠激酶原
- 55、(A1 型题) 胰腺癌最常见的首发症状是
A.消瘦和乏力
B.黄疸
C.消化道症状
D.上腹痛和上腹饱胀不适
E.发热
- 56、(A1 型题) 视盘水肿在临床诊断颅内病变的意义是
A.出现视盘水肿,可肯定颅内占位病变
B.无视盘水肿,可排除颅内占位病变

- C.视盘水肿,是颅内压增高的重要体征之一
D.无视盘水肿可排除颅内压增高
E.视盘水肿,对颅内占位病变性质有鉴别价值
- 57、(A1 型题) 关于产后恶露,错误的是
A.血性恶露呈鲜红色,含有大量血液
B.血性恶露可持续 3~4 天
C.白色恶露约持续 3 周
D.白色恶露呈白色,含有大量白细胞
E.浆液性恶露含有小血块及坏死蜕膜组织
- 58、(A1 型题) 胎儿窘迫的处理不正确的是
A.左卧位,氧气吸入
B.宫缩频、强而有力,可经阴道分娩
C.胎儿窘迫均应行剖宫产术
D.静脉缓注葡萄糖加维生素 C 待自然分娩
E.宫缩乏力者应加强宫缩
- 59、(A1 型题) 关于外阴阴道假丝酵母菌病,错误的是
A.白假丝酵母菌最适合繁殖的 pH 为 < 4.5 左右
B.白带呈凝乳状或豆渣状
C.应给予抗生素治疗
D.多见于糖尿病
E.假丝酵母菌平时可存在于口腔、肠道、阴道中
- 60、(A1 型题) 婴儿腹泻伴低钾血症时错误的治疗是
A.轻度低钾血症可以口服
B.补钾时速度宜快
C.静脉补钾浓度不应超过 0.3%
D.重度低钾血症需静脉补充
E.需持续补钾 4~6 天
- 61、(A1 型题) 急性肾炎小儿恢复上学的指标是
A.尿蛋白消失
B.抗链“O”正常
C.镜下血尿消失
D.血沉正常
E.阿迪计数正常
- 62、(A1 型题) 营养性缺铁性贫血,应用铁剂治疗 1 周时,最先出现的反应是
A.血清铁增加
B.网织红细胞增高
C.红细胞总数增加
D.血清铁饱和度升高

- E.血红蛋白恢复正常
- 63、(A1 型题) 满月婴儿,母乳喂养,家人要求补钙,你认为下列哪项最合适
- A.母乳喂养儿不需补充 VitD 和钙剂
 - B.添加辅食,不需补钙
 - C.应口服元素钙 200 mg/d
 - D.应补充 VitD 2 400 U/d
 - E.应补养 VitD 2 400 U/d,连续 4 周
- 64、(A1 型题) 直肠镜、乙状结肠镜、纤维光束结肠镜检查最危险的并发症是
- A.肛门撕裂引起大便失禁
 - B.引起直肠穿破
 - C.交叉感染及癌细胞种植性转移
 - D.引起直肠大出血
 - E.引起内痔出血
- 65、(A1 型题) 2 型糖尿病的基础治疗措施是
- A.双胍类降血糖药
 - B.胰岛素治疗
 - C.饮食治疗
 - D.磺脲类降糖药
 - E.噻唑烷二酮类降糖药
- 66、(A1 型题) 腹部闭合性损伤中最易损伤的实质器官是
- A.肝脏
 - B.肾脏
 - C.胰腺
 - D.脾脏
 - E.肾上腺
- 67、(A1 型题) 嵌顿性疝与绞窄性疝的根本区别是
- A.疝块迅速增大
 - B.肠壁静脉血流障碍
 - C.疝囊内有渗液积累
 - D.肠壁动脉血流障碍
 - E.发生急性机械性肠梗阻
- 68、(A1 型题) 食管癌早期确诊有效的方法是
- A.X 线食管钡透
 - B.气管镜检查
 - C.带网气囊检查
 - D.食管镜检查+病理检查
 - E.放射性核素扫描

- 69、(A1 型题) 泌尿男性生殖器结核原发灶多在
- A.膀胱
 - B.输尿管
 - C.肾
 - D.附睾
 - E.前列腺
- 70、(A1 型题) 女性胎儿卵巢开始分化发育是在妊娠
- A.15~16 周
 - B.11~12 周
 - C.9~10 周
 - D.17~18 周
 - E.13~14 周
- 71、(A1 型题) 关于胎盘的功能,不正确的是
- A.气体交换功能,可代替胎儿呼吸系统的功能
 - B.防御功能,能防止结核杆菌、梅毒等感染胎儿
 - C.排泄功能,胎儿代谢物经胎盘排出
 - D.供给营养,还具有合成和贮存物质的功能
 - E.内分泌功能,能产生多种激素
- 72、(A1 型题) 与功能性子宫出血病因无关的是
- A.青春期卵巢功能不健全
 - B.围绝经期卵巢功能衰退
 - C.IUD 放置时间过长
 - D.性激素药物使用不当
 - E.生育年龄妇女黄体发育不健全或萎缩不全
- 73、(A1 型题) 结脑的脑脊液改变错误的是
- A.外观透明或毛玻璃状
 - B.糖含量减少,氯化物正常
 - C.白细胞数在 $(50 \sim 50.0) \times 10^6/L$,分类以淋巴细胞为主
 - D.蛋白含量一般在 $1.0 \sim 3.0 g/L$
 - E.静置 12~24 小时后可有薄膜形成
- 74、(A1 型题) 最易获得的能反映婴儿营养状况的体格发育指标是
- A.头围、胸围
 - B.体重
 - C.身长
 - D.牙齿数
 - E.前囟大小
- 75、(A1 型题) 小儿卵圆孔解剖上关闭的时间是
- A.生后 1~2 岁

- B. 产后 5~7 个月 C 产后 3 个月内
C. 产后 3~4 个月
D. 产后 8~10 个月
E.
- 76、(A1 型题) 下列哪项对诊断化脓性脑膜炎脑脊液最有意义
A. 头痛、呕吐、惊厥
B. CSF 涂片找到 G+ 杆菌
C. 脑膜刺激征阳性
D. CSF 中细胞数明显增高
E. CSF 蛋白增高, 葡萄糖降低, 氯化物正常
- 77、(A1 型题) 桡骨小头半脱位常见发生年龄及常用处理方法是
A. 5~10 岁小儿, 手法复位, 三角巾悬吊
B. 5 岁以下幼儿, 手法复位, 三角巾悬吊
C. 10 岁儿童, 切开复位内固定
D. 6~8 岁小儿, 手法复位, 石膏外固定
E. 成年人, 切开复位内固定
- 78、(A2 型题) 女性, 38 岁, 四肢无力、双下肢水肿及皮下出血 2 个月, 查尿蛋白(++), 红细胞(++), ANA 1:320, 血小板 $62 \times 10^9/L$, 有光过敏。最可能的诊断是
A. 多发性肌炎
B. 慢性肾小球肾炎
C. 急性肾小球肾炎
D. 系统性红斑狼疮
E. 过敏性紫癜
- 79、(A2 型题) 男性, 45 岁, 转移性右下腹痛 12 小时。查体: 体温 $37^\circ C$, 右下腹压痛, 无肌紧张及反跳痛, 结肠充气试验阳性, 血白细胞计数 $9 \times 10^9/L$, 诊断为急性阑尾炎, 恰当的处理是
A. 抗感染、补液
B. 禁饮食
C. 及时手术
D. 抗感染
E. 胃肠减压
- 80、(A1 型题) 患者, 男性, 28 岁。胫骨开放性骨折创口不愈, 治疗 3 个月后形成窦道, 有少量脓性分泌物, 并有死骨排出。应考虑为
A. 骨结核
B. 骨肿瘤
C. 急性化脓性骨髓炎
D. 缺血性骨坏死
E. 慢性骨髓炎
- 81、(A2 型题) 女性 35 岁, 结婚 3 年未孕, 月经周期 3~4/24~25 天, 经量正常, 妇科检查: 子宫正常大小, 附件

(-) ,月经来潮 6 小时诊刮,结果为部分内膜分泌反应正常,部分分泌反应不良,本病例最可能的诊断是

- A.黄体功能不全
- B.无排卵型功能失调性子宫出血
- C.正常月经
- D.子宫内膜脱落不全
- E.子宫内结核

82、(A1 型题) 小儿,7 岁,高热、咳嗽 1 周余,干咳无痰,较剧烈,左肺下野大片阴影,一般状况良好,无呼吸困难,外周血白细胞 $13.5 \times 10^9/L$,N 55%,L 45%,血沉明显增快,本例在病因未明确时的首选药物应考虑

- A.红霉素
- B.氨苄西林
- C.青霉素
- D.氯霉素
- E.先锋霉素

83、(A2 型题) 男性,65 岁,有肺结核史 10 年,未曾正规治疗。X 线胸片示右上肺 3.5 cm 大小球形病灶,内有 2 cm 大小的空洞。水平裂增厚上移,两下肺散在钙化灶,诊断应首先考虑

- A.浸润性肺结核
- B.结核球
- C.纤维空洞性肺结核
- D.慢性血源播散型肺结核
- E.慢性肺脓肿

84、(A2 型题) 男性,21 岁。右侧肢体抽搐 2 年,突然昏迷 1 小时,查体:神志浅昏迷,左侧肢体偏瘫。CT 显示右额叶脑内血肿,临床诊断最可能是

- A.原发性癫痫
- B.脑动脉硬化
- C.高血压脑病
- D.脑动脉瘤
- E.脑血管畸形

85、(A2 型题) 男,25 岁。上腹部刀割样疼痛 2 小时,并迅速转移至右下腹。查体:全腹压痛,伴反跳痛及肌紧张,肠鸣音消失,肝浊音界缩小。最可能的诊断是

- A.急性阑尾炎穿孔
- B.急性胆囊炎
- C.急性胰腺炎
- D.十二指肠溃疡穿孔
- E.急性肠梗阻

86、(A2 型题) 某初产妇妊娠 40 周,估计胎儿体重可达 4 000 g,因宫口开大缓慢,以 5%葡萄糖+催产素 5 U 静脉点滴,但产妇烦躁不安,疼痛难忍,腹部检查发现病理缩复环且有压痛,胎心尚在正常范围内,血性尿。其处理方法为

- A.继续滴催产素,待宫口开全后做会阴切开助产
- B.产钳术助产

- C. 停滴催产素并立即剖宫产
- D. 会阴切开后头皮钳牵引助产
- E. 胎头吸引术助产

87、(A2 型题) 4 个月患儿,被外院拟诊婴儿腹泻,中度脱水,经补液后脱水征消失,但突然出现呼吸变浅,反应差,腹胀而转来院。体检:体温 36.8℃,心率 140 次/分,呼吸 28 次/分,精神萎靡,面色苍白,前囟平,皮肤弹性可。心音低,腹胀,肠鸣音 1~2 次/分,膝反射消失。最可能的诊断是

- A. 败血症
- B. 低钾血症
- C. 中毒性心肌炎
- D. 重症肌无力
- E. 中毒性肠麻痹

88、(A2 型题) 女性,32 岁,反复突发心悸、心慌、胸闷伴尿频 5 年,今无诱因症状再现,持续 1 小时来院急诊,心电图示:心率 150~250 次/分,P 波在 II、III、AVF 导联倒置,QRS 波群时限及形态均正常并与 P 波保持固定关系,其诊断应是

- A. 快速心房扑动
- B. 窦性心动过速
- C. 快速心房颤动
- D. 阵发性室上性心动过速
- E. 短阵室性心动过速

89、(A2 型题) 女性,45 岁,上腹痛一天伴恶心呕吐,2 小时前出现全腹痛,右下腹压痛,反跳痛,腹肌紧张。结肠充气试验阳性,白细胞 $24 \times 10^9/L$ 应诊断为

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性阑尾炎穿孔
- C. 上消化道穿孔
- D. 急性胆囊炎
- E. 右侧输尿管结石

90、(A1 型题) 男性,31 岁,下腹部外伤 6 小时,患者出现小腹隐痛伴排尿困难,试插导尿管可以顺利进入膀胱,注入 50 ml 生理盐水后抽出不足 50 ml,反复注入均如此,此种情况应首先考虑

- A. 后尿道断裂
- B. 膀胱破裂
- C. 输尿管损伤
- D. 膀胱损伤合并尿道损伤
- E. 前尿道断裂

91、(A2 型题) 女性,30 岁,因阴道出血切除子宫,病理检查见子宫肌壁内有水泡样组织,镜下见增生的滋养细胞,该患者可能为

- A. 绒毛膜癌
- B. 葡萄胎
- C. 子宫内膜炎
- D. 子宫内膜癌

E.侵蚀性葡萄胎

92、(A2型题)男婴,1岁,发现双下肢青紫1个月。查体:胸骨左缘第2肋间可闻及粗糙响亮的连续性机器样杂音,诊断考虑

- A.动脉导管未闭
- B.室间隔缺损
- C.房室间隔缺损
- D.法洛四联症
- E.肺动脉狭窄

93、(A2型题)男性,46岁,反复咳嗽、咳痰、喘5年余,冬季加重,1周前上述症状加重,经治疗无效住院。体检:胸廓对称,双肺干湿啰音,X线胸片示双肺纹理增强,其诊断可能为

- A.慢性支气管炎急性发作
- B.慢性喘息型支气管炎迁延期
- C.慢性支气管炎迁延期
- D.慢性喘息型支气管炎急性发作
- E.慢性喘息型支气管炎缓解期

94、(A2型题)女性,32岁,蛋白尿2年,尿少1周入院,全身凹陷性水肿,血压正常,血白蛋白11g/L,肾功能正常,尿蛋白10g/24h,诊断肾病综合征。哪项处理不当

- A.卧床休息
- B.低盐、正常蛋白饮食
- C.静脉输注白蛋白
- D.肾上腺皮质激素首选
- E.利尿剂消肿

95、(A2型题)男性,28岁,无意中发现甲状腺肿块15天,近3天来似有增大,99mTc扫描示“冷结节”,碘甲状腺扫描示冷结节处有放射性浓聚,甲状腺B超结果为实质性肿块,最可能的诊断是

- A.甲状腺癌
- B.青春期甲状腺肿
- C.甲状腺腺瘤并囊内出血
- D.结节性甲状腺肿
- E.单纯性甲状腺肿

96、(A2型题)女性,65岁,近半年来反复出现头痛,头晕,今晨在突然转头时感眩晕耳鸣,恶心呕吐,摔倒在地,2分钟后缓解。既往曾类似发作2次,X线片示颈5~6椎体后缘骨质增生,椎间孔明显缩小,最可能的诊断是

- A.神经根型颈椎病
- B.椎动脉型颈椎病
- C.交感神经型颈椎病
- D.脊髓型颈椎病
- E.癫痫发作

97、(A2型题)女性,50岁,妇科检查见宫颈肥大,表面呈糜烂状外观,阴道前穹隆变浅,近宫颈处质硬。盆腔检查未见异常,病理示宫颈鳞癌侵犯间质。其最佳治疗方案为

- A.单纯子宫切除术
- B.扩大子宫全切除术
- C.次广泛子宫切除术
- D.广泛性子官切除术+盆腔淋巴结清扫术
- E.子宫全切除术+双侧附件切除术

98、(A2型题) 7个月女婴,呕吐、水样便2天,大便每天10次,高热1天,汗多,进食少,尿少,口渴。查体:烦躁不安,肢体温暖,皮肤弹性差,心、肺正常,膝反射亢进。补充累积损失量应首选

- A.3:2:2液 50~60 ml/kg
- B.3:2液 50~60 ml/kg
- C.1/3张 60~80 ml/kg
- D.1/2张 80~100 ml/kg
- E.10%葡萄糖液 60~80 ml/L

99、(A2型题) 患者,男性,32岁,农民。面部浮肿,乏力一个月。双耳廓可见冻疮样皮疹,双手指、足趾掌侧可见充血性红斑,尿蛋白(++++) ,颗粒管型(++) ,ANA(+) H型,最可能的诊断是

- A.干燥综合征
- B.SLE
- C.急进性肾炎
- D.慢性肾炎
- E.SLE+干燥综合征

100、(A1型题) 患者胸部受伤,急诊入院,经吸氧,呼吸困难无好转,有发绀,休克。查体:左胸饱满,气管向右移位,左侧可触及骨擦音,叩之鼓音,听诊呼吸音消失,皮下气肿明显,诊断首先考虑是

- A.肋骨骨折
- B.张力性气胸
- C.闭合性气胸
- D.血心包
- E.肋骨骨折并张力性气胸

101、(A2型题) 右前臂尺桡骨开放性骨折,清创复位,石膏外固定后36小时,患者高热,脉快,白细胞计数明显增高,伤口剧痛,有大量恶臭渗出液,x线片显示皮下有气体,触诊有握雪感,应首先考虑

- A.血肿吸收
- B.气性坏疽
- C.伤口严重化脓感染
- D.组织坏死
- E.骨筋膜室综合征

102、(A2型题) 女性,47岁,月经正常无不适。普查时发现子宫前壁肌瘤,直径3cm左右。下列哪项叙述是错误的

- A.单纯子宫肌瘤且无贫血、压迫症状,可不必手术
- B.若肌瘤生长迅速可手术治疗
- C.若肌瘤在患者绝经后仍继续生长,宜手术治疗
- D.若肌瘤产生膀胱压迫症状,需手术治疗

E. 肌瘤已长大且患者年龄亦大, 恶变机会增多; 宜及早手术治疗

103、(A2 型题) 女性 24 岁, G1P0, 既往有附件区不均匀包块史, 有痛经, 可耐受, 末次月经 8 月 26 日。于 9 月 22 日突发下腹部剧烈疼痛, 查体: T 37.5 °C, P 90 次/分, 盆腔包块消失, 下腹部压痛 (+), 反跳痛 (+), 移动性浊音 (±), B 超示盆腔积液, 尿妊娠试验 (-), 后穹窿触痛 (+)。最可能的诊断是

- A. 宫外孕破裂
- B. 卵巢囊肿蒂扭转
- C. 急性盆腔炎
- D. 巧克力囊肿破裂
- E. 急性阑尾炎

104、(A2 型题) 男, 1 岁。智能落后, 表情呆滞, 皮肤毛发色素减少, 有癫痫样发作, 尿有鼠臭味。此患儿最可能的诊断是

- A. 苯丙酮尿症
- B. 软骨发育不良
- C. 维生素 D 缺乏病
- D. 先天性甲状腺功能减低症
- E. 唐氏综合征

105、(A2 型题) 女性, 24 岁, 发热、腰痛 3 天, 体温 38 °C, 巩膜黄染, 肝肋下 1.0 cm, 脾肋下 4 cm, 尿胆原 (++) , 血清胆红素 25 μmol/L, Hb 80 g/L, WBC 13.0×10⁹/L, 血象可见晚幼红细胞, 骨髓增生明显活跃, 中晚幼红细胞增多, 粒红比 0.8 : 1, 最可能的诊断为

- A. 急性黄疸性肝炎
- B. 自身免疫性溶血性贫血
- C. 急性红白血病
- D. 慢性肝炎急性发作
- E. 巨幼细胞贫血

106、(A2 型题) 某患者因急性阑尾炎穿孔手术, 切除术后 6 天, 腹部胀痛不适, 呈持续性, 伴恶心呕吐, 未排便排气。查体: 全腹胀, 肠鸣音消失, 腹部 X 线平片, 小肠及结肠均有多量充气-液气平面, 进一步应采取

- A. 剖腹探查
- B. 全胃肠钡餐透视
- C. 腹腔穿刺, 灌洗
- D. 胃肠减压支持疗法
- E. 以上均不合适

107、(A2 型题) 青年男患, 右膝关节慢性肿痛半年, 活动障碍, 但皮肤色泽正常, X 线片示关节间隙变窄, 诊断考虑为

- A. 全关节结核
- B. 单纯滑膜结核
- C. 单纯骨结核
- D. 化脓性关节炎
- E. 化脓性骨髓炎合并关节炎

108、(A2 型题) 宫内孕 8 周,在当地行“药物流产”后排出血块及膜样组织 2 周,近 1 周来阴道出血及下腹疼痛,伴有畏寒、发热,妇查下腹压痛,宫颈口检查有臭味,子宫如孕 40 天大小,明显压痛,体温 38.5℃,白细胞增高,应该

- A.立即行清宫术
- B.口服己烯雌酚 5 mg 每日 3 次,共 5 天
- C.应用缩宫素待残留组织自然排出
- D.边抗炎边用缩宫素
- E.抗生素控制感染后刮宫

109、(B1 型题) 意识清楚,有评论性幻听,有关系妄想

- A.脑衰弱综合征
- B.躁狂状态
- C.偏执状态
- D.情感淡漠
- E.缄默状态

110、(B1 型题) 意识清楚,思维奔逸高涨,言语动作增多

- A.脑衰弱综合征
- B.躁狂状态
- C.偏执状态
- D.情感淡漠
- E.缄默状态

111、(B1 型题) 前置胎盘

- A.无痛性反复阴道出血
- B.分娩阻滞形成病理缩复环,伴少量阴道出血
- C.阴道外出血量和贫血程度不一致伴腹痛
- D.分娩阻滞,剧烈腹痛后宫缩停止,病情恶化
- E.阴道流血性黏液

112、(B1 型题) 子宫破裂

- A.无痛性反复阴道出血
- B.分娩阻滞形成病理缩复环,伴少量阴道出血
- C.阴道外出血量和贫血程度不一致伴腹痛
- D.分娩阻滞,剧烈腹痛后宫缩停止,病情恶化
- E.阴道流血性黏液

113、(B1 型题) 幽门梗阻患者可发生

- A.呼吸性碱中毒
- B.代谢性酸中毒
- C.呼吸性酸中毒
- D.代谢性碱中毒
- E.呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

114、(B1型题)临床上外科最常见的酸碱失衡是

- A.呼吸性碱中毒
- B.代谢性酸中毒
- C.呼吸性酸中毒
- D.代谢性碱中毒
- E.呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

115、(B1型题)后颅窝骨折常出现

- A.熊猫眼征
- B.乳突部皮下淤血斑
- C.面神经损伤
- D.腰穿脑脊液呈血性
- E.逆行性遗忘

116、(B1型题)脑挫裂伤常出现

- A.熊猫眼征
- B.乳突部皮下淤血斑
- C.面神经损伤
- D.腰穿脑脊液呈血性
- E.逆行性遗忘

117、(B1型题)

- A.鲜红血便
- B.创伤后呕血
- C.出血伴腹痛、发热
- D.呕血及黑便
- E.出血来势凶猛,以呕血为主

118、(B1型题)食管、胃底静脉曲张破裂出血

- A.鲜红血便
- B.创伤后呕血
- C.出血伴腹痛、发热
- D.呕血及黑便
- E.出血来势凶猛,以呕血为主

119、(B1型题)胆道出血

- A.鲜红血便
- B.创伤后呕血
- C.出血伴腹痛、发热
- D.呕血及黑便
- E.出血来势凶猛,以呕血为主

120、(B1型题)应激性溃疡

- A.鲜红血便

- B.创伤后呕血
C.出血伴腹痛、发热
D.呕血及黑便
E.出血来势凶猛,以呕血为主
- 121、(B1型题)二尖瓣狭窄
- A.心尖部舒张中晚期隆隆样杂音
B.胸骨左缘3肋间舒张期叹气样杂音
C.心尖部全收缩期吹风样杂音
D.胸骨右缘2肋间收缩期喷射性杂音
E.胸骨左缘4、5肋间收缩期杂音
- 122、(B1型题)主动脉瓣关闭不全
- A.心尖部舒张中晚期隆隆样杂音
B.胸骨左缘3肋间舒张期叹气样杂音
C.心尖部全收缩期吹风样杂音
D.胸骨右缘2肋间收缩期喷射性杂音
E.胸骨左缘4、5肋间收缩期杂音
- 123、(B1型题)初次免疫应答最早出现的抗体是
- A.IgA
B.IgD
C.IgE
D.IgG
E.IgM
- 124、(B1型题)再次免疫应答的主要抗体是
- A.IgA
B.IgD
C.IgE
D.IgG
E.IgM
- 125、(B1型题)枕骨大孔疝最大的风险是
- A.头痛、呕吐,视盘水肿
B.呼吸骤停
C.昏迷,患者瞳孔散大,对侧肢体偏瘫
D.血压升高,脉搏变慢,呼吸节律减慢
E.烦躁,高热,去脑强直发作
- 126、(B1型题)小脑幕切迹典型临床表现是
- A.头痛、呕吐,视盘水肿
B.呼吸骤停
C.昏迷,患者瞳孔散大,对侧肢体偏瘫

- D. 血压升高, 脉搏变慢, 呼吸节律减慢
E. 烦躁, 高热, 去脑强直发作
- 127、(B1 型题) 库欣反应包括
- A. 头痛、呕吐, 视盘水肿
B. 呼吸骤停
C. 昏迷, 患者瞳孔散大, 对侧肢体偏瘫
D. 血压升高, 脉搏变慢, 呼吸节律减慢
E. 烦躁, 高热, 去脑强直发作
- 128、(B1 型题) 对乳腺癌主要关注的播散方式是
- A. 淋巴转移
B. 血行转移和淋巴转移
C. 直接蔓延和种植
D. 直接蔓延和淋巴转移
E. 血行转移
- 129、(B1 型题) 胃癌主要的播散方式是
- A. 淋巴转移
B. 血行转移和淋巴转移
C. 直接蔓延和种植
D. 直接蔓延和淋巴转移
E. 血行转移
- 130、(B1 型题) 对于结肠癌主要关注的播散方式是
- A. 淋巴转移
B. 血行转移和淋巴转移
C. 直接蔓延和种植
D. 直接蔓延和淋巴转移
E. 血行转移
- 131、(A3/A4 型题) 男性, 32 岁。突然短暂意识丧失, 肢体抽搐, 醒后剧烈头痛、呕吐。体检: 神志模糊, 瞳孔右 0.8 cm、左 0.3 cm, 肢体有自主活动, 颈有抵抗。右侧眼底玻璃体下片状出血, 体温 37 °C, 血压 130/75 mmHg。临床的第一个诊断是
- A. 癫痫
B. 脑出血
C. 急性硬膜下出血
D. 脑膜炎
E. 蛛网膜下腔出血
- 132、(A3/A4 型题) 男性, 32 岁。突然短暂意识丧失, 肢体抽搐, 醒后剧烈头痛、呕吐。体检: 神志模糊, 瞳孔右 0.8 cm、左 0.3 cm, 肢体有自主活动, 颈有抵抗。右侧眼底玻璃体下片状出血, 体温 37 °C, 血压 130/75 mmHg。辅助检查首先考虑
- A. 头颅 CT

- B.腰穿脑脊液检查
- C.脑电图
- D.血白细胞计数
- E.心电图

133、(A3/A4 型题) 男性,32 岁。突然短暂意识丧失,肢体抽搐,醒后剧烈头痛、呕吐。体检:神志模糊,瞳孔右 0.8 cm、左 0.3 cm,肢体有自主活动,颈有抵抗。右侧眼底玻璃体下片状出血,体温 37℃,血压 130/75 mmHg。治疗中哪一项是不正确的

- A.绝对卧床休息
- B.抗癫痫药物,如苯妥英钠等
- C.钙通道阻滞剂,如尼莫地平等
- D.大剂量止血剂
- E.保持大便通畅

134、(A3/A4 型题) 女性,30 岁,原发不孕,进行性痛经 3 年,妇科检查:子宫正常大小,后位,欠活动,后穹隆触及 2~3 个痛性结节。该患者可能的诊断是

- A.子宫内膜异位症
- B.多囊卵巢综合征
- C.盆腔炎性疾病
- D.盆腔结核
- E.子宫肌瘤

135、(A3/A4 型题) 女性,30 岁,原发不孕,进行性痛经 3 年,妇科检查:子宫正常大小,后位,欠活动,后穹隆触及 2~3 个痛性结节。异位内膜最常侵犯的部位

- A.腹膜脏层
- B.胸膜
- C.子宫
- D.卵巢及宫骶韧带
- E.直肠子宫陷凹

136、(A3/A4 型题) 女性,30 岁,原发不孕,进行性痛经 3 年,妇科检查:子宫正常大小,后位,欠活动,后穹隆触及 2~3 个痛性结节。该患者的首选治疗方法为

- A.雄激素治疗
- B.丹那唑治疗
- C.腹腔镜子宫内膜异位症病灶切除
- D.子宫次全切除术
- E.促排卵治疗

137、(A3/A4 型题) 男,53 岁,因心前区不适 2 小时入院,入院时化验 SCr 82 mmol/L,既往有糖尿病史 5 年,入院后第 2 天行冠脉造影,第 4 天复查 SCr 256 mmol/L,尿量无明显减少。该病可诊断为

- A.心肾综合征
- B.肾结石致梗阻性肾病
- C.前列腺肥大
- D.造影剂肾损害、急性肾损伤

E.糖尿病肾病

138、(A3/A4 型题) 男,53 岁,因心前区不适 2 小时入院,入院时化验 SCr 82 mmol/L,既往有糖尿病史 5 年,入院后第 2 天行冠脉造影,第 4 天复查 SCr 256 mmol/L,尿量无明显减少。最好的治疗方法为

- A.积极控制血糖
- B.治疗心脏病
- C.10%葡萄糖酸钙溶液静注
- D.5%碳酸氢钠溶液静注
- E.补液、利尿,必要时透析疗法

139、(A3/A4 型题) 男,53 岁,因心前区不适 2 小时入院,入院时化验 SCr 82 mmol/L,既往有糖尿病史 5 年,入院后第 2 天行冠脉造影,第 4 天复查 SCr 256 mmol/L,尿量无明显减少。下列哪些检查对诊断最有帮助

- A.B 超
- B.双肾 CT
- C.病史及肾穿刺活检
- D.IVP
- E.肾功能

140、(A3/A4 型题) 男性,30 岁。右髌部疼痛 1 年,伴低热、盗汗、纳差及体重减轻。查体:右髌关节呈屈曲畸形,活动受限,Thomas 征 (+),ESR 30 mm/h。X 线片示右髌关节间隙变窄,关节面有骨质破坏,右髌臼有直径 2 cm 大小空洞,内有坏死骨片。最可能的诊断是

- A.化脓性髌关节炎
- B.全髌关节结核
- C.髌关节骨型结核
- D.髌关节滑膜结核
- E.类风湿髌关节炎

141、(A3/A4 型题) 男性,30 岁。右髌部疼痛 1 年,伴低热、盗汗、纳差及体重减轻。查体:右髌关节呈屈曲畸形,活动受限,Thomas 征 (+),ESR 30 mm/h。X 线片示右髌关节间隙变窄,关节面有骨质破坏,右髌臼有直径 2 cm 大小空洞,内有坏死骨片。最佳治疗方案是

- A.立即进行病灶清除
- B.髌人字形石膏固定
- C.患肢持续皮肤牵引
- D.关节穿刺抽脓,注入抗结核药物
- E.抗结核治疗 2~4 周后行病灶清除术

142、(A3/A4 型题) 男性,30 岁。右髌部疼痛 1 年,伴低热、盗汗、纳差及体重减轻。查体:右髌关节呈屈曲畸形,活动受限,Thomas 征 (+),ESR 30 mm/h。X 线片示右髌关节间隙变窄,关节面有骨质破坏,右髌臼有直径 2 cm 大小空洞,内有坏死骨片。在治疗期间右髌大转子处出现 8 cm×6 cm 大小包块,表面皮肤红热,有波动感,体温 39℃,为了解包块的性质,下列穿刺进针部位的选择哪项最正确

- A.于脓肿外周健康皮肤处
- B.于脓肿低位处
- C.于脓肿高位处
- D.于脓肿波动明显处

E.只要能抽出脓液,进针部位不限

143、(A3/A4 型题) 男性,45 岁,近 2 个月出现肝区疼痛,乏力,消瘦明显,消化不良,腹胀,食欲减退,无黄疸。查体:肝右肋下可触及 3.0 cm,移动性浊音 (-),诊断肝癌。对诊断有重要意义的实验室检查是

- A.血常规
- B.AFP
- C.肝功
- D.肝炎系列
- E.血浆蛋白测定

144、(A3/A4 型题) 男性,45 岁,近 2 个月出现肝区疼痛,乏力,消瘦明显,消化不良,腹胀,食欲减退,无黄疸。查体:肝右肋下可触及 3.0 cm,移动性浊音 (-),诊断肝癌。诊断价值不大的检查是

- A.CT
- B.ERCP
- C.MRI
- D.B 超
- E.ECT

145、(A3/A4 型题) 男性,45 岁,近 2 个月出现肝区疼痛,乏力,消瘦明显,消化不良,腹胀,食欲减退,无黄疸。查体:肝右肋下可触及 3.0 cm,移动性浊音 (-),诊断肝癌。在可能实施的情况下,治疗最有效的方法是

- A.肝动脉栓塞
- B.肝动脉结扎
- C.手术切除病灶
- D.化疗
- E.60 钴照射

146、(A3/A4 型题) 男性,50 岁。间歇性无痛性全程肉眼血尿半年,尿脱落细胞检查,可见恶性肿瘤细胞。该患者的诊断,下述哪项是错误的

- A.肾盂癌
- B.膀胱癌
- C.输尿管癌
- D.前列腺瘤
- E.肾盏癌

147、(A3/A4 型题) 男性,50 岁。间歇性无痛性全程肉眼血尿半年,尿脱落细胞检查,可见恶性肿瘤细胞。为进一步明确诊断,下列哪项检查意义不大

- A.B 超检查
- B.肾图
- C.膀胱镜检查
- D.尿路造影
- E.CT 检查

148、(A3/A4 型题) 男性,50 岁。间歇性无痛性全程肉眼血尿半年,尿脱落细胞检查,可见恶性肿瘤细胞。检查后发现该患者上尿路正常,左输尿管口上方 0.5 cm 处有 2 cm×2 cm 基底宽的乳头状肿瘤,应采取的最佳治疗

方案是

- A.膀胱部分切除
- B.左肾、输尿管及膀胱部分切除
- C.经尿道膀胱肿瘤切除术
- D.膀胱部分切除+输尿管膀胱再植
- E.膀胱肿瘤单纯切除术

149、（A3/A4 型题）女性,52 岁,阴道不规则出血 1 年余,分泌物有臭味,宫颈呈菜花样,左侧宫旁组织增厚,达盆壁,阴道下 1/3 处质硬,不平。为确诊应行

- A.阴道脱落细胞检查
- B.宫颈活体组织检查
- C.宫颈碘试验
- D.阴道镜检查
- E.宫腔镜检查

150、（A3/A4 型题）女性,52 岁,阴道不规则出血 1 年余,分泌物有臭味,宫颈呈菜花样,左侧宫旁组织增厚,达盆壁,阴道下 1/3 处质硬,不平。临床分期正确的是

- A.IV 期
- B.III 期
- C.II 期
- D.I 期
- E.0 期

答案

1、正确答案：C

答案解析：无

2、正确答案：E

答案解析：无

3、正确答案：C

答案解析：无

4、正确答案：D

答案解析：无

5、正确答案：E

答案解析：无

6、正确答案：E

答案解析：无

7、正确答案：A

答案解析：无

8、正确答案：C

答案解析：无

9、正确答案：B

答案解析：无

10、正确答案：B

答案解析：无

11、正确答案：E

答案解析：无

12、正确答案：C

答案解析：无

13、正确答案：B

答案解析：无

14、正确答案：D

答案解析：无

15、正确答案：E

答案解析：无

16、正确答案：D

答案解析：无

17、正确答案：A

答案解析：无

18、正确答案：B

答案解析：无

19、正确答案：

答案解析：无 C

20、正确答案：B

答案解析：无

21、正确答案：B

答案解析：无

22、正确答案：E

答案解析：无

23、正确答案：D

答案解析：无

24、正确答案：D

答案解析：无

25、正确答案：C

答案解析：无

26、正确答案：E

答案解析：无

27、正确答案：B

答案解析：无

28、正确答案：B

答案解析：无

29、正确答案：A

答案解析：无

30、正确答案：E

答案解析：无

31、正确答案：B

答案解析：无

32、正确答案：D

答案解析：无

33、正确答案：E

答案解析：无

34、正确答案：C

答案解析：无

35、正确答案：A

答案解析：无

36、正确答案：C

答案解析：无

37、正确答案：D

答案解析：无

38、正确答案：B

答案解析：无

39、正确答案：E

答案解析：无

40、正确答案：D

答案解析：无

41、正确答案：C

答案解析：无

42、正确答案：E

答案解析：无

43、正确答案：A

答案解析：无

44、正确答案：B

答案解析：无

45、正确答案：E

答案解析：无

46、正确答案：D

答案解析：无

47、正确答案：B

答案解析：无

48、正确答案：C

答案解析：无

49、正确答案：D

答案解析：无

50、正确答案：A



答案解析：无

51、正确答案：C

答案解析：无

52、正确答案：B

答案解析：无

53、正确答案：C

答案解析：无

54、正确答案：C

答案解析：无

55、正确答案：D

答案解析：无

56、正确答案：C

答案解析：无

57、正确答案：E

答案解析：无

58、正确答案：C

答案解析：无

59、正确答案：C

答案解析：无

60、正确答案：B

答案解析：无

61、正确答案：D

答案解析：无

62、正确答案：B

答案解析：无

63、正确答案：D

答案解析：无

64、正确答案：B

答案解析：无

65、正确答案：C

答案解析：无

66、正确答案：D

答案解析：无

67、正确答案：D

答案解析：无

68、正确答案：D

答案解析：无

69、正确答案：C

答案解析：无

70、正确答案：B

答案解析：无

71、正确答案：B

答案解析：无

72、正确答案：C

答案解析：无

73、正确答案：B

答案解析：无

74、正确答案：B

答案解析：无

75、正确答案：B

答案解析：无

76、正确答案：B

答案解析：无

77、正确答案：B

答案解析：无

78、正确答案：D

答案解析：无

79、正确答案：C

答案解析：无

80、正确答案: E

答案解析: 无

81、正确答案: A

答案解析: 无

82、正确答案: A

答案解析: 无

83、正确答案: C

答案解析: 无

84、正确答案: E

答案解析: 无

85、正确答案: D

答案解析: 无

86、正确答案: C

答案解析: 无

87、正确答案: B

答案解析: 无

88、正确答案: D

答案解析: 无

89、正确答案: B

答案解析: 无

90、正确答案: B

答案解析: 无

91、正确答案: E

答案解析: 无

92、正确答案: A

答案解析: 无

93、正确答案: D

答案解析: 无

94、正确答案: C

答案解析：无

95、正确答案：A

答案解析：无

96、正确答案：B

答案解析：无

97、正确答案：D

答案解析：无

98、正确答案：C

答案解析：无

99、正确答案：B

答案解析：无

100、正确答案：E

答案解析：无

101、正确答案：B

答案解析：无

102、正确答案：E

答案解析：无

103、正确答案：D

答案解析：无

104、正确答案：A

答案解析：无

105、正确答案：B

答案解析：无

106、正确答案：D

答案解析：无

107、正确答案：A

答案解析：无

108、正确答案：E

答案解析：无

109、正确答案：C

答案解析：无

110、正确答案：B

答案解析：无

111、正确答案：A

答案解析：无

112、正确答案：D

答案解析：无

113、正确答案：D

答案解析：无

114、正确答案：B

答案解析：无

115、正确答案：B

答案解析：无

116、正确答案：B

答案解析：无

117、正确答案：D

答案解析：无

118、正确答案：E

答案解析：无

119、正确答案：C

答案解析：无

120、正确答案：B

答案解析：无

121、正确答案：A

答案解析：无

122、正确答案：B

答案解析：无

123、正确答案：E

答案解析：无

124、正确答案：D

答案解析：无

125、正确答案：B

答案解析：无

126、正确答案：C

答案解析：无

127、正确答案：D

答案解析：无

128、正确答案：B

答案解析：无

129、正确答案：A

答案解析：无

130、正确答案：B

答案解析：无

131、正确答案：E

答案解析：无

132、正确答案：A

答案解析：无

133、正确答案：D

答案解析：无

134、正确答案：A

答案解析：无

135、正确答案：D

答案解析：无

136、正确答案：C

答案解析：无

137、正确答案：D

答案解析：无

138、正确答案：E

答案解析：无

139、正确答案：C

答案解析：无

140、正确答案：B

答案解析：无

141、正确答案：E

答案解析：无

142、正确答案：A

答案解析：无

143、正确答案：B

答案解析：无

144、正确答案：B

答案解析：无

145、正确答案：C

答案解析：无

146、正确答案：D

答案解析：无

147、正确答案：B

答案解析：无

148、正确答案：D

答案解析：无

149、正确答案：B

答案解析：无

150、正确答案：B

答案解析：无

