

2022年中西医医师资格执业押题

第三单元

A1型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1.慢性支气管炎的诊断要点是

- A.咳嗽、咳痰每年持续1个月,持续2年以上者
- B.咳嗽、咳痰每年持续2个月,持续2年以上者
- C.咳嗽、咳痰每年持续3个月,持续2年以上者
- D.咳嗽、咳痰每年持续3个月,持续3年以上者
- E.咳嗽、咳痰每年持续3个月,持续1年以上者

2.治疗支原体肺炎热陷心包证,应首选

- A.麻杏石甘汤与阿昔洛韦
- B.桑菊饮与青霉素
- C.清营汤合菖蒲郁金汤与红霉素
- D.生脉散与左氧氟沙星
- E.竹叶石膏汤与麦迪霉素

3.下列降压药中,适用于于高血压伴前列腺增生患者的是

- A.受体阻滞剂
- B.受体阻滞剂
- C.ACEI类
- D.CCB
- E.利尿剂

4.下列各项中,不属于房性早搏心电图表现的是

- A.提早出现的P'波,形态与窦性P波不同
- B.代偿间歇不完全
- C.QRS形态正常,亦可增宽(室内差异性传导)或未下传
- D.P'-R>0.12秒
- E.T波宽大,方向与QRS主波方向相反

5.消化性溃疡最主要的症状是

- A.食欲减退
- B.呕吐,黑便
- C.恶心,呕吐
- D.上腹疼痛
- E.嗝气,反酸

6.溃疡性结肠炎病变特点是

- A.弥漫性、连续性
- B.易感性、弥漫性

C.局限性、间断性

- D.传染性、连续性
- E.多发性、坏死性

7.以下可诊断为肾病综合征的是

- A.蛋白尿4.5g/24h,血浆白蛋白28g/L
- B.蛋白尿2.7g/24h,血浆球蛋白31g/L
- C.蛋白尿4.6g/24h,血浆球蛋白25g/L
- D.蛋白尿2.7g/24h,血浆白蛋白40g/L
- E.蛋白尿2.1g/24h,血浆总蛋白64g/L

8.尿路感染最常见的感染途径是

- A.血行感染
- B.直接感染
- C.淋巴道感染
- D.上行感染
- E.下行感染

9.缺铁性贫血在应用铁剂治疗多久后血红蛋白浓度可恢复正常

- A.1周
- B.1月
- C.2月
- D.6月
- E.4月

答案: C

10.下列选项中,有助于再生障碍性贫血与急性白血病鉴别的是

- A.网织红细胞减少
- B.贫血苍白
- C.皮肤黏膜出血
- D.胸骨压痛
- E.感染发热

11.反映甲状腺功能最重要的指标是

- A.血清甲状腺激素的测定
- B.血清TSH测定
- C.T抑制试验
- D.甲状腺摄¹³¹I率测定

- E. 促甲状腺激素释放激素兴奋试验
12. 鉴别1型和2型糖尿病的主要指标是
- A. 血浆胰岛素测定
B. 糖化血红蛋白
C. 葡萄糖耐量试验
D. 空腹血糖
E. 尿糖
13. 痛风诊断的金标准为
- A. 关节液穿刺或痛风石活检证实为尿酸盐结晶
B. X线检查发现软组织肿胀
C. 超声检查发现结石显影
D. 四肢近端小关节呈对称性梭形肿胀畸形
E. 关节囊液可培养出细菌
14. 下列各项中,不属于系统性红斑狼疮诊断依据的是
- A. 颧部红斑
B. 非侵蚀性关节炎
C. 光过敏
D. 抗核抗体阳性
E. 血沉加快
15. 系统性红斑狼疮最常见的脏器损害是
- A. 肺
B. 肾
C. 心
D. 脾
E. 肝
16. 血栓性梗死发生率最高的血管是
- A. 颈内动脉
B. 椎-基底动脉
C. 大脑后动脉
D. 大脑中动脉
E. 大脑前动脉
17. 下列关于阿兹海默病(AD) 与血管性痴呆病(VD) 的叙述不正确的是
- A. AD呈持续性进行性智能减退,VD呈阶梯性加重
B. AD 以神经心理障碍为主,神经功能缺失轻;VD有明显的神经功能缺失症状和体征
C. 影像学检查 AD有脑萎缩,无局灶性病变;VD有局灶性病变
D. Hachinski评分AD<4分,VD>7分
E. AD患者既往有脑血管疾病病史,VD属于渐进性神经变性疾病
18. 晚期帕金森病的典型步态是
- A. 蹒跚步态
B. 慌张步态
C. 小步态
D. 拖曳步态
E. 间歇跛行
19. 对于有机磷杀虫药中毒,目前临床上首选的胆碱酯酶复能药为
- A. 高锰酸钾
B. 双复磷
C. 氯磷定
D. 阿托品
E. 东莨菪碱
20. 下列哪项是一氧化碳中毒最有价值的诊断指标
- A. 抽搐
B. 昏迷
C. 四肢无力
D. 头痛,头晕
E. 血液 COHb 测定
21. 不寐的病理变化总属
- A. 阴盛阳衰,阴阳不和
B. 阴虚火旺
C. 阳盛阴衰,阴阳失交
D. 卫气不固
E. 营卫不和
22. 葛根芩连汤可治疗的泄泻证型是
- A. 寒湿内盛证
B. 食滞肠胃证
C. 湿热伤中证
D. 脾胃虚弱证
E. 肾阳虚衰证
23. 便秘气秘证需应用以下哪种方剂治疗
- A. 麻子仁丸
B. 温脾汤
C. 黄芪汤
D. 六磨汤
E. 润肠丸
24. 胁痛的基本治则是
- A. 疏肝和络止痛
B. 活血化瘀
C. 疏肝健脾补肾
D. 补益肺气
E. 理气化痰
25. 黄疸病最重要的临床特征是
- A. 食欲减退
B. 恶心呕吐
C. 周身发黄
D. 小便发黄
E. 目睛黄染

26. 积证与鼓胀的鉴别关键点在于

- A. 有无腹胀
- B. 有无包块
- C. 有无脉络暴露
- D. 有无疼痛
- E. 有无水液停聚

27. 眩晕病气血亏虚证治疗方法为

- A. 平肝潜阳, 清热息风
- B. 补益气血, 健运脾胃
- C. 补益肾精, 充养脑髓
- D. 燥湿祛痰, 健脾和胃
- E. 祛瘀生新, 活血通窍

28. 下列各项, 不属于阳水临床表现的是

- A. 皮肤光亮而薄
- B. 兼脾、肾阳虚
- C. 多夹风邪为患

D. 头面部先肿

E. 起病急, 病程短

29. 血证的治疗原则是

- A. 泻火、祛瘀、理气
- B. 治火、治气、治血
- C. 补气、补血、温阳
- D. 滋阴、理气、理血
- E. 滋阴、补阳、调和阴阳

30. 痰饮病的生成主要与哪几个脏腑有关

- A. 肺脾肾
- B. 肺肝肾
- C. 心肝肾
- D. 心脾肾
- E. 肺心肾

A2 型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

31. 王某, 女性, 28岁, 3天前确诊为急性支气管炎. 现症: 声重气急, 咳嗽咽痒, 痰稀色白, 骨节酸痛, 头痛鼻塞, 流清涕, 发热, 恶寒, 无汗, 苔薄白, 脉浮紧, 该患者的中医治法为

- A. 疏风清热, 宣肺止咳
- B. 疏风清肺, 润燥止咳
- C. 轻宣凉燥, 润肺止咳
- D. 疏风散寒, 宣肺止咳
- E. 温肺化饮, 散寒止咳

32. 李某, 男性, 36岁, 因高热、咳嗽、咳铁锈色痰、寒战3天入院. 查体: 血压112/74mmHg, 口唇发绀, 呼吸幅度减小、听诊呼吸音减低和胸膜摩擦音、叩诊轻度浊音. X线示: 肺段大片、均匀炎症浸润阴影, 血象: 白细胞 $18 \times 10^9/L$, 中性粒细胞0.76. 应诊断为

- A. 真菌性肺炎
- B. 病毒性肺炎
- C. 肺炎链球菌肺炎
- D. 支原体肺炎
- E. 衣原体肺炎

33. 白某, 男, 50岁, 既往吸烟史20年. 近半年出现间断性咯血, 量少, 胸片X线显示左肺肺门见类圆形阴影边缘毛糙, 有分叶. 该患者的诊断最可能是

- A. 慢性肺源性心脏病

B. 支气管扩张症

C. 肺梗死

D. 中央型肺癌

E. 周围型

34. 张某, 男性, 51岁, 病毒性心肌炎患者, 现症见: 胸闷, 心悸气短, 口唇发绀, 面色晦暗, 甚则喘促不能平卧, 咳嗽, 吐涎痰, 夜难入寐, 肢冷畏寒, 浮肿, 大便稀溏, 舌淡红, 苔白, 脉沉细无力. 治疗方法是

- A. 益气养阴
- B. 补血滋阴
- C. 益气温阳, 滋阴通脉
- D. 健脾宁心
- E. 补肾益气

35. 吕某, 女, 55岁, 由于近期劳累, 1周前胸骨中上段突发压榨性疼痛, 波及心前区, 放射至左肩, 疼痛持续5分钟左右, 休息后自行缓解. 今日疼痛再次发作, 为缓解症状, 应首选下列哪种药

- A. 口服硫酸奎尼丁
- B. 舌下含服硝酸甘油
- C. 注射盐酸利多卡因
- D. 口服盐酸普鲁卡因胺
- E. 注射苯妥英钠

36. 患者, 女, 56岁. 患急性心肌梗死后第3天出现少

尿,血压75/50mmHg,烦躁不安,面色苍白,表情淡漠,皮肤湿冷,大汗淋漓,脉细弱无力.应首先考虑的是

- A.低血糖反应
- B.左心衰竭
- C.心源性休克
- D.心肌梗死后综合征
- E.急性肾衰竭

37.王某,男,55岁.原发性高血压病史3年,现症:头晕头痛,口干口苦,面红目赤,烦躁易怒,大便秘结,小便黄赤,舌红苔黄,脉弦.其治疗方法是

- A.平肝潜阳
- B.祛痰降浊
- C.活血化瘀
- D.滋补肝肾,平潜肝阳
- E.温补肾阳

38.钱某,女性,52岁.二尖瓣狭窄病史15年.现症见:心悸,喘息不能平卧,颜面及肢体浮肿,形寒肢冷,脘痞腹胀,小便短少,大便溏泻,舌体胖大,质淡,苔薄白,脉沉细无力.治疗该患者的方法是

- A.滋阴通脉
- B.温补肾阳
- C.补肝暖脾
- D.补益气血,调和阴阳
- E.温补心肾,化气行水

39.于某,男性,48岁,患者1年来中上腹隐隐作痛,时作时止,消瘦15斤左右.近2周来中上腹疼痛加重遂来就诊.查体:左锁骨上可触及一直径约1.5cm淋巴结,质硬.腹平软,中上腹部压痛,无肌紧张及反跳痛,肝脾肋下未及.辅助检查:上消化道钡餐检查示:胃黏膜皱襞消失,胃壁僵硬,未见蠕动波,胃腔明显缩小.胃镜示:皮革胃.该患者应考虑为

- A.肝癌
- B.胃溃疡
- C.胃癌
- D.慢性胃炎
- E.慢性肝炎

40.患者,男,46岁.反复右胁腹疼痛10年.现症见肋下积块坚实,痛定不移,脘腹胀满,甚则腹大如鼓,面目发黄晦暗,肌肤甲错,高热烦渴,小便黄赤,大便干黑,舌红有瘀斑,苔黄腻,脉弦数.经诊断为"原发性肝癌".治疗选用方药为

- A.柴胡疏肝散合胃苓汤加减
- B.实脾饮加减
- C.逍遥散合桃红四物汤加减
- D.茵陈蒿汤合鳖甲煎丸加减

E.滋水清肝饮合鳖甲煎丸加减

41.腹痛寒邪内阻证治疗首选方剂

- A.良附丸合正气天香散
- B.枳实导滞丸
- C.大承气汤
- D.金铃子散
- E.温脾汤

42.马某,女,32岁.患者3年前因生气出现腹痛、腹泻,夹有脓血,泻后痛减,经服用柳氮磺吡啶及激素灌肠治疗半年后症状控制,但仍反复发作迁延未愈.现腹痛喜温喜按,腹胀,腰膝酸软,食少,形寒肢冷,神疲懒言,舌质淡有齿痕,脉沉细.肠镜结果示:乙状结肠、降结肠、直肠黏膜血管纹理模糊紊乱,黏膜充血、水肿、易脆,多发细小溃疡.该患者治疗选方为

- A.白头翁汤
- B.参苓白术散
- C.理中丸合四神丸
- D.驻车丸
- E.膈下逐瘀汤

43.胡某,女,52岁.胃部疼痛1月余,现症:胃中胀痛,痛窜两胁,每因情志不舒而加重,暖气嘈杂,舌淡,脉弦缓.胃镜检查示:黏膜充血,色泽红,局限性,红白相间征象,黏膜粗糙不平.治疗应首先考虑的方法是

- A.疏肝理气,和胃止痛
- B.健脾益气,温中和胃
- C.清利湿热,醒脾化浊
- D.养阴益胃,和中止痛
- E.化瘀通络,和胃止痛

44.李某,女性,32岁.因近期工作劳累,出现发热小便不适,尿急,尿频2天,伴有小便后疼痛,腰痛,肾区叩击痛阳性,尿沉渣镜检5~8个白细胞/高倍视野.该患者最可能的诊断为

- A.急性膀胱炎
- B.肾结石
- C.急性肾盂肾炎
- D.慢性肾盂肾炎
- E.肾小球肾炎

45.徐某,男性,70岁,慢性肾衰竭病史6年.现症:面色少华,神疲乏力,腰膝酸软,口干唇燥,饮水不多,手足心热,大便干燥,夜尿清长,舌淡有齿痕,脉沉细.血压升高达165/97mmHg.

治疗选方为

- A.六君子汤
- B.参芪地黄汤

- C. 杞菊地黄汤
- D. 济生肾气丸
- E. 全鹿丸

46. 贾某,男,50岁.反复浮肿,尿血3年.症见:乏力,畏寒肢冷,手足心热,腰膝酸软,舌胖有齿痕,脉沉细.检查:血压140/95mmHg,尿蛋白(++),定量3g/d,尿红细胞21个/高倍视野,内生肌酐清除率47%.其诊断是

- A. 慢性肾小球肾炎 阴阳两虚证
- B. 慢性肾盂肾炎 阴阳两虚证
- C. 慢性肾小球肾炎 肝肾阴虚证
- D. 慢性肾小球肾炎 肝肾阴虚证
- E. 慢性肾小球肾炎 脾肾阳虚证

47. 林某,女性,12岁,因月经量多导致皮肤黏膜苍白,疲乏无力,头晕耳鸣、眼花症状出现.实验室检查发现Hb100g/L,总铁结合力升高.症见面色萎黄,少华,腹胀,善食易饥,恶心呕吐,嗜食生米、泥土、茶叶等,神疲肢软,气短头晕,舌质淡,脉象虚弱.应治以

- A. 健脾和胃,益气养血
- B. 益气补血,养心安神
- C. 温补脾肾
- D. 杀虫消积,补益气血
- E. 清热凉血,解毒养阴

48. 章某,男,39岁.患者于1年前无明显诱因出现乏力、低热,当时未治疗,近2个月来症状加重,伴皮肤瘀斑,时有鼻衄、齿衄.查体:精神差,皮下瘀斑散布,胸骨压痛(+),脾肋下4cm.辅助检查:血常规: WBC $32 \times 10^9/L$,RBC $4.1 \times 10^{12}/L$,Hb 122g/L,外周血涂片中中性粒细胞显著增多,原始细胞占8%,嗜酸、嗜碱性粒细胞增多.NAP活性减低.骨穿:骨髓增生明显活跃,粒细胞为主,原始细胞为8%.Ph 染色体阳性,BCR-ABI融合基因阳性.针对该病,首选的化疗药物是

- A. 伊马替尼
- B. 泼尼松
- C. 长春新碱
- D. 羟基脲
- E. 环磷酰胺

49. 高某,女,16岁.两周前患上呼吸道感染,口服药物治疗后症状减轻,但近日皮肤多处瘀点、瘀斑,牙龈出血,不伴发热.血常规示:白细胞 $0.9 \times 10^9/L$,血红蛋白129g/L,血小板 $39 \times 10^9/L$.应首先考虑的诊断是

- A. 白血病
- B. 上呼吸道感染
- C. 再生障碍性贫血
- D. 原发免疫性血小板减少症

E. 过敏性紫癜

50. 薛某,男,40岁.患者近半年来出现间断鼻出血,近3日症状加重,遂来诊.肢体、躯干散在皮下瘀斑,心肺(-),肝脾未及.辅助检查:血常规: WBC $3.8 \times 10^9/L$,PLT $46 \times 10^9/L$,Hb 48g/L,网织红细胞计数0.15%.骨髓象:骨髓增生重度减低,粒系、红系、巨核系三系减少.现症:面色苍白,唇甲色淡,头晕,心悸,乏力动则加剧,舌淡,脉细弱.治疗应首先考虑的治法是

- A. 滋阴补肾,益气养血
- B. 补肾助阳,益气养血
- C. 滋阴助阳,益气补血
- D. 补肾活血
- E. 补益气血

51. 黄某,48岁,女性,因头晕、乏力疲困、食欲减退及低热就诊,血常规示:白细胞: $3.1 \times 10^9/L$.现症:腰膝酸软,头晕耳鸣,五心烦热,失眠多梦,低热,口干咽燥,舌红少苔,脉细数.中医治疗选方为

- A. 归脾汤
- B. 黄芪建中汤合右归丸
- C. 生脉散
- D. 六味地黄丸
- E. 犀角地黄汤合玉女煎

52. 吕某,女,45岁,出现甲状腺弥漫性对称性肿大伴锥体叶肿大,质地坚实,甲状腺功能正常,实验室检查显示:血清TPOAb及TgAb明显增高.其可能的诊断为

- A. 桥本甲状腺炎
- B. 原发性甲状腺功能减退症
- C. 急性甲状腺
- D. 腺癌
- E. 萎缩性甲状腺炎

53. 洛某,女,35岁,易疲劳,怕冷,少汗,动作缓慢,食欲减退而体重增加,记忆力减退,实验室检查显示:FT₄降低,TSH正常.其可能的诊断为

- A. 甲状腺功能亢进症
- B. 原发性甲状腺功能减退症
- C. 继发性甲状腺功能减退症
- D. 甲状腺瘤
- E. 亚急性甲状腺炎

54. 王某,女,32岁,1周前上呼吸道感染病史.3天前出现甲状腺肿大、结节、疼痛、压痛,伴发热.实验室检查:血清T₄、T₃水平一过性增高,甲状腺¹³¹I率显著降低.现症见:颈前肿块质韧,疼痛,口燥咽干,潮热盗汗,心悸,失眠多梦,舌质红,苔少,脉细数.治疗应首选方药为

- A. 六味地黄丸

- B. 清骨散
- C. 知柏地黄丸
- D. 生脉散
- E. 归脾汤

55. 李某,男,60岁,口渴欲饮6年.9月前查体空腹血糖:8.1mmol/L,未予重视.近半年小便频数,混浊如膏,甚则饮一溲一,面色黧黑,耳轮焦干,腰膝酸软,形寒畏冷,阳痿,舌淡苔白,脉沉细无力.其证候应诊断为

- A. 肺热伤津证
- B. 胃热炽盛证
- C. 肾阴亏虚证
- D. 气阴两虚证
- E. 阴阳两虚证

56. 张某,,女性,37岁,两手指间和掌指关节强直不舒3年,近1周病情加重,关节疼痛,肿大变形,伴活动受限.查血沉45mm/h,类风湿因子(++).该患者应诊断为

- A. 类风湿关节炎
- B. 骨性关节炎
- C. 风湿性关节炎
- D. 痛风
- E. 系统性红斑狼疮

57. 黄某,女性,36岁,患者2年前无明显诱因出现面部蝶形红斑,日晒后加重,时伴低热、双手关节疼痛,未系统诊治.近半年自觉症状加重,现高热4天,遂来就诊.现症:满面红赤,不恶寒,皮肤红斑鲜红,口渴,咽干,喜冷饮,关节疼痛,尿赤而少,舌红绛,苔黄,脉滑数.查抗双链DNA抗体、抗 Sm抗体(+).治疗选方为

58. 王某,女性,46岁.患者平素头晕头痛,耳鸣目眩,突发口眼歪斜,舌强语謇.来院诊治.现症:头晕头痛,耳鸣目眩,左侧肢体无力,伴有讲话吐字不清,口舌歪斜,手足重滞,半身不遂.既往高血压病史3年.查体不合作,理解力、定向力、记忆力检查欠合作,言语含糊不清,左侧鼻唇沟变浅,口角右歪,伸舌不合作.左侧肢体肌张力明显下降,肌力0级;共济检查欠合作;双侧躯体深浅感觉检查欠合作;四肢腱反射正常存在,左侧巴氏征阳性.舌质红苔黄,脉弦.

辅助检查:头颅CT:左小脑高密度影.首选的治疗方药为

- A. 天麻钩藤饮
- B. 镇肝熄风汤
- C. 通窍活血汤
- D. 虎潜丸
- E. 大补阴煎

59. 李某,女性,70岁.1天前上午发现口角右偏,左下

肢不能行走,左手不能持物,说话吐字不清.下午检查发现左侧鼻唇沟浅,伸舌稍向左偏,左侧上下肢肌力4级.今晨醒来说话正常,鼻唇沟对称,伸舌居中,四肢运动灵活有力.该患者应考虑为

- A. 脑出血
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 右侧大脑中动脉血栓形成
- E. 椎-基底动脉血栓形成

60. 吕某,男性,66岁,患者平素头晕头痛,腰酸,3小时前晨起突然发生口眼歪斜,舌强语謇,半身不遂,来院诊治.现症:右侧肢体无力,舌强语謇,口眼歪斜,头晕头痛,耳鸣目眩,膝酸腿软.既往高血压病史3年.查体合作,言语不利,右侧鼻唇沟变浅,口角左歪,伸舌右偏.右侧肢体肌力2级,左侧肢体肌力5级,四肢肌张力基本正常;双侧躯体深浅感觉检查正常;四肢腱反射正常存在,右侧巴氏征阳性.舌质红苔黄,脉弦细而数.辅助检查:头颅CT示:左侧内囊低密度灶.空腹血糖6.2mmol/L,心电图正常.该患者选用的方药为

- A. 黄连温胆汤合桃红四物汤
- B. 天麻钩藤饮
- C. 镇肝息风汤
- D. 星萎承气汤
- E. 补阳还五汤

61. 张某,男性,47岁,高血压十余年,左侧面部和上下肢无力,MRI可清晰显示脑干病灶,其余未见明显异常,应考虑诊断为

- A. 蛛网膜下腔出血
- B. 腔隙性梗死
- C. 脑出血
- D. 脑血栓形成
- E. 脑栓塞

62. 李某,男性,33岁,煤气中毒,经过积极抢救后苏醒,3天后又出现神志不清,右侧肢体偏瘫,血压、体温正常,两肺呼吸音粗.该患者的进一步治疗应首选

- A. 脑营养物质
- B. 维生素C输注
- C. 地塞米松输注
- D. 高压氧舱
- E. 甘露醇输注

63. 胡某,男性,14岁,因发热就诊,肌注青霉素后出现汗出,肢冷,血压下降,90/60mmHg.该患者应使用的药物为

- A. 去甲肾上腺素
- B. 肾上腺素

- C. 氢化考的松
- D. 间羟胺
- E. 多巴胺

64. 江某, 男性, 31岁, 息粗鼻煽, 喘逆上气. 痰吐稠黏, 咳而不爽, 身痛无汗, 形寒身热, 口渴, 苔薄白、质红, 脉浮数. 治疗方剂宜首选

- A. 麻杏石甘汤
- B. 三子养亲汤
- C. 桑白皮汤
- D. 小青龙汤
- E. 麻黄汤

65. 李某, 女性, 26岁. 心烦不寐, 胸闷脘痞, 泛恶暖气, 伴口苦, 目眩, 头重, 舌偏红, 苔黄腻, 脉滑数, 该患者选用的治法是

- A. 益气镇惊, 安神定志
- B. 补益心脾, 养血安神
- C. 滋阴降火, 交通心肾
- D. 疏肝泻火, 镇心安神
- E. 清化痰热, 和中安神

66. 陈某, 男性, 56岁, 大便干, 排出困难, 小便清长, 腹中冷痛, 四肢不温, 腰膝酸冷, 面色胱白, 舌淡苔白, 脉沉迟, 该患者中医治法为

- A. 济川煎
- B. 润肠丸
- C. 增液汤
- D. 黄芪汤
- E. 麻子仁丸

67. 庆某, 女性, 23岁, 近期因工作不顺, 每日排便次数达5-6次, 泄泻肠鸣, 腹痛攻窜, 矢气频作, 伴有胸胁胀闷, 暖气食少, 舌淡红, 脉弦, 该患者治疗首选方药是

- A. 参苓白术散
- B. 葛根芩连汤
- C. 三黄泻心汤
- D. 痛泻要方
- E. 黄连上清丸

68. 孙某, 女性, 41岁, 患者近2个月来经常脘腹痞闷, 重时满闷如塞, 但不疼痛, 恶心暖气, 饮食减少, 喜长叹息, 大便不爽, 有时心烦易怒, 胸胁胀满, 每因生气恼怒而使症状加重, 苔薄白, 脉弦. 治疗该患者选用的方药为

- A. 补中益气汤加减
- B. 越鞠丸合枳术丸加减
- C. 二陈汤加减
- D. 保和丸加减

E. 泻心汤合连朴饮加减

69. 钱某, 男性, 65岁, 患鼓胀病多年, 现症见: 腹大胀满, 或见青筋暴露, 唇紫, 面色晦滞, 心烦失眠, 口干而燥, 时或鼻衄, 小便短少, 牙龈出血, 舌质红绛少津、苔少, 脉弦细数. 对该患者的治法为

- A. 温中健脾, 行气利水
- B. 活血化瘀, 行气利水
- C. 温补脾肾, 化气行水
- D. 滋肾柔肝, 养阴利水
- E. 以上都不是

70. 张某, 男性, 48岁, 身目俱黄, 色泽鲜明, 腹部胀满, 发热口渴, 口苦, 口干, 恶心呕吐, 胁胀痛而拒按, 大便秘结, 小便赤黄、短少, 舌红, 苔黄腻, 脉弦滑. 治疗该患者选用的方药为

- A. 茵陈四苓散
- B. 黄芪建中汤
- C. 茵陈术附汤
- D. 茵陈蒿汤
- E. 甘露消毒丹

71. 赵某, 男性, 60岁. 近来胁肋隐痛, 遇劳加重, 悠悠不休, 心中烦热, 口干咽燥, 头晕目眩, 舌红少苔, 脉细弦而数. 该证应选用的治法为

- A. 清热利湿
- B. 养阴柔肝
- C. 祛瘀通络
- D. 疏肝理气
- E. 以上都不是

72. 李某, 女性, 46岁, 水肿多年, 腰以下为甚, 按之不易复起, 脘腹胀闷, 面色萎黄, 纳减便溏, 小便短少, 神倦肢冷. 舌淡胖, 边有齿痕, 舌苔白腻, 脉沉弱, 治疗该患者应选用的方药为

- A. 越婢加术汤
- B. 参苓白术散
- C. 实脾饮
- D. 胃苓汤合五皮饮
- E. 济生肾气丸合真武汤

73. 赵某, 男性, 57岁. 汗出恶风, 周身酸楚, 头痛, 微发热, 苔薄白, 脉浮. 治疗该患者首选

- A. 玉屏风散
- B. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- C. 当归六黄汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 桂枝汤

74. 郑某, 男性, 31岁, 吐血色红或紫暗, 嘈杂不适, 脘腹胀闷, 便秘, 口臭, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数, 治

疗应选用的方药为

- A. 玉女煎合十灰散
- B. 泻心汤合十灰散
- C. 丹参饮合十灰散
- D. 失笑散合四生丸
- E. 白虎汤合四生丸

75. 张某, 女性, 41岁, 腰髋部冷痛重着, "如带五千钱", 活动不利, 不能转侧, 静卧痛不减, 天阴下雨则疼痛尤

A 3 型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(76~78题共用题干)

张某, 男性, 54岁. 哮喘病史3年, 每年发作1-2次, 多在冬春季节. 半月前因感受风寒受凉后哮喘复发. 桶状胸, 肋间隙增宽, 双肺叩诊呈过清音, 双肺呼吸音减弱, 可闻及湿啰音, 剑突下可见心尖搏动, 心率99次/分, 律齐, 腹平软, 肝肋下3cm, 剑突下 5cm, 质中, 轻度触痛. 双下肢凹陷性水肿. 胸部X线片示: 两肺纹理增多、紊乱, 两肺野透亮度增高, 右心室增大. 心电图: 肺型P波. 超声心动图: 右心室增大, 右心房增大. 现症见: 烦躁, 喘息气粗, 胸满, 黏稠难咯, 溲黄便干, 咳嗽, 痰黄, 口渴, 舌红, 舌苔黄腻, 边尖红, 脉滑数.

76. 该患者的诊断为

- A. 心源性哮喘
- B. 肺气肿
- C. 慢性支气管炎
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. 慢性阻塞性肺疾病

77. 该患者的中医治法是

- A. 补肺纳肾, 降气平喘
- B. 涤痰开窍, 熄风止痉
- C. 清肺化痰, 降逆平喘
- D. 健脾益肺, 化痰降气
- E. 温肾健脾, 化饮利水

78. 该患者的首选方药为

- A. 涤痰汤加减
- B. 补肺汤加减
- C. 苏子降气汤加减
- D. 越婢加半夏汤加减
- E. 真武汤合五苓散加减

(79~81题共用题干)

罗某, 男性, 63岁, 心绞痛病史5年, 今日无明显诱因

甚, 舌质淡, 苔白腻, 脉沉而迟缓. 治疗该患者应选

- A. 散寒行湿, 温经通络
- B. 温补肾阳, 舒筋止痛
- C. 滋补肾阴, 温经通络
- D. 清热利湿, 舒筋止痛
- E. 活血理气, 舒筋止痛

再次出现胸骨体上段之后疼痛, 持续半小时以上, 含服硝酸甘油不缓解, 遂至医院就诊. 辅助检查: 心电图示: V-V. 导联见病理性Q波, ST段弓背向上抬高. 现症见: 胸闷憋气, 胸痛彻背, 心痛如绞, 形寒畏冷, 四肢不温, 心悸气短, 冷汗自出, 舌质紫暗, 苔薄白, 脉沉细.

79. 该患者的证型是

- A. 心绞痛, 气血两虚证
- B. 急性心肌梗死, 寒凝心脉证
- C. 心绞痛, 气阴两虚证
- D. 急性心肌梗死, 痰瘀痹阻证
- E. 心绞痛, 寒痰痹阻证

80. 对该患者的中医治法为

- A. 益气养阴, 活血通络
- B. 散寒宣痹, 芳香温通
- C. 辛温通阳, 开痹散寒
- D. 豁痰活血, 理气止痛
- E. 通阳泄浊, 豁痰开痹

81. 治疗该患者的首选方药为

- A. 当归四逆汤合苏合香丸加减
- B. 生脉散合炙甘草汤加减
- C. 生脉散合左归饮加减
- D. 参附龙牡汤加减
- E. 血府逐瘀汤加减

(82~84题共用题干)

李某, 女性, 47岁. 反复活动性胸痛4年. 1小时前, 胸痛再发, 心痛如绞, 胸痛彻背, 胸闷憋气, 四肢不温, 形寒畏冷, 心悸短气, 冷汗自出, 舌质紫暗, 苔薄白, 脉沉细. 经检查诊断为急性下壁心肌梗死.

82. 患者的心电图特征改变出现的导联是

- A. V-V.
- B. V-V.

- C. V₁、V₂、V₃、aVF
- D. I、II、III、aVF
- E. V₁-V₆

83. 对于该病的诊断,最特异和敏感的首选标志物是

- A. 谷草转氨酶
- B. 谷丙转氨酶
- C. 肌酸激酶同工酶
- D. 肌钙蛋白I
- E. 肌红蛋白

84. 对于本病的治疗,描述错误的是

- A. 非ST段抬高心肌梗死不宜溶栓治疗
- B. 溶栓治疗药物可选用尿激酶或链激酶
- C. 出现急性左心衰竭,以应用吗啡和利尿剂治疗为主
- D. 冠状动脉造影显示再通是冠状动脉再通的间接指标
- E. 气阴两虚证选用生脉散合左归饮

(85~87题共用题干)

肖某,男性,56岁.长期饮酒,病毒性肝炎病史6年.近2年来常感疲乏,1个月前出现腹大,食欲减退,进食后上腹部饱胀不适.检查见黄疸,肝掌,蜘蛛痣,腹部膨隆,腹壁静脉曲张,移动性浊音阳性.肝肋下未扪及,脾脏肿大.B超提示肝回声明显增强、不均、光点粗大.现症见: 胁腹刺痛,腹大胀满,肋下瘤块,脉络怒张,面色晦暗黎黑,面颈可见红点赤缕,手掌赤痕,口干不欲饮,舌质紫暗,脉细涩.

85. 该患者西医诊断为

- A. 肝血管瘤
- B. 胃癌
- C. 肝硬化
- D. 胃溃疡
- E. 肝癌

86. 该患者证候是

- A. 湿热蕴结
- B. 肝肾阴虚
- C. 寒湿困脾
- D. 脾肾阳虚
- E. 肝脾血瘀

87. 以下应选用的方药为

- A. 调营饮
- B. 实脾饮
- C. 一贯煎合膈下逐瘀汤
- D. 附子理中汤合五苓散
- E. 中满分消丸合茵陈蒿汤

(88~90题共用题干)

李某,男性,33岁,平素常服用非甾体类抗炎药,3天前开始出现腹痛、腹胀、恶心.现症见: 胸腹痞满,胃

痛灼热,口苦口黏,头身重着,纳呆,肛门灼热,大便不爽,舌苔厚腻,脉弦滑.

88. 该患者西医诊断及中医证型为

- A. 急性胃炎 食积气滞证
- B. 慢性胃炎 胃阴不足证
- C. 慢性胃炎 胃络瘀阻证
- D. 急性胃炎 湿热中阻证
- E. 急性胃炎 寒邪客胃证

89. 该患者中医治法为

- A. 消食导滞,调理气机
- B. 活血通络,理气止痛
- C. 疏肝和胃,理气止痛
- D. 清化湿热,理气止痛
- E. 温中散寒,和胃止痛

90. 以下应选用的方药为

- A. 清中汤加减
- B. 香苏散合良附丸加减
- C. 柴胡疏肝散加减
- D. 失笑散合丹参饮加减
- E. 保和丸加减

(91~93题共用题干)

钱某,女性,35岁,5天前无明显诱因出现颜面及双下肢水肿,当地医院检查示大量蛋白尿,为进一步诊治来诊.查体: 颜面重度水肿,腹水征(+),双下肢凹陷性水肿.辅助检查: 尿常规: 尿蛋白(++++) ,红细胞(),透明管型3-5个/高倍视野;24小时尿蛋白定量4.8g. 血浆蛋白: 总蛋白52/L,白蛋白28g/L,球蛋白24g/L;总胆固醇7.63mmol/L.B超示: 腹水.现症见: 浮肿,按之凹陷不易回复,尿少色清,神疲乏力,面色萎黄,腹胀纳少,舌质淡,苔白腻,脉沉缓.

91. 该患者西医诊断为

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 肾病综合征
- C. 慢性肾盂肾炎急性发作
- D. 慢性肾小球肾炎
- E. 膀胱炎

92. 该患者中医治法为

- A. 疏风解表,宣肺利水
- B. 清热利湿,利水消肿
- C. 宣肺解毒,利湿消肿
- D. 温运脾阳,利水消肿
- E. 健脾化湿,通阳利水

93. 以下应选用的方药为

- A. 疏凿饮子
- B. 五皮饮合胃苓汤

- C. 实脾饮
- D. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
- E. 越婢加术汤

(94~96题共用题干)

王某,女性,30岁.患者既往常于接触花粉后突然出现息促气短,喉中痰鸣,动则为甚,医院就诊治疗后病情好转.昨日接触冷空气刺激后,症状再次加重.查体双肺散在哮鸣音,呼气音延长,辅助检查:血常规:白细胞计数 $10.4 \times 10^9/L$,中性粒细胞72%,淋巴细胞29%,嗜酸粒细胞6.3%;胸部X线片示:心肺膈未见异常.心电图正常.现症:突发咳嗽、喘憋半小时,喉中哮鸣,咳呛阵作,气粗息涌,面赤口苦,舌红苔黄腻,脉弦滑.

94. 该患者的诊断为

- A. 肺炎 寒哮证
- B. 肺炎 痰热壅肺证
- C. 慢性阻塞性肺疾病 热哮证
- D. 支气管哮喘 热哮证
- E. 慢性阻塞性肺疾病 肺虚证

95. 该患者的治法是

- A. 补肾纳气平喘
- B. 清热化痰肃肺
- C. 温肺散寒,化痰平喘
- D. 健脾化痰,止咳平喘
- E. 清热宣肺,化痰定喘

96. 该患者首选方药为

- A. 定喘汤加减
- B. 玉屏风散加减
- C. 六君子汤加减
- D. 射干麻黄汤加减
- E. 金匱肾气丸或七味都气丸加减

(97~99题共用题干)

王某,男性,46岁,患者半年前无明显诱因出现右上腹钝痛,为持续性,有时向右肩背部放射,纳呆乏力,暖气泛酸,体重下降约5kg.查体见慢性病容,腹部膨隆,腹壁静脉曲张,移动性浊音阳性.肝脏于右肋缘下可触及,质硬,有触痛,脾脏肿大,双下肢凹陷性水肿.肝功能:ALT 184IU/L,AST 178IU/L,AFP 880umol/L.B超:肝右叶实质性占位性病变,肝内外胆管未见扩张.现症见:形体羸瘦,腹大胀满,积块膨隆,头晕耳鸣,潮热盗汗,腰膝酸软,两胁隐隐作痛,小便短赤,大便干结,舌光剥有裂纹,脉细数.

97. 该患者西医诊断为

- A. 原发性肝癌 肝肾阴虚证
- B. 肝硬化 肝肾阴虚证
- C. 肝硬化 脾肾阳虚证

- D. 门静脉高压 脾肾气虚证
- E. 肝性脑病 湿热蕴脾证

98. 该患者中医治法为

- A. 化痰通络
- B. 养阴柔肝,软坚散结
- C. 疏肝理气,活血化瘀
- D. 清利湿热,化痰解毒
- E. 滋阴养血,清热化湿

99. 以下应选用的方药为

- A. 茵陈蒿汤合鳖甲煎丸
- B. 四神丸
- C. 参苓白术散
- D. 逍遥散合桃红四物汤
- E. 滋水清肝饮合鳖甲煎丸

(100~102题共用题干)

张某,女性,30岁.患者于3天前过食辛辣肥甘之品后,出现尿频、尿急、尿道灼痛,未予重视,今日症状加重而来诊治.双肾区无叩痛.舌质红,苔薄黄腻,脉滑数.辅助检查:尿常规:尿蛋白(-),尿白细胞8-10个/HP,红细胞3-5个/HP;血常规:WBC $10.2 \times 10^9/L$,N 71%.尿菌培养阳性.泌尿系B超未见异常.现症见:少腹胀满疼痛,小便不畅,小便灼热刺痛,可见血尿,胸胁苦满,寒热往来,舌质暗红,脉弦.

100. 该患者诊断为

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 慢性肾盂肾炎急性发作
- C. 慢性肾衰竭
- D. 急性膀胱炎
- E. 急性肾衰竭

101. 该患者中医治法为

- A. 温运脾阳,利水消肿
- B. 滋阴益肾,清热通淋
- C. 清热利湿通淋
- D. 健脾补肾
- E. 疏肝理气,清热通淋

102. 以下应选用的方药为

- A. 八正散
- B. 丹栀逍遥散合石苇散
- C. 知柏地黄丸
- D. 实脾饮
- E. 无比山药丸

(103~105题共用题干)

李某,男,6岁.3日前受凉后出现发热,伴流涕,咽痛.1日前全身皮肤出现瘀点、瘀斑.骨髓象:巨核细胞数量轻度增加,红系及粒、单核系正常.血象:血红蛋白

110g/L,血小板 $16 \times 10^9/L$.

103. 首先考虑的诊断是

- A. 原发免疫性血小板减少症
- B. 慢性粒细胞性白血病
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症
- D. 骨髓增生异常综合征
- E. 慢性溶血性贫血

104. 本病的首选治疗措施是

- A. 休息及输注血小板
- B. 糖皮质激素
- C. 脾切除
- D. 达那唑治疗
- E. 免疫抑制剂治疗

105. 若患者紫斑较多,颜色紫红,下肢尤甚,伴头晕目眩,耳鸣,低热,心烦盗汗,齿衄,舌红少津,苔少,脉细数。首选的中医治法是

- A. 益气摄血
- B. 滋阴降火,清热止血
- C. 清热凉血
- D. 健脾养血
- E. 活血化瘀止血

(106~108题共用题干)

王某,男,62岁.高血压病史8年.近3个月来夜尿增多,伴乏力、气促、腰酸、纳呆腹胀、食欲减退。查体:轻度贫血貌,血压 175/110mmHg.舌淡红,苔白,有齿痕.脉沉细.肾功能检查: GFR 50mL/min,Ccr 65mL/min,Scr255 $\mu\text{mol/L}$.

106. 首先考虑的诊断是

- A. 慢性肾小球肾炎
- B. 肾病综合症
- C. 高血压肾病
- D. 慢性肾衰竭
- E. 慢性肾盂肾炎

107. 以下措施不合理的是

- A. 使用 ACEI和ARB 降压
- B. 积极纠正贫血
- C. 蛋白尿控制在 $\leq 0.5\text{g}/24\text{h}$
- D. 低蛋白、低磷饮食
- E. 使用噻嗪类利尿剂

108. 中医治疗方剂选择

- A. 六君子汤加减
- B. 济生肾气丸加减
- C. 参芪地黄汤加减
- D. 杞菊地黄汤加减
- E. 金匱肾气丸加减

(109~101题共用题干)

吕某,女,52岁,两手指间和掌指关节强直不舒3年,近2周病情加重,关节疼痛,肿大变形,活动受限,伴发热,口苦,饮食无味,纳呆,全身困乏无力,舌苔黄腻,脉滑数.查血沉 42nm/1h,类风湿因子(++).

109. 诊断为

- A. 风湿性关节炎
- B. 痛风
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 类风湿关节炎
- E. 骨性关节炎

110. 治法是

- A. 清热利湿,祛风通络
- B. 祛风散寒,清热化湿
- C. 养阴清热,祛风通络
- D. 活血化瘀,祛痰通络
- E. 益肝肾,补气血,祛风湿,通经络

11. 该病的基本病理改变是

- A. 心脏炎
- B. 滑膜炎
- C. 血管炎
- D. 心包炎
- E. 皮炎

(112~114题共用题干)

薛某,男,26岁,患者平素喜食辛辣刺激食物.今日与合伙人应酬饮大量白酒,出现胸脘胀闷,疼痛不适,自服吗丁啉后,症状未缓解.2小时后呕吐紫红色液体两次,每次量约80mL,夹有食物残渣,口臭,口干喜冷饮,胃脘胀闷灼痛,遂来就诊.查体:腹平软,中上腹有压痛,无反跳痛及肌紧张,肝脾肋下未及,肠鸣音7次/分.舌红苔黄,脉滑数.辅助检查: 呕吐物隐血(++);血常规: 白细胞 $12.8 \times 10^9/L$,中性粒细胞73%,血、尿淀粉酶无明显异常。

112. 该患者诊断为

- A. 胃癌气随血脱证
- B. 上消化道出血 胃中积热证
- C. 消化性溃疡 脾不统血证
- D. 上消化道出血 肝火犯胃证
- E. 胃癌 肝郁乘脾证

113. 治疗首选的方剂为

- A. 归脾汤
- B. 独参汤
- C. 泻心汤合十灰散
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 四味回阳饮

114. 若患者出现乏力、心慌,出血量为

- A. >5ml
- B. 50—100ml
- C. 250—300ml
- D. >400—500ml
- E. >1000ml

(115~117题共用题干)

薛某,男性,42岁.患者于1年半前无明显诱因出现血压升高,伴双下肢水肿,遂前往医院检查,查体发现镜下尿蛋白(+++),红细胞21个/高倍视野,口服药物治疗,疗效不显著,近1周以来水肿加重,遂至医院复诊.现症: 肢体浮肿,面色黎黑,腰痛呈刺痛,肌肤甲错,肢体麻木.舌色紫暗,脉象细涩.辅助检查: 尿常规: 尿蛋白(++),颗粒管型(+),镜检红细胞15个/高倍视野.24 小时尿蛋白定量1.9g.肾功能: BUN 8.94mmol/L,Scr 109umol/L.B超示: 双肾大小正常.

115. 中医辨证为

- A. 肺肾气虚证
- B. 湿浊证
- C. 血瘀证
- D. 气虚血瘀证
- E. 水湿证

116. 治疗首选方剂是

- A. 血府逐瘀汤加减
- B. 玉屏风散合金匱肾气丸
- C. 桃红四物汤加减
- D. 杞菊地黄丸加减
- E. 五苓散合五皮饮加减

17. 若患者蛋白尿>1g/d, 血压应控制在

- A. 115mmHg 以下
- B. 120mmHg 以下
- B. 月经过多
- C. 眼征
- D. 胫前黏液性水肿
- E. 弥漫性甲状腺肿

B 型题

答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑, 每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择。

(121~122题共用备选答案)

A. 铁锈色痰

C. 125mmHg 以下

D. 130mmHg 以下

E. 130/80mmHg 以下

(118~120题共用题干)

王某,女,47岁.患者于半年前起自觉心悸、心率加快,服用心得安后症状减轻,但出现消瘦、乏力等症,近3天发热、汗出增多.现症: 颈前正中部位突起,约有鸡蛋大,中部微凹陷,眼突,性情急躁易怒,易饥多食,手指颤抖,面部烘热,多汗,心悸失眠,头晕目眩,口苦咽干,大便秘结.查体: 营养不良,眼裂增宽,双侧甲状腺中度肿大,听诊有血管杂音.心率128次/分,心尖区可闻及收缩期杂音.两肺呼吸音清,腹软.舌质红,舌苔黄,脉弦数.辅助检查: 甲功: FT₁ 13.5pmol/L, FT₄ 36.3pmol/L, TSH 0.06mU/L. B超: 甲状腺弥漫性肿大.心电图示: 房性早搏, ST-T段改变.

118. 治法为

- A. 活血化瘀,软坚散结
- B. 疏肝理气,化痰散结
- C. 清肝泻火,消瘿散结
- D. 滋阴降火,消瘿散结
- E. 益气养阴,消瘿散结

119. 选用方剂为

- A. 逍遥散合二陈汤加减
- B. 龙胆泻肝汤加减
- C. 天王补心丹加减
- D. 生脉散加味
- E. 天麻钩藤饮加减

120. 不属甲亢主要临床表现的是

A. 高代谢症候群

B. 浆液性痰

C. 粉红色泡沫痰

- D. 粉红色乳状痰
- E. 砖红色胶冻状痰

121. 上述哪项可见于克雷伯杆菌肺炎
122. 上述哪项可见于葡萄球菌肺炎可见
(123~124题共用备选答案)

- A. 肺癌
- B. 支气管扩张
- C. 支气管哮喘
- D. 慢性支气管炎
- E. 心源性哮喘

123. 上述哪项疾病在发作时可闻及散在或弥漫性哮鸣音, 呼气相延长, 可经治疗后缓解
124. 上述哪项疾病在常咳出粉红色泡沫样痰, 两肺可闻及广泛的湿啰音和哮鸣音

(125~126题共用备选答案)

- A. 一度房室传导阻滞
- B. 二度房室传导阻滞
- C. 一度I型窦房传导阻滞
- D. 二度I型房室传导阻滞
- E. 干扰性房室分离

125. P~R逐个延长, R~R逐次缩短, 直到P波后无QRS波群出现, 周而复始, 该描述是上列哪项的特点
126. P~P规则, P~R固定, P波突然不能下传而QRS波脱漏, 该描述是上列哪项的特点

(127~128题共用备选答案)

- A. 黄连温胆汤
- B. 生脉散
- C. 天王补心丹
- D. 安神定志丸
- E. 归脾汤

127. 现症: 心悸不宁, 头晕目眩, 心烦少寐, 耳鸣, 手足心热, 舌质红, 少苔, 脉细数. 诊断为快速性心律失常, 治疗方法为上述哪项
128. 现症: 心悸气短, 头晕乏力, 少气懒言, 胸痛胸闷, 失眠多梦, 五心烦热, 舌质红, 少苔, 脉虚数. 诊断为快速性心律失常, 治疗方法为上述哪项

(129~130题共用备选答案)

- A. 出血倾向及贫血
- B. 腹壁静脉曲张
- C. 脾肿大
- D. 痔静脉曲张
- E. 腹水

129. 以上哪项是肝硬化代偿功能减退的最突出体征
130. 以上哪项属于肝硬化肝功能减退的临床表现
(131~132题共用备选答案)

- A. >1000ml
- B. 400~500ml
- C. 250~300ml
- D. 50~100ml
- E. >5ml

131. 上消化道出血患者如出现呕血, 则出血量约为
132. 上消化道出血患者如出现乏力、心慌, 则出血量约为

(133~134题共用备选答案)

- A. 青少年, 皮肤紫癜, 关节痛, 腹痛, 黑便, 皮疹出现后1~4周左右出现血尿
- B. 慢性肝炎, 伴蛋白尿
- C. 大量蛋白尿, 低蛋白血症, 水肿
- D. 青年女性, 发热, 皮疹, 关节痛, 面部蝶形红斑
- E. 糖尿病10年, 蛋白尿

133. 上述哪项是系统性红斑狼疮的表现

134. 上述哪项是过敏性紫癜性肾炎的表现

(135~136题共用备选答案)

- A. 玉屏风散加减
- B. 桃红四物汤加减
- C. 玉女煎加减
- D. 补阳还五汤加减
- E. 犀角地黄汤加减

135. 原发免疫性血小板减少症瘀血内阻证治宜选用以上哪种方药

136. 原发免疫性血小板减少症阴虚火旺证治宜选用以上哪种方药

(137~138题共用备选答案)

- A. HCO₃正常, pH下降, BE 负值增大
- B. HCO₃正常, , pH下降, BE 正值增大
- C. HCO₃下降, pH下降, BE正值增大
- D. HCO₃下降, pH下降, BE 负值增加
- E. HCO₃上升, pH上升, BE 正值增加

137. 以上哪项为代谢性酸中毒的特征

138. 以上哪项为代谢性碱中毒的特征

(139~140题共用备选答案)

- A. 癫痫典型失神发作
- B. 癫痫单纯部分性发作
- C. 癫痫持续状态
- D. 癫痫不典型失神发作
- E. 癫痫全面性强直一阵挛发作

139. 张某, 7岁, 男孩, 吃午饭时, 突然意识短暂丧失, 双目凝视, 面色变白, 手中的筷子掉在地下, 口角出现细小颤动, 持续约15秒后立即清醒. 该患者最可能的诊断是

140. 李某, 男性, 12岁. 大发作患者, 每次连续发作之间意识尚未完全恢复又频繁再发, 总时间40分钟左右. 该患者最可能的诊断是

(141~142题共用备选答案)

- A. 大定风珠
- B. 温胆汤
- C. 人参养荣汤
- D. 镇肝熄风汤合天麻钩藤饮
- E. 地黄饮子

141. 上列哪项是治疗帕金森病风阳内动证的首选方剂

142. 上列哪项是治疗帕金森病气血亏两虚证的首选方剂

(143~144题共用备选答案)

- A. 抗SSA抗体
- B. 抗RNA抗体
- C. 抗核抗体(ANA)
- D. 抗dsDNA抗体
- E. 抗Sm抗体

143. 以上哪项为系统性红斑狼疮患者敏感性最高的抗体

144. 以上哪项为系统性红斑狼疮患者特异性高但敏感性较低的抗体

(145~146题共用备选答案)

- A. 大便时溏时泻, 迁延反复, 食后脘闷不舒

B. 腹痛攻窜, 失气频作

C. 粪色黄褐, 气味臭秽, 肛门灼热

D. 泄泻清稀, 甚则如水样

E. 泻下粪便臭如败卵, 泻后痛减

145. 以上哪项是泄泻脾胃虚弱证的特点

146. 以上哪项是泄泻食滞肠胃的特点

(147~148题共用备选答案)

A. 祛瘀生新, 活血通窍

B. 平肝潜阳, 清火息风

C. 化痰祛湿, 健脾和胃

D. 补益气血, 健运脾胃

E. 补益肾精, 充养脑髓

147. 以上治法中, 治疗眩晕肾精不足证选用的是

148. 以上治法中, 治疗眩晕气血亏虚证选用的是

(149~150题共用备选答案)

A. 龙胆泻肝汤

B. 半夏厚朴汤

C. 柴胡疏肝散

D. 丹栀逍遥散

E. 甘麦大枣汤

149. 以上方药中治疗郁证痰气郁结证选用

150. 以上方药中治疗郁证心神失养证选用

中西医医师资格笔试各单元考试科目及分值

中西医执业医师资格考试内容(仅供参考)

- 第一单元 中基35、中诊35、中药35、方剂35、法规10
第二单元 西诊40、药理30、针灸30、传染20、伦理10、中医经典20
第三单元 中西医内科150
第四单元 中西医外科50、中西医妇科50、中西医儿科50

中西医助理医师资格考试内容(仅供参考)

- 第一单元 中基20、中诊20、中药20、方剂20、
西诊20、针灸15、药理15、传染10、伦理5、法规5
第二单元 中西医内科75、中西医外科25、中西医妇科25、中西医儿科25

