

现在关注▶▶▶

「金英杰医学广西校区」微信公众号

90+ 医考课程任你挑

100+ 视频课件免费看



# 口腔执业（含助理）医师资格考试

口内 100 测试题  
(第 7 版)

金英杰口腔直播教研组 编

- 1、下面哪项描述不是球菌性口炎的临床表现
  - A、口腔黏膜充血，局部形成糜烂或溃疡
  - B、溃疡或糜烂的表面上覆盖假膜
  - C、口腔黏膜出现白色网纹样病变
  - D、患者唾液增多，疼痛明显
  - E、区域淋巴结肿大压痛
  
- 2、急性假膜型念珠菌口炎多发于
  - A、老年人
  - B、青少年
  - C、新生婴儿
  - D、更年期妇女
  - E、40 岁左右的中年人
  
- 3、对于念珠菌性口炎中慢性肥厚型的高龄患者，为了明确诊断有无异常增生，首选的诊断方法是
  - A、唾液培养
  - B、唾液及血清念珠菌抗体测定
  - C、活体组织检查
  - D、直接涂片镜检
  - E、血 CEA 测定
  
- 4、带状疱疹的致病病原微生物是
  - A、细菌
  - B、真菌
  - C、衣原体
  - D、支原体
  - E、病毒
  
- 5、原发性疱疹性口炎好发人群是
  - A、老年人
  - B、6 岁以下儿童
  - C、青少年
  - D、更年期妇女
  - E、40 岁左右的中年人
  
- 6、单纯疱疹病毒直径约为
  - A、50nm
  - B、100nm
  - C、120nm
  - D、150nm
  - E、200nm

7、女性，75 岁，全口无牙，戴全口义齿近 10 年，因黏膜不适就诊。检查可见黏膜呈红亮色、水肿、有黄白色假膜，直接镜检见菌丝和芽胞。该患者治疗中不应选用的药物为

- A、制霉菌素
- B、酮康唑
- C、碳酸氢钠
- D、青霉素
- E、克霉唑

8、口腔黏膜变态反应性疾病，不包括

- A、血管神经性水肿
- B、药物性口炎
- C、固定性药疹
- D、多形渗出性红斑
- E、Riga-Fede 病

9、血管神经水肿患者当出现喉头水肿，呼吸困难时应该采取以下哪项紧急措施

- A、给泼尼松每日 15~30mg，分 3 次口服
- B、氢化可的松 100~200mg，加入 5%~10%葡萄糖液 1000~2000ml 中，静脉滴注
- C、口含冰块或喉部放置冰袋
- D、发生窒息应立即进行气管切开
- E、以上都可

10、药物过敏性口炎面积广泛，糜烂和渗出严重者，可给予激素，选用激素的方法为

- A、口服泼尼松，每日 10~20mg
- B、口服泼尼松，每日 20~30mg
- C、口服泼尼松，每日 30~60mg
- D、口服泼尼松，每日 60~70mg

E、口服泼尼松，每日 60~80mg

11、创伤性溃疡的治疗错误的是

- A、保留残根
- B、使用含漱剂
- C、防止感染和止痛
- D、修改或拆除不合适的修复体
- E、磨改锐利的牙尖或切嵴

12、关于 Bednar 溃疡发病位置描述正确的是

- A、上颌软硬腭交汇处
- B、双侧上腭翼钩处
- C、膜舌腹、舌尖、舌侧缘
- D、舌侧缘、舌系带、舌根
- E、上下颌牙槽嵴顶及对应口腔前庭区

13、在复发性阿弗他溃疡全身治疗中，正确使用肾上腺皮质激素类药物的方法是

- A、泼尼松 10~30mg/d，分 3 次口服，溃疡控制后逐渐减量
- B、泼尼松 60mg/d，分 3 次口服，控制病情后减量
- C、泼尼松 60~80mg/d，分 3 次口服，控制病情后减量
- D、泼尼松 80~100mg/d，分 3 次口服，控制病情后减量
- E、泼尼松 100~120mg/d，分 3 次口服，控制病情后减量

14、关于复发性口腔溃疡特征描述正确的是

- A、具有特异性、复发性和自限性
- B、具有传染性、周期性和自限性
- C、具有特异性、传染性和复发性
- D、具有周期性、复发性和自限性
- E、具有聚集性、特异性和周期性

15、患者，男性，35 岁，近日口角区出现一深大溃疡，直径 25mm，深及肌层，溃疡周边红肿隆起，扪之基底较硬，边缘整齐。自觉疼痛症状明显，进食困难。该病者可能患有

- A、癌性溃疡
- B、结核性溃疡
- C、创伤性溃疡
- D、重型阿弗他溃疡
- E、坏死性涎腺化生

16、口腔黏膜损害以哪一型天疱疮最多见

- A、增殖型天疱疮
- B、大疱型天疱疮
- C、落叶型天疱疮
- D、寻常型天疱疮
- E、红斑型天疱疮

17、在天疱疮的鉴别诊断中不包括下列哪种疾病

- A、多形性红斑
- B、剥脱性龈炎
- C、类天疱疮
- D、扁平苔藓
- E、鹅口疮

18、关于口腔扁平苔藓描述正确的是

- A、是一种急性炎症性疾病
- B、发病缓慢，无恶变现象
- C、中老年男性患者较多
- D、仅单独发生于口腔
- E、已列入癌前状态

19、口腔扁平苔藓（OLP）上皮固有层内有大量淋巴细胞呈密集带状浸润与下列哪项因素有关

- A、心理因素
- B、内分泌因素
- C、微循环障碍因素
- D、免疫因素
- E、遗传

20、关于疣状白斑下列哪项说法是错误的

- A、表面有毛刺状突起
- B、表面高低不平
- C、与烟酒刺激无关
- D、有明显的局部刺激因素
- E、基底无明显硬结

21、舌乳头炎包括

- A、丝状乳头炎
- B、菌状乳头炎
- C、叶状乳头炎
- D、轮廓乳头炎
- E、以上均包括

22、地图舌任何年龄均可发生，但多见于

- A、儿童
- B、青年
- C、中年
- D、老年
- E、成人

23、地图舌又可名为

- A、裂纹舌
- B、贫血性舌炎
- C、剥脱性舌炎
- D、沟纹舌
- E、消化不良性舌炎

24、慢性非特异性唇炎的病因包括

- A、舔唇不良习惯
- B、机械性长期刺激
- C、寒冷干燥
- D、精神因素
- E、以上都是

25、与口角炎发病无关的因素有

- A、B 族维生素缺乏，致营养不良
- B、感染因素
- C、遗传因素
- D、创伤因素
- E、变态反应

26、慢性唇炎的病因可能是下列因素，除了

- A、天气干燥
- B、咬唇不良习惯
- C、心情烦躁、多虑
- D、空气寒冷
- E、残根残冠刺激

27、梅毒的病原体为

- A、苍白密螺旋体
- B、梭状杆菌和螺旋体
- C、白色念珠菌
- D、单纯疱疹病毒
- E、人类免疫类药物缺陷病毒

28、艾滋病的病原体是

- A、巨细胞病毒
- B、EB 病毒
- C、人类乳头状瘤病毒
- D、人类免疫缺陷病毒
- E、单纯疱疹病毒

29、有关牙槽骨吸收的描述错误的是

- A、牙槽嵴顶到釉牙骨质界的距离超过 2mm 时，可认为有牙槽骨吸收
- B、牙槽骨吸收可表现为水平型吸收和垂直型吸收
- C、水平型吸收多发生于牙槽间隔较宽的后牙
- D、水平型吸收为牙槽骨高度呈水平状降低
- E、垂直型牙槽骨吸收也称为角形吸收

30、牙周探诊时探诊力量约为

- A、10 ~ 15g
- B、15 ~ 20g
- C、20 ~ 25g
- D、25 ~ 30g
- E、30 ~ 35g

31、牙周组织的常规检查器械不包括

- A、口镜
- B、口腔科镊子
- C、银汞充填器
- D、尖探针
- E、牙周探针

32、用钝头牙周探针探测牙周炎患牙的炎症牙龈时，探针终止于

- A、龈沟底
- B、进入结合上皮 1/2 ~ 1/3 处
- C、穿透结合上皮，终止于正常结缔组织的冠方
- D、终止于正常结缔组织纤维内
- E、终止于结合上皮的冠方

33、与牙周炎关系密切的全身疾病是

- A、肺炎
- B、胆囊炎
- C、胃炎
- D、肾病
- E、糖尿病

34、牙周附着水平是指

- A、龈缘到袋底的距离
- B、釉牙骨质界到袋底的距离
- C、龈缘到釉牙骨质界的距离
- D、釉牙骨质界到根分歧的距离
- E、结合上皮到牙槽嵴顶的距离

35、牙齿的Ⅱ度松动，是指

- A、颊（唇）舌向松动
- B、近远中向松动
- C、颊（唇）舌向+近远中向松动
- D、垂直向松动
- E、颊（唇）舌向+近远中向+垂直向松动

36、牙周组织上皮屏障，最重要的是

- A、口腔龈上皮
- B、沟内上皮
- C、结合上皮
- D、缩余釉上皮
- E、牙龈上皮

37、牙周病的全身易感因素不包括

- A、遗传因素
- B、免疫功能
- C、某些全身疾病
- D、吸烟
- E、酗酒

38、牙周组织的主要防御机制有

- A、上皮屏障
- B、吞噬细胞
- C、龈沟液
- D、唾液
- E、以上都是

39、急性龈乳头炎的病因如下，除了

- A、过强的冷热刺激
- B、过硬、过锐的食物刺伤
- C、不恰当剔牙
- D、食物嵌塞
- E、充填体悬突，不良修复体边缘

40、急性坏死性龈炎应采用下列方法治疗，除了

- A、去除局部坏死组织并刮除大块牙石
- B、局部使用 1%~3%双氧水冲洗
- C、常规全身应用青霉素
- D、支持疗法，并对全身因素进行矫治
- E、口腔卫生指导，建立良好的口腔卫生习惯

41、ANUG 的好发人群是

- A、婴幼儿
- B、青壮年
- C、中年
- D、老年
- E、女性患者

42、急性坏死性龈炎病变区细菌学涂片增加最多的厌氧微生物是

- A、伴放线聚集杆菌与梭形杆菌
- B、梭形杆菌与中间普氏菌
- C、牙龈卟啉单胞菌与螺旋体
- D、梭形杆菌与螺旋体
- E、以上都不是

43、关于牙龈纤维瘤病增生的牙龈描述不正确的是

- A、颜色正常
- B、组织坚韧
- C、表面偶呈颗粒状
- D、点彩明显
- E、易出血

44、牙龈切除术及牙龈成形术，术后的组织完全愈合需要

- A、1~2 周
- B、2~3 周
- C、6~7 周
- D、1 个月
- E、3 个月

45、下列可导致牙龈增生的药物不包括

- A、环孢素
- B、苯妥英钠
- C、硝苯地平（心痛定）
- D、维拉帕米
- E、硝酸异山梨醇酯（消心痛）

46、局限型侵袭性牙周炎的临床特点不包括

- A、牙周组织破坏程度与局部刺激物的量不成比例
- B、累及除切牙和第一磨牙以外的恒牙至少 3 颗
- C、第一磨牙近远中均有垂直型骨吸收则形成“弧形吸收”
- D、家族聚集性
- E、病变进展快，早期可出现牙齿松动

47、不属于伴放线聚集杆菌对牙周组织毒性和破坏作用的是

- A、产生内毒素
- B、不产生外毒素
- C、抑制中性粒细胞的趋化
- D、杀伤白细胞使其产生溶酶体酶
- E、产生成纤维细胞抑制因子、破骨细胞激活因子

48、目前翻瓣术后最常见愈合方式为

- A、骨结合
- B、胶原连结
- C、长结合上皮愈合
- D、新附着
- E、细胞结合

49、引导性组织再生术效果最好的是

- A、II度根分叉病变
- B、III度根分叉病变
- C、一壁骨下袋
- D、二壁骨下袋
- E、三壁骨下袋

50、基础治疗后，牙周袋深度超过多少时需做翻瓣刮治术

- A、3mm
- B、4mm
- C、5mm
- D、6mm
- E、7mm

51、牙周病变引起牙髓的病变最常见

- A、逆行性牙髓炎
- B、慢性牙周炎引起牙髓病变
- C、龈上洁治术对牙髓刺激
- D、龈下刮治术对牙髓刺激
- E、根面平整术对牙髓刺激

52、在下列异常情况中，哪项不能导致牙髓-牙周联合病变

- A、牙根纵裂
- B、牙骨质发育不良
- C、腭侧沟
- D、浅龋
- E、畸形舌侧沟

53、牙周脓肿的表现，哪一项是不正确的

- A、牙龈局限性肿胀
- B、无牙髓活力
- C、肿胀区疼痛
- D、牙石较多，松动明显
- E、有深牙周袋

54、关于牙半切术的手术方法叙述不正确的是

- A、伤口完全愈合后，进行牙体或牙列的修复
- B、将患牙从牙冠向根分叉部位分为近远中两部分，以多保留健侧牙体为好
- C、术前进行根管治疗，髓室内以银汞合金充填
- D、拔除患侧冠根，无需骨修整
- E、切口、翻瓣同截根术，如根分叉已完全暴露，也可不做翻瓣

55、仅适用于下颌磨牙的根分叉病变的治疗方法的是

- A、截根术
- B、引导性组织再生术
- C、分根术
- D、翻瓣术
- E、根面平整术

56、以下哪一项是种植体周围炎发病的重要促进因素

- A、菌斑微生物
- B、生物力学负载过重
- C、吸烟
- D、酗酒
- E、患者的全身健康状况

57、下列何种疾病与牙周病没有密切关系

- A、糖尿病
- B、白血病
- C、心血管疾病
- D、大叶性肺炎
- E、再生障碍性贫血

58、生物学宽度是指

- A、龈沟底与牙槽嵴顶之间的恒定距离
- B、龈沟底与牙槽嵴顶之间的距离约 2mm，其改变可反映牙周状况
- C、牙周炎时生物学宽度增大
- D、牙周萎缩时生物学宽度变小
- E、随年龄增长上皮附着根向迁移，生物学宽度变小

59、牙冠延长术后制作修复体的一般在

- A、术后 1~2 周
- B、术后 2~3 周
- C、术后 4~6 周
- D、术后 6~8 周
- E、术后 8~12 周

60、冠缘放在龈下时，冠缘距龈沟底应至少为

- A、1mm
- B、1.5mm
- C、1.8mm
- D、2mm
- E、2.5mm

61、局部用药治疗龋病的常见适应证是

- A、小而深的乳牙龋
- B、大而浅的乳牙龋
- C、大而深的乳牙龋
- D、乳前牙邻面龋
- E、乳磨牙邻面龋

62、以下哪项不是年轻恒牙龋齿好发的部位

- A、第一恒磨牙（牙合）面
- B、下颌恒磨牙的颊面
- C、第二恒磨牙（牙合）面
- D、上颌中切牙的唇面
- E、上颌恒磨牙的舌面

63、关于儿童龋病预防中窝沟封闭的操作，下列说法错误的是

- A、恒牙酸蚀的时间为 20~30 秒
- B、乳牙酸蚀的时间为 40~60 秒
- C、干燥牙面使用压缩空气吹干 30 秒
- D、自凝封闭剂调拌到固化为 1.5~2 分钟
- E、光固化封闭剂的照射时间一般为 60 秒

64、针对于学龄前儿童口腔检查的时间与学龄儿童的口腔检查的时间分别是

- A、每 2 个月、每 40 个月
- B、每 3 个月、每 4 个月
- C、每 3 个月、每 5 个月
- D、每 3 个月、每 6 个月
- E、每 6 个月、每 3 个月

65、奶瓶龋最常见于

- A、上颌乳切牙
- B、下颌乳切牙
- C、上颌乳磨牙
- D、下颌乳磨牙
- E、全部乳牙

66、年轻恒牙牙髓治疗的治疗原则为

- A、保存生活的牙髓组织
- B、维持牙列完整行使功能
- C、不刺激根尖周组织
- D、牙髓活力正常有利于颌骨及颅面的发育
- E、减少患者就诊次数

67、年轻恒牙露髓应尽量采用

- A、根充术
- B、干髓治疗
- C、根尖诱导成形术
- D、保髓治疗
- E、干髓术

68、根尖诱导成形术成功标准，除外的是

- A、根尖继续发育，管腔缩窄，根尖封闭
- B、根管腔无变化，根尖封闭
- C、根管内微量有颜色液体排出
- D、未见发育，根管内探测有硬组织屏障形成
- E、根端 1/3 处形成钙化屏障

69、年轻恒牙牙髓炎症能够进行活髓保存的生理基础是

- A、牙髓腔大，牙髓组织多
- B、根尖孔较大
- C、牙髓血运丰富
- D、根尖乳头再生能力强
- E、以上均正确

70、下列不能用于根管充填术根管消毒药物的是

- A、氢氧化钙
- B、甲醛甲酚
- C、樟脑酚
- D、木榴油
- E、氧化锌

71、乳牙早失的原因，叙述正确的

- A、严重龋病，牙髓病和根尖周病
- B、恒牙异位萌出，乳牙根过早吸收
- C、外伤导致
- D、先天性牙齿缺失
- E、以上均正确

72、多生牙最常见的位置

- A、侧切牙区
- B、前磨牙区
- C、下前牙区
- D、上颌恒中切牙之间
- E、磨牙区

73、对于继承恒牙已经萌出，未能按时脱落的乳牙，或者恒牙未萌出，保留在恒牙列中的乳牙，是指

- A、牙齿固连
- B、乳牙早失
- C、乳牙迟萌
- D、乳牙滞留
- E、异位萌出

74、年轻恒牙全脱出多发生于

- A、上颌中切牙
- B、上颌侧切牙
- C、上颌尖牙
- D、下颌中切牙
- E、下颌侧切牙

75、乳牙牙震荡在术后复查的时机说法正确的是

- A、术后 4 周、3 个月、6 个月
- B、术后 1 个月、6 个月、12 个月
- C、术后 3 个月、6 个月、9 个月
- D、术后 6 个月、12 个月
- E、不必复查

76、深龋的治疗原则中错误的说法是

- A、停止龋病发展
- B、促进牙髓的防御反应
- C、保护牙髓
- D、正确判断牙髓状况
- E、彻底去净腐质

77、玻璃离子体的优点不包括

- A、良好的粘接性
- B、生物相容性
- C、释放氟离子
- D、耐溶解性
- E、良好的物理机械性能

78、以下有关复合树脂的论述中，不恰当的是

- A、无机填料是决定复合树脂物理性能和临床应用的关键成分
- B、树脂基质是复合树脂的主要聚合成分
- C、最常用的树脂基质是丙烯酸酯类
- D、临床上每层充填和固化的材料厚度不超过 2mm
- E、化学固化复合树脂为目前主流的复合树脂

79、临床记录中，颊面以英文字母命名

- A、L
- B、B
- C、O
- D、La
- E、I

80、银汞合金充填后，患牙需等待多久后才能咀嚼

- A、3h
- B、6h
- C、12h
- D、24h
- E、48h

81、牙内陷常见于

- A、上颌中切牙
- B、上颌侧切牙
- C、下颌中切牙
- D、下颌侧切牙
- E、上颌尖牙

82、畸形中央尖属于

- A、牙形态发育异常
- B、牙结构发育异常
- C、牙颜色发育异常
- D、牙数目发育异常
- E、牙组织发育异常

83、临床牙冠变短，咬合面或者切缘低于正常牙的牙脱位类型为

- A、脱出性脱位
- B、嵌入性脱位
- C、侧向性脱位
- D、牙齿完全脱位
- E、牙根外吸收

84、根尖 1/3 处折断的患牙处理为

- A、固定并定期观察
- B、牙髓状况良好，可调（牙合），观察
- C、不治疗
- D、牙髓治疗
- E、定期观察

85、下列哪项不是酸蚀症的致病因素

- A、饮食酸性饮料
- B、酸性药物
- C、胃酸
- D、树脂修复前的酸蚀凝胶
- E、职业相关酸性物质

86、关于牙隐裂治疗原则最佳的选项是

- A、对因治疗
- B、对症治疗
- C、防止劈裂
- D、以上均正确
- E、以上均不正确

87、牙本质敏感症对哪种刺激的反应最为显著

- A、冷刺激
- B、热刺激
- C、酸刺激
- D、甜刺激
- E、机械刺激

88、下列有关牙本质过敏症的叙述中，不正确的是

- A、发作迅速、疼痛尖锐
- B、发作时间短暂
- C、是一种独立的疾病
- D、刺激除去后疼痛立即消失
- E、以机械刺激最为显著

89、关于逆行性牙髓炎的临床表现不正确的是

- A、可探及深的牙周袋
- B、严重的根分叉病变
- C、可有叩痛
- D、温度测验牙髓反应强烈
- E、可探及深龋洞

90、以下哪种牙髓疾病患者同时拥有牙髓炎和牙周炎的临床表现

- A、可复性牙髓炎
- B、急性浆液性牙髓炎
- C、慢性化脓性牙髓炎
- D、逆行性牙髓炎
- E、慢性增生型牙髓炎

91、残髓炎的治疗原则是

- A、干尸疗法
- B、直接盖髓术
- C、活髓切断术
- D、再根管治疗
- E、拔出患牙

92、温度刺激出现迟缓且不严重的疼痛，表明可能是

- A、牙髓正常
- B、牙髓坏死
- C、可复性牙髓炎
- D、急性牙髓炎
- E、慢性牙髓炎

93、关于牙髓坏死的临床表现叙述不正确的是

- A、无自觉症状
- B、牙冠变色、无光泽
- C、牙髓诊断性试验有明显反应
- D、牙冠可存在深龋洞
- E、X 线片示根尖周影像无明显异常

94、下列哪项是牙髓坏死与可复性牙髓炎的鉴别要点

- A、叩诊不适
- B、牙髓温度测验反应不同
- C、牙龈无瘻管
- D、X 线片显示根尖周正常
- E、X 线片显示髓腔影像正常

95、牙内吸收的原因尚不明了，但常可见于

- A、受过外伤的牙
- B、再植牙
- C、活髓切断术后的牙
- D、盖髓术后的牙
- E、以上都是

96、临床上最常见的根尖周病是

- A、急性根尖周炎浆液期
- B、急性根尖周炎化脓期
- C、慢性根尖周炎
- D、急性牙髓炎
- E、中央性颌骨骨髓炎

- 97、急性化脓性根尖周炎的临床表现，除外
- A、自发性剧烈性跳痛
  - B、不敢咀嚼，牙有伸长感
  - C、局部淋巴结可有肿痛
  - D、患牙Ⅱ～Ⅲ度松动
  - E、疼痛不能定位
- 98、生理性根尖孔通常距解剖根尖约
- A、0.5～2mm
  - B、1～3mm
  - C、3～4mm
  - D、4～5mm
  - E、5～6mm
- 99、根管治疗失败且不适合根管再治疗的患牙，应进行
- A、根管再治疗
  - B、根尖手术
  - C、牙周手术
  - D、翻瓣术
  - E、根尖诱导成形术
- 100、桩冠修复的患牙应选用下列哪项根充材料
- A、氢氧化钙糊剂
  - B、牙胶尖+氢氧化钙糊剂
  - C、银尖+糊剂
  - D、塑化液
  - E、氧化锌糊剂

# 全专业执业医师考试操作、题卷 尽在「金英杰医学广西校区」

任何疑问，找我聊



金英杰医学广西校区



广西小杰君带你过医考



黄老师带你过医药考（南宁）



黄老师南宁医考陪跑



金英杰医学教育广西校区

