

考前必刷 300 题

1. 脓性指头炎若疼痛剧烈，局部张力较大时，应及时做的处理是
 - A. 切开减压引流
 - B. 应用止痛片
 - C. 理疗
 - D. 局部涂鱼石脂软膏导热
 - E. 行拔甲术
2. 患者女性，40 岁，因月经异常入院就诊。入院后诊断为子宫肌瘤。护士在询问病史时应着重询问
 - A. 性生活史
 - B. 孕产史
 - C. 是否长期使用雌激素
 - D. 饮食习惯
 - E. 家族中是否有类似的疾病
3. 通常对开放性损伤进行清创，清创的最佳时间
 - A. 伤后 1~2 小时
 - B. 伤后 3~5 小时
 - C. 伤后 6~8 小时
 - D. 伤后 12 小时
 - E. 伤后 24 小时
4. 抗幼年类风湿关节炎治疗的主要药物是
 - A. 青霉素
 - B. 红霉素
 - C. 水杨酸制剂
 - D. 维生素 C
 - E. 维生素 D
5. 在病情观察中，中医的“四诊”方法是
 - A. 辨、证、论、治
 - B. 望、触、叩、听
 - C. 触、摸、按、压
 - D. 望、触、问、切
 - E. 望、闻、问、切
6. 以下哪项为肝硬化患者肝功能失代偿期的典型表现
 - A. 头晕、头痛
 - B. 意识障碍
 - C. 蜘蛛痣
 - D. 腹痛腹泻
 - E. 腹水
7. CO 中毒时，常最先受损的脏器是
 - A. 肝
 - B. 肾

- C. 脑
D. 肺
E. 脾
8. 老年男性泌尿系统梗阻常见的病因是
A. 包皮过长
B. 结石损伤
C. 盆腔内疾病
D. 先天性畸形
E. 前列腺增生症
9. 肝性脑病最早出现的表现是
A. 定向力障碍
B. 反射亢进
C. 性格和行为改变
D. 巴宾斯基征阳性
E. 昏睡
10. 患者男性，45 岁。左侧肩部一略隆起的紫红色浸润区，质韧，界不清，中央部表面有多个脓栓，患者诊断为疔时，血常规检查异常最可能的是
A. 淋巴细胞明显增多
B. 嗜酸性粒细胞增多
C. 中性粒细胞明显增加
D. 白细胞减少
E. 嗜碱性粒细胞增多
11. 患者男性，42 岁，炎热夏天，高温下在外连续工作，出现剧烈头痛、头晕、全身无力，继而体温 40 °C，来急诊就诊，考虑为热射病。护士首先应采取
A. 头部用冰袋或冷水湿敷
B. 吸氧
C. 测量血压
D. 心电监护
E. 安慰病人
12. 晚期肝硬化最严重的并发症是
A. 肝肺综合征
B. 上消化道出血
C. 感染
D. 肝肾综合征
E. 肝性脑病
13. 患者男性，18 岁。因摔伤致右肘关节疼痛伴活动受限四小时入院，查体见局部肿胀畸形，未及骨擦音骨擦感，局部活动受限，请问下列哪项是肘关节脱位的典型临床特征
A. 肘部明显畸形，前臂缩短，肘关节周径增粗
B. 肘后三角失去正常关系
C. 肘关节弹性固定于半伸位
D. 肘关节前方可摸到肱骨远端，肘后方可摸到尺骨鹰嘴
E. 肘后可扪及关节空虚
14. 肾盂肾炎最常见的致病菌是
A. 变性杆菌

- B. 大肠杆菌
C. 葡萄球菌
D. 厌氧菌
E. 链球菌
15. 患者男性，40 岁，股骨颈骨折，石膏固定 1 小时后护士发现局部颜色发紫，此时护士应立即
- A. 进行功能锻炼
B. 继续观察
C. 迅速减压
D. 局部按摩
E. 局部垫海绵垫
16. 患者男性，45 岁，因胸部损伤、张力性气胸急诊入院。为配合抢救，护士必须准备的物品是
- A. 输液器
B. 氧气湿化瓶
C. 气管插管包
D. 吸引器
E. 胸腔闭式引流瓶
17. 患者男性，45 岁。在野外工作时足底不慎被锈钉刺伤，2 日后出现全身肌肉强直性收缩，阵发性痉挛，来急诊就诊，考虑可能为破伤风。对破伤风患者的治疗和护理，下列措施正确的是
- A. 呼吸道隔离
B. 患者住单人房间，避免水声、光、风的刺激
C. 咽肌和呼吸肌痉挛不能用镇静剂控制时，应使用面罩给氧
D. 医务人员接触患者时，戴口罩帽子，可不戴手套
E. 可肌内注射青霉素治疗
18. 患者，女性，27 岁，因外伤导致头皮裂伤。处理方式为清创术，护士向患者解释行清除术的时间可延长到
- A. 10 h
B. 12 h
C. 18 h
D. 24 h
E. 72 h
19. 患者，27 岁，男性，车祸造成多发性损伤，急救车首先要处理的情况是
- A. 膀胱破裂
B. 颅脑外伤
C. 开放性骨折
D. 外伤性大出血
E. 腹部外伤后肠管脱出
20. 患者，女性，68 岁，农民，2 年前无明显诱因出现双腕、双手关节和双膝、踝、足、跖趾关节肿痛，伴晨僵，时间约 30 分钟，疼痛以夜间明显，影响行动。实验室检查：血沉 55 mm/h，RF (+) 关节 X 线检查：双手骨质疏松，腕部关节间隙变窄，最可能的诊断是
- A. 类风湿关节炎
B. 骨性关节炎

- C. 系统性红斑狼疮
D. 干燥综合征
E. 银屑病关节炎
21. 给肝硬化腹水患者腹腔穿刺放液时应注意
- A. 加强静脉补液
B. 束紧多头腹带
C. 指导患者限制饮水
D. 观察尿量是否减少
E. 取平卧位
22. 患者男性，23 岁。足底被锈钉子刺伤，仅自行简单处理。如发生破伤风通常会在什么时候发作
- A. 1~3 天
B. 6~12 天
C. 14 天
D. 15~21 天
E. 28~30 天
23. 急性胰腺炎的主要表现和首发症状是
- A. 低血压或休克
B. 发热
C. 腹痛
D. 恶心、呕吐与腹胀
E. 水、电解质及酸碱平衡紊乱
24. 六淫的概念是
- A. 内风、内寒、内暑、内湿、内燥、内火
B. 风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的统称
C. 风、寒、暑、湿、燥、火在正常情况下称为“六气”
D. 内风、内寒、内暑、外湿、外燥、外火
E. 外风、外寒、外暑、外湿、外燥、外火
25. 论治的主要依据是
- A. 辩证的结果
B. 病因
C. 病位
D. 病性
E. 病
26. 肾单位的组成是
- A. 肾小球和肾小囊
B. 肾小体和集合管
C. 肾小球和肾小管
D. 肾小体和肾小管
E. 皮质和髓质
27. 膀胱刺激征的表现
- A. 尿急、腰痛、尿频
B. 尿频、尿急、尿多
C. 尿频、尿多、尿痛

- D. 尿急、尿痛、尿频
E. 尿多、尿急、尿痛
28. 患者，女性 30 岁，散步时小腿部不慎被锈铁丝划伤，伤口较深，预防破伤风最关键的措施是
- A. 严密观察
B. 早期彻底清创，并注射破伤风抗毒素
C. 大量应用抗生素
D. 注射免疫球蛋白
E. 注射破伤风类毒素
29. 患者，女性，40 岁。阑尾穿孔腹膜炎手术后第 7 天，护士查体发现患者体温 39.0 °C，伤口无红肿，排便次数增多，混有黏液，伴有里急后重，该护士考虑患者并发了
- A. 盆腔脓肿
B. 病毒性肠炎
C. 伤口感染
D. 膈下脓肿
E. 肠间脓肿
30. 与消化性溃疡发生关系密切的细菌是
- A. 链球菌
B. 霍乱弧菌
C. 幽门螺杆菌
D. 痢疾杆菌
E. 大肠杆菌
31. 患者男，56 岁。肝硬化 3 年，因肝性脑病入院。为防止患者病情加重，应给予
- A. 低脂肪饮食
B. 低蛋白饮食
C. 低嘌呤饮食
D. 低胆固醇饮食
E. 低盐饮食
32. 患者男，35 岁。双下肢严重挤压伤，血压 78/45 mmHg，心率 132 次/分。护理中除严密观察生命体征外，最应密切观察
- A. 下肢肿胀的情况
B. 患者的神志情况
C. 每小时尿量尿色
D. 患肢末端的温度
E. 伤口疼痛的程度
33. 患儿，6 岁，不慎打翻开水瓶，双下肢被开水烫伤后皮肤出现大水疱、皮薄，疼痛明显，水疱破裂后创面为红色。其烧伤深度为
- A. I 度
B. 浅 II 度
C. 深 II 度
D. III 度
E. IV 度
34. 患者，男性，25 岁，昏迷在路边被警察送到医院，体检：深昏迷，呼吸大蒜气味，为进一步确诊有机磷农药中毒，其检测的客观依据是

- A. 血液碳氧血红蛋白测定阳性
B. 心电图 ST-T 改变
C. 全血胆碱酯酶活力低于 70%
D. 脑电图有缺氧性脑病的波形
E. 血气分析 $PaO_2 < 60$ mmHg, $PaCO_2 > 50$ mmHg
35. 患者, 男性, 26 岁, 足部被钉子扎伤后感染破伤风, 出现肌肉阵发性痉挛, 控制痉挛的最主要护理措施是
- A. 住单人隔离病室
B. 限制家属探视
C. 避免声光刺激
D. 遵医嘱使用镇静药物
E. 静脉滴注破伤风抗毒素
36. 小儿, 4 岁。两天来无论活动还是安静时均有阵发性、痉挛性咳嗽。家长怀疑其与小伙伴追逐玩耍时误将硬币吞下, 遂带其就诊以明确诊断。医生告知, 可确诊支气管异物的检查是
- A. X 线检查
B. 磁共振检查
C. 支气管镜检查
D. CT 扫描检查
E. 肺功能检查
37. 急性胃炎频繁呕吐, 首先应观察
- A. 呕吐物性质及量
B. 皮肤出血点
C. 呼吸变化
D. 体温
E. 意识状态
38. 患者男, 43 岁。因胸部挤压伤收住院。查体: 左侧胸廓塌陷畸形, 左侧第 3~7 肋骨骨折。右侧第 3~8 肋骨骨折。此时该患者的首要评估内容
- A. 疼痛是否可以耐受
B. 生命体征是否平稳
C. 体温是否异常
D. 是否有药物过敏史
E. 是否可以维持有效气体交换
39. 多尿是指成人 24 小时尿量大于
- A. 1000mL
B. 1500mL
C. 2000mL
D. 2500mL
E. 3000mL
40. 由肾脏产生的最终合成血管紧张素 II 的激素是
- A. 肾素
B. 促红细胞生成素
C. 前列腺素族
D. 激肽类

E. 缓激肽

41. 患者男, 30 岁, 被利器刺伤胸部引起开放性气胸, 为预防感染可使用

- A. 激素
- B. 维生素
- C. 止痛药
- D. 止血药
- E. 抗生素

42. 最易发生骨折的肋骨是

- A. 第 11~12 肋骨
- B. 第 7~10 肋骨
- C. 第 4~7 肋骨
- D. 第 4~5 肋骨
- E. 第 1~3 肋骨

43. 患者男, 50 岁, 在建筑工地干活时被一铁钉扎伤, 医嘱为破伤风肌内注射, 护士在给患者皮试时, 以下说法错误的是

- A. 当皮丘直径大于 1.5 cm 时, 红晕超过 4 cm 可以判断为结果阳性
- B. 实验为阳性时, 可做破伤风脱敏试验
- C. 破伤风皮试液的浓度是 1 500 IU/ mL
- D. 实验结果为阴性, 余液 0.9 mL 与皮试剩余剂量做肌内注射
- E. 当皮丘周围有伪足, 痒感时可以判断为阳性

44. 闭合性单处肋骨骨折最明显的症状是

- A. 呼吸改变
- B. 局部疼痛
- C. 排痰困难
- D. 休克
- E. 发热

45. 患者女, 26 岁, 下肢急性淋巴管炎, 查体: 见肢体肿胀明显, 局部应擦拭药液是

- A. 0.1% 碘伏
- B. 50% 硫酸镁
- C. 外用生理盐水
- D. 3% 过氧化氢
- E. 75% 酒精

46. 患者女, 30 岁。因淋雨受凉 2 日后, 出现咽痛, 畏寒。体温 39 °C, 伴头痛, 乏力。食欲减退, 体重下降。近两日来体重减少 2 kg。根据以上资料判断, 该患者目前不存在的护理问题是

- A. 疼痛: 头痛咽痛、与鼻、咽、喉感染有关
- B. 体液过多: 与体循环瘀血有关
- C. 营养失调: 低于机体需要量, 与食欲减退有关
- D. 体温过高: 与病毒或细菌感染有关
- E. 潜在并发症: 气管支气管炎, 肾小球肾炎

47. 胸部外伤后出现胸廓软化是由于

- A. 一根肋骨多处骨折
- B. 胸骨骨折
- C. 锁骨骨折

- D. 多根多段肋骨骨折
E. 胸肌大面积损伤
48. 浅 II 度烧伤的损伤范围是
A. 角质层
B. 生发层
C. 真皮浅层
D. 真皮深层
E. 皮肤全层
49. 肠套叠患儿的大便性状是
A. 脓血便
B. 黏液便
C. 柏油便
D. 果酱样便
E. 蛋花汤样便
50. 患者男, 33 岁, 炼钢工人, 工作中不慎被烧伤, III 度烧伤面积 60%, 应采用隔离方式是
A. 接触隔离
B. 消化道隔离
C. 呼吸道隔离
D. 保护性隔离
E. 严密隔离
51. 患者男, 30 岁。车祸伤及头部, 出现右外耳道流出淡血性液体, 右耳听力下降, CT 示颅内积气, 拟诊为“颅中窝骨折”伤后 3 天患者剧烈头痛、呕吐、厌食、反应迟钝、脉搏细弱、血压偏低, 该患者最可能出现了
A. 颅内压增高
B. 颅内压过低
C. 低血糖
D. 颅内感染
E. 颅内出血
52. 患者, 女, 28 岁。车祸后急诊入院, 初步诊断为骨盆骨折合并腹膜后出血, 静脉通路应建立在
A. 上肢或下肢
B. 下肢或颈部
C. 上肢或颈部
D. 左下肢
E. 右下肢
53. 患者男, 45 岁, 因“足底被生锈的铁钉刺伤”就诊, 医嘱注射破伤风抗毒素, 患者诉一周前使用过破伤风抗毒素。引起该患者发生过敏的特异性抗体是
A. IgA
B. IgC
C. IgG
D. IgE
E. IgM
29. 急性胰腺炎的首发症状是
A. 发热

- B. 腹痛
C. 恶心
D. 呕吐
E. 休克
55. 患者男, 40 岁。肿瘤手术后留置脑室引流管。正常的情况下脑室引流每日引流量不超过
- A. 200 mL
B. 400 mL
C. 300 mL
D. 600 mL
E. 500 mL
56. 患者女, 35 岁, 职员。因双肘、胸、手指近端指间关节肿痛 2 年。加重 2 周, 以类风湿关节炎收入院, 医嘱给予泼尼松、布洛芬和青霉胺等药物治疗。现患者诉恶心、反酸和胃部不适。护士向患者解释引起此症状的原因最可能是
- A. 病情加重
B. 青霉胺的不良反应
C. 泼尼松的不良反应
D. 布洛芬的不良反应
E. 为按照医嘱服药
57. 关于预防骨盆骨折病人发生便秘的护理措施, 错误的是
- A. 嘱多食新鲜水果蔬菜
B. 鼓励多喝水
C. 给予腹部按摩
D. 每日灌肠通便
E. 有便意时及时排出
58. 血液 COHb 浓度达到下列哪项时, 提示一氧化碳重度中毒
- A. 5%~14%
B. 15%~20%
C. 25%~30%
D. 35%~40%
E. 50%以上
59. 十二指肠溃疡的好发部位是
- A. 降部
B. 升部
C. 降部和升部
D. 球部
E. 水平部
60. 一成年女性, 左肘关节以下包括左前臂和左手, 被开水烫伤, 烧伤面积为
- A. 9%
B. 21%
C. 18%
D. 11%
E. 5.5%
61. 治疗破伤风病人时, 注射破伤风抗毒素的作用是
- A. 中和游离毒素

- B. 清除毒素来源
C. 控制并解除痉挛
D. 防止并发症
E. 保持呼吸通畅
62. 口底、颌下及颈部蜂窝织炎的最严重后果是
A. 发热
B. 吞咽困难
C. 呼吸困难窒息
D. 全身性感染
E. 化脓性海绵状静脉窦炎
63. 类风湿关节炎最基本的病理变化是
A. 血管炎
B. 骨质增生
C. 周围神经病变
D. 关节滑膜炎
E. 软骨增生
64. 急性胰腺炎患者禁食的目的是
A. 避免胃扩张
B. 解除胰管痉挛
C. 控制饮食
D. 减少胰液分泌
E. 减少胃液分泌
65. 患儿，女，6岁，因家中起火造成大面积烧伤，护士应提供的护理级别是
A. 一级护理
B. 二级护理
C. 三级护理
D. 特级护理
E. 重症护理
66. 患者，女性，25岁。左下肢外伤后，未得到正确处理，而导致破伤风。为该患者左下肢伤口更换敷料后，其敷料处理方法是
A. 送焚烧炉焚烧
B. 过氧乙酸浸泡后清洗
C. 日光下暴晒后清洗
D. 丢入污物桶后再集中处理
E. 高压灭菌后再清洗
67. 中医的五脏是指心、肝、脾、肺和
A. 胃
B. 脑
C. 肾
D. 小肠
E. 三焦
68. 患者，男性，因车祸急诊，查体可见眶周和球结膜下瘀斑，鼻腔有血性液体流出，应考虑该患者可能存在
A. 颅前窝骨折

- B. 硬脑膜外血肿
C. 硬脑膜下血肿
D. 颅中窝骨折
E. 颅后窝骨折
69. 患者，女性，67 岁，车祸后出现下列损伤，现场护士急救时优先处理的是
A. 胸壁损伤
B. 张力性气胸
C. 右侧肱骨开放性骨折
D. 腓骨干骨折
E. 右前臂皮肤擦伤
70. 阴道豆渣样白带见于
A. 老年性阴道炎
B. 假丝酵母菌阴道炎
C. 滴虫阴道炎
D. 慢性宫颈炎
E. 外阴炎
71. 慢性宫颈炎最常见的病变是
A. 宫颈糜烂
B. 宫颈肥大
C. 宫颈息肉
D. 宫颈腺体囊肿
E. 宫颈糜烂炎
72. 患者，女性，38 岁，因外伤瘫痪导致尿失禁，留置导尿，尿液出现浑浊、色黄，护理时应注意
A. 进行膀胱冲洗
B. 观察尿量并记录
C. 促进膀胱功能恢复
D. 及时更换导尿管
E. 经常清洗尿道口
73. 正常人瞳孔直径为
A. 1~2 mm
B. 2~5 mm
C. 3~6 mm
D. 5~7 mm
E. 7 mm 以上
74. 关于小儿腹泻的治疗措施，应除外
A. 纠正水、电解质紊乱
B. 严重脱水应及时补液
C. 及时使用止泻剂
D. 给予助消化药
E. 要注意补钾
75. 病人呼吸气味中有大蒜味，应考虑
A. 尿毒症
B. 酮症酸中毒

- C. 有机磷农药中毒
D. 肺癌
E. 支气管感染
76. 一氧化碳中度中毒的典型体征是
A. 四肢乏力
B. 意识模糊
C. 血压上升
D. 口唇樱桃红色
E. 呼吸、循环衰竭
77. 肾病综合征初期水肿的特点是
A. 全身水肿明显
B. 眼睑、面部水肿为主
C. 水肿呈低垂性水肿
D. 无胸腹水发生
E. 水肿一般不严重
78. 以下移植方法哪一类存活率最高
A. 自体移植
B. 同质移植
C. 充分配血及组织配型后移植
D. 同种异体移植
E. 异种异体移植
79. 人工肛门的护理方法正确的是
A. 禁忌扩张造口
B. 患者进食后 3~4 日未排便，可低压灌肠
C. 造口袋内排泄物超过 3/4 时应更换造口袋
D. 肛门袋宜长期持续使用，少更换
E. 局部皮肤保持湿润
80. 下列食物中属于痛风患者可以选择食用的是
A. 鸡肝
B. 黄豆
C. 海鲜类
D. 牛奶
E. 牛肉汤
81. 患者，女性，26 岁，前胸双上肢烧伤急诊入院，主诉口干、剧烈疼痛，尿少。体检：脉搏细数，血压 75/60 mmHg，血容量减少的原因是
A. 剧烈疼痛
B. 心功能不全
C. 血浆渗出到组织间隙和创面
D. 心力衰竭
E. 末梢血管扩张
82. 患者，男性，40 岁。因发热、寒战、咳嗽、呼吸急促 9 小时来诊，查体：体温 38.7 °C，脉搏 140 次/分，呼吸 36 次/分，神志朦胧，皮肤潮红，双肺有湿啰音，瞳孔等大等圆，对光反射 (-)，初步诊断为肺部感染，给予抗生素等对症处理，生命体征 q2h 监测，护士在观察病情中发现其瞳孔缩小，烦躁，肢体有抽动及震颤，及时报告医师，经再次详细询问发病

经过时，其家属告知发病前曾食用大量的水果、新鲜蔬菜，立即进行了一系列的实验室检查。

最可能的诊断是

- A. 亚硝酸盐中毒
- B. 煤气中毒
- C. 有机磷农药中毒
- D. 酒精中毒
- E. 安眠药中毒

83. 关于丹毒病人的护理，下列哪项是错误的

- A. 急性期局部做热敷
- B. 局部硫酸镁湿敷
- C. 患肢抬高，制动
- D. 抗生素的应用
- E. 需接触隔离

84. 患者，男性，27 岁，前臂行石膏绷带包扎后 3 h。患者向护士诉手指剧痛。护士查体，发现手指发凉、发绀，不能自主活动。该护士首先考虑为

- A. 低血容量性休克
- B. 石膏绷带包扎过紧
- C. 神经损伤
- D. 体位不当
- E. 静脉栓塞

85. 患者，女性，35 岁，因股骨干骨折给予持续骨牵引，下列护理不妥的是

- A. 足部不抵床栏
- B. 及时清除骨针孔血痂
- C. 抬高床脚
- D. 常测患肢长度
- E. 鼓励按照要求做患肢活动

86. 患者，男性，40 岁，胃癌。在硬膜外麻醉下行胃大部切除术，手术顺利，术后安返病房。

护士应注意观察的并发症是

- A. 胃肠吻合瘘
- B. 输血栓塞
- C. 术后出血
- D. 早期倾倒综合征
- E. 碱性反流性食管炎

87. 患者，女性，55 岁，车祸造成腹部损伤，护士第一时间得知其有开放性膀胱破裂，首先要准备的抢救措施是


- A. 积极止痛
- B. 给予抗生素抗感染
- C. 进行手术前准备
- D. 留置导尿
- E. 准备抗休克药物

88. 破伤风最早出现的症状是

- A. 角弓反张
- B. 张口不便
- C. 苦笑面容

- D. 牙关紧闭
E. 四肢抽搐
89. 痈与疔的主要鉴别点是
- A. 常见于糖尿病患者
B. 致病菌不同
C. 全身中毒症状明显
D. 发生的部位不一样
E. 创面有多个脓肿
90. 手术区皮肤消毒范围应包括切口周围
- A. 5 cm
B. 10 cm
C. 15 cm
D. 25 cm
E. 30 cm
91. 烧伤的严重程度分类主要根据是
- A. 致伤因子
B. 烧伤部位
C. 病人年龄
D. 烧伤面积和深度
E. 病人体质
92. 患者，女性，62 岁。慢性阻塞性肺气肿病史十多年。今日傍晚进餐时一米粒呛入气管引起剧烈咳嗽，突然呼吸困难，右胸刺痛，逐渐加重。最可能是发生了
- A. 自发性气胸
B. 支气管阻塞
C. 胸腔积液
D. 肺栓塞
E. 心肌梗死
93. 幽门梗阻患者因长期呕吐会造成
- A. 低钾低氯性代谢性碱中毒
B. 低钾高氯性代谢性酸中毒
C. 高钾低氯性呼吸性碱中毒
D. 低钾低氯性代谢性酸中毒
E. 高钾低氯性代谢性酸中毒
94. 男性，30 岁，电工，操作不慎，电流接触不良产生电弧热，引起头面、颈部烧伤，有水疱，部分水疱破损，创面基底苍白，有疼痛，对病人烧伤面积和深度的估计是
- A. 4%深 II 度
B. 4%浅 II 度
C. 9%深 II 度
D. 9%浅 II 度
E. 4%III 度
95. 患者背部大片明显红、肿、痛，与正常皮肤之间的界限不清，无波动感，伴有寒战、发热、白细胞增加，最可能的诊断是
- A. 疔
B. 痈

- C. 蜂窝织炎
D. 浅表脓肿
E. 丹毒
96. 患者，男性，35 岁，从事园林工作，不慎造成中毒来院就诊，护士应提醒患者在喷洒农药时特别要注意的防护措施是
- A. 戴好防护用具
B. 穿长腿裤，戴护目镜
C. 穿长袖上衣
D. 穿质厚的长袖上衣及长裤
E. 戴好口罩手套
97. 患者，女性，66 岁。因颅内压增高，头痛逐渐加重，行腰椎穿刺脑脊液检查。术后突然停止呼吸，血压下降。该患者最可能发生了
- A. 小脑幕切迹疝
B. 枕骨大孔疝
C. 脑栓塞
D. 脑干缺血
E. 心肌梗死
98. 脑复苏中首选的脱水剂为
- A. 25%葡萄糖液
B. 50%葡萄糖液
C. 20%甘露醇
D. 速尿
E. 尿素
99. 急性腹膜炎发生休克的主要原因
- A. 剧烈疼痛
B. 腹膜吸收大量毒素，血容量减少
C. 肠内积液刺激
D. 大量呕吐失液
E. 腹胀引起呼吸困难
100. 骨折、脱位共有的特殊体征是
- A. 弹性固定
B. 异常活动
C. 骨擦音
D. 畸形
E. 关节部位空虚
101. 主动脉瓣关闭不全的杂音听诊位置是



- A. A
- B. E
- C. M
- D. T
- E. P

102. 患者女, 27 岁, 心慌气短 8 年, 反复咯血 2 年, 近 2 日咯血不止, 查体: 双颊紫红, 唇发绀, 心率 120 次/分, 心尖区有舒张期杂音, 下肢浮肿, 肝脾肿大, 患者出现心尖区舒张期杂音的最可能原因是

- A. 三尖瓣狭窄
- B. 肺动脉瓣狭窄
- C. 心包炎
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 二尖瓣狭窄

103. 患者, 女性, 34 岁, 停经 3 个月, 腹痛, 阴道规则出血 2 周, 今日阴道流出水泡状物。查体: 子宫如孕 4 个月大, 正确的诊断是

- A. 异位妊娠
- B. 不全流产
- C. 葡萄胎
- D. 侵蚀性葡萄胎
- E. 子宫肌瘤

104. 对焦虑症患者的处理不恰当的是

- A. 矫正病人歪曲的认知
- B. 利用生物反馈信息训练病人放松
- C. 督导病人进行放松式调理
- D. 关注患者过多不适的主诉
- E. 转移患者注意力, 减轻焦虑情绪

105. 服用下列药物时, 需常规测量脉搏或心率的是

- A. 心得安
- B. 安定
- C. 洋地黄
- D. 强的松
- E. 氯丙嗪

106. 根据血压水平的定义和分类, 血压 130/88 mmHg 属于
- A. 正常血压
 - B. 正常高值
 - C. I 级高血压
 - D. II 级高血压
 - E. III 级高血压
107. 慢性支气管炎发生和加重的重要因素是
- A. 大气污染
 - B. 冷空气刺激
 - C. 吸烟
 - D. 反复感染
 - E. 过敏反应
108. 细菌性肺炎最常见的病原菌是
- A. 克雷伯杆菌
 - B. 铜绿假单胞菌
 - C. 大肠杆菌
 - D. 肺炎链球菌
 - E. 葡萄球菌
109. 患者, 女, 63 岁, 因支气管扩张合并肺部感染、左心心力衰竭入院治疗, 入院时体温 39 °C, 呼吸急促, 端坐呼吸。遵医嘱给予地高辛治疗, 患者服用地高辛几天后, 出现恶心、呕吐、视物模糊, 护士应立即
- A. 报告护士长
 - B. 给予止吐药
 - C. 做心电图检查
 - D. 做好患者心理护理
 - E. 停止服药并报告医生
110. 青年女性患者, 患支气管扩张多年, 常反复咯血。就诊时又因剧烈咳嗽而致大咯血, 在观察中突然发现咯血中止, 病人表情恐怖, 张口瞪眼, 两手乱抓, 应考虑发生下列何种紧急状况而需立即抢救
- A. 肺梗塞
 - B. 窒息
 - C. 休克
 - D. 呼吸衰竭
 - E. 心力衰竭
111. 患者, 男性, 85 岁。无明显诱因出现精神失常, 表现能凭空听到已故的亲人呼唤他, 叫他也随他们而去, 称自己走到哪里那些已故的亲人都跟着他, 患者出现了
- A. 正常人没有的知觉
 - B. 歪曲的知觉
 - C. 歪曲的感觉
 - D. 虚幻的知觉
 - E. 虚幻的感觉
112. 患抑郁症病人告诉你: “别在我这费时间了, 去和那些值得你费功夫的人谈谈吧。” 你的最佳反应是
- A. “不用担心, 我有的是时间”

- B. “如果你不想说，我们就在这坐一会儿”
- C. “你这样孤独对你没有好处”
- D. “你这样说可不对”
- E. “别这么说，你应该振作一点”

(113~114 题共用题干)

患者，女性，35 岁，“胃切除术”4 年。近 2 年患者头晕、心悸、气短，疲乏无力，诊断为缺铁性贫血。

113. 导致患者贫血的原因可能是

- A. 铁吸收不良
- B. 铁不能利用
- C. 饮食中供铁不足
- D. 损失铁过多
- E. 育龄期女性需铁量增加

114. 指导患者口服铁剂的要点应除外

- A. 用吸管服用液体铁剂，避免牙齿染色
- B. 如有消化道反应，可与果汁同服
- C. 可同服茶，促进铁吸收
- D. 宜于进餐后服用
- E. 血红蛋白正常后，需继续服铁 6~8 周

115. 符合慢性阻塞性肺气肿的体征是

- A. 叩诊呈鼓音
- B. 单侧语颤减弱
- C. 单侧呼吸运动减弱
- D. 气管偏移
- E. 呼气时间延长

116. 闻及两肺满布湿啰音，应考虑

- A. 阻塞性肺气肿
- B. 急性肺水肿
- C. 支气管哮喘
- D. 支气管扩张
- E. 肺脓肿

117. 急性脓胸具有确诊意义的是

- A. 胸痛、气促
- B. 肋间饱满
- C. 呼吸音减弱
- D. X 线片示大片浓密阴影
- E. 胸穿抽出脓液

118. 患者，男性，65 岁，常年有咳嗽，咳少量白痰。近 4 个月咳嗽加剧，偶有血痰、乏力、低热，抗感染治疗效果不显著。胸部 X 线检查未见异常。患者吸烟 18 年，每天 1 包。首先考虑可能的情况是

- A. 慢性咽喉炎
- B. 慢性支气管炎
- C. 支气管哮喘
- D. 支气管肺癌

- E. 肺炎
119. 尿液呈酱油色的疾病是
- A. 阻塞性黄疸
 - B. 急性溶血
 - C. 肝细胞性黄疸
 - D. 恶性痢疾
 - E. 晚期血丝虫病
120. 诊断癫痫最有价值的检查是
- A. CT
 - B. MRI
 - C. 脑电图
 - D. 心导管检查
 - E. 脑血管造影
121. 深静脉血栓形成的患者，抗凝治疗期间最严重的并发症是
- A. 出血
 - B. 继发性感染
 - C. 动脉痉挛
 - D. 血栓与静脉壁粘连并逐渐退化
 - E. 形成再通静脉
122. 社区获得性肺炎最常见的病原菌是
- A. 立克次体
 - B. 金黄色葡萄球菌
 - C. 溶血性链球菌
 - D. 衣原体
 - E. 肺炎链球菌
123. 我国大肠癌好发部位是
- A. 直肠
 - B. 升结肠
 - C. 降结肠
 - D. 横结肠
 - E. 乙状结肠
124. 患儿，14 个月，因发热、咳嗽、食欲降低、呕吐 4 d 后出现惊厥入院。体检：体温 39.5 °C，咽部充血明显，前囟平坦。分诊护士考虑该患儿惊厥的原因首先可能是
- A. 急性脑炎
 - B. 低血糖
 - C. 癫痫持续状态
 - D. 缺血缺氧性脑病
 - E. 高热惊厥
125. 婴幼儿最常见的贫血是
- A. 感染性贫血
 - B. 失血性贫血
 - C. 溶血性贫血
 - D. 缺铁性贫血
 - E. 营养性巨幼细胞贫血

126. 护理法洛氏四联症患者，要注意保证摄入量，防止脱水。其目的是
- A. 防止便秘
 - B. 防止休克
 - C. 防止血栓栓塞
 - D. 防止心力衰竭
 - E. 防止肾功能衰竭
127. 小儿扁桃体炎的好发年龄为
- A. 新生儿
 - B. 1 岁
 - C. 1~3 岁
 - D. 4~10 岁
 - E. 14~15 岁
128. 患者，男性，25 岁，体检时发现缺铁性贫血。最常见的原因是
- A. 缺乏维生素
 - B. 骨髓造血不良
 - C. 铁需要量过多
 - D. 慢性失血
 - E. 叶酸缺乏
129. 患者，男性，75 岁，突然剧烈头痛，呕吐，随后出现昏迷。鉴别患者是脑出血或蛛网膜下腔出血的依据是
- A. 体温高低
 - B. 有否肢体瘫痪
 - C. 白细胞多少
 - D. 脑脊液是否血性
 - E. 有否颈强直
130. 患者，女性，62 岁。突然出现心前区疼痛伴大汗 2 小时，急诊就医，诊断为急性心肌梗死。给患者的护理措施中，下列正确的是
- A. 鼓励病人大量进食
 - B. 尽量避免搬运
 - C. 增加探望，增加信心
 - D. 静脉输液速度宜快
 - E. 如有便秘立即灌肠
131. 患者，女性，55 岁。护士为其测量脉搏时发现，每隔 2 个正常搏动后出现 1 次期前收缩，称为
- A. 二联律
 - B. 三联律
 - C. 间歇脉
 - D. 水冲脉
 - E. 绌脉
132. 患者，男性，36 岁，近 2 个月以来出现皮肤紫癜，近 3 天出现牙龈出血不止，体温 39℃，贫血进行性加重，伴乏力、头晕、心悸，肝、脾、淋巴结不大，胸骨无压痛。化验：血红蛋白、白细胞、血小板低于正常，骨髓增生极度减低。该患者可能是
- A. 急性再生障碍性贫血
 - B. 急性白血病

- C. 血小板减少性紫癜
- D. 血友病
- E. 缺铁性贫血

133. 患者，女性，75岁，患高血压性心脏病9年，近2年来患者明显感觉体力下降，轻微日常活动即感心悸、呼吸困难，休息较长时间后症状方可缓解。护士判断此患者目前的心功能处于

- A. 前驱期
- B. I级
- C. II级
- D. III级
- E. 心力衰竭

134. 患者，女性，65岁，患急性心肌梗死，病情平稳，没有并发症，第1周末护理措施应该是

- A. 床上活动四肢
- B. 乙醇湿化给氧
- C. 高热量高蛋白饮食
- D. 大小便由人扶到卫生间
- E. 进食洗漱向护理人员协助

135. 患者，男性，27岁，印刷厂彩印车间，工人。因特发性血小板减少性紫癜住院，应用糖皮质激素治疗半月后好转出院。护士进行出院前的健康指导时，错误的是

- A. 必须调换工种
- B. 坚持饭后服药
- C. 避免到人多聚集的地方
- D. 注意自我病情监测
- E. 若无新发出血可自行停药

136. 慢性心力衰竭最常见的诱因是

- A. 妊娠
- B. 水电解质平衡紊乱
- C. 服用洋地黄药物
- D. 感染
- E. 过度劳累

137. 关于高血压病全身小动脉的病理生理改变，正确的叙述是

- A. 管腔内径缩小
- B. 血管床减少
- C. 侧支循环闭塞
- D. 管腔扩张
- E. 壁腔比值减少

答案：A

138. 左心功能不全最早和最常见的症状是

- A. 劳力性呼吸困难
- B. 咳嗽
- C. 气短，伴咳粉红色泡沫痰
- D. 心悸
- E. 少尿

139. 下列关于心源性水肿的说法正确的是

- A. 是左心功能不全的表现
- B. 水肿时醛固酮减少
- C. 毛细血管内压降低
- D. 水肿先出现在身体下垂部位
- E. 有效循环血容量增多

140. 治疗军团菌肺炎的首选抗生素是

- A. 林可霉素
- B. 红霉素
- C. 庆大霉素
- D. 头孢氨苄
- E. 羟氨苄青霉素

141. 患者，女，40岁。侵蚀性葡萄胎，给予5-氟尿嘧啶和更生霉素联合化疗8天。该患者可能出现的最严重的不良反应是

- A. 恶心、呕吐
- B. 脱发
- C. 骨髓抑制
- D. 出血性膀胱炎
- E. 口腔溃疡

142. 关于胸腔闭式引流的护理，下列哪项不正确

- A. 病人可采取半卧位
- B. 观察引流管是否通畅
- C. 注意无菌操作
- D. 引流管的位置必须低于胸腔
- E. 肺组织修复后立即拔管

143. 法洛四联症的四种病理变化中最重要的是

- A. 肺动脉狭窄
- B. 主动脉骑跨
- C. 室间隔缺损
- D. 房间隔缺损
- E. 动脉导管未闭

144. 室性心动过速最常见的病因是

- A. 心脏瓣膜病
- B. 感染性心内膜炎
- C. 冠心病
- D. 心肌炎
- E. 心肌病

145. 常见的青紫型先天性心脏病是

- A. 动脉瓣狭窄
- B. 房间隔缺损
- C. 室间隔缺损
- D. 法洛四联症
- E. 动脉导管未闭

146. 临床上最常见的心律失常为

- A. 窦性心律不齐
B. 窦性心动过缓
C. 窦性心动过速
D. 心室颤动
E. 期前收缩
147. 下列保持大便通畅措施中，心力衰竭病人不适宜采用的是
- A. 摄入足够量的水分
B. 养成定时大便的习惯
C. 开塞露的应用
D. 进食容易消化的食物
E. 多吃含纤维素多的食物
148. 心脏瓣膜的功能是
- A. 防止感染
B. 净化血液
C. 起部分血液泵作用
D. 调节心脏功能
E. 防止血液反流
149. 二尖瓣膜位于什么部位
- A. 左侧房室之间
B. 右侧房室之间
C. 左心室与主动脉之间
D. 右心室与主动脉之间
E. 左右心室之间
150. 心脏传导系统中自律性最高的是
- A. 房室结
B. 结间束
C. 希氏束
D. 窦房结
E. 浦肯野细胞
151. 防止术后肺不张，下列哪项是错误的
- A. 术前一周卧床休息，减少活动
B. 术前控制呼吸道感染
C. 嗜烟者术前戒烟 1~2 周
D. 术中或术后防止呕吐物吸入
E. 术前锻炼深呼吸
152. 患者，女性，65 岁。因胸痛就诊，既往有心绞痛八年。鉴别急性心肌梗死与心绞痛，症状的主要区别是
- A. 引起诱因不同
B. 疼痛部位不同
C. 疼痛性质不同
D. 疼痛表现不同
E. 疼痛持续时间不同
153. 休克患者经扩容治疗后，测中心静脉压 20 cmH₂O，血压 80/50 mmHg，应考虑
- A. 血容量严重不足

- B. 心功能不全
C. 容量血管过度收缩
D. 容量血管过度扩张
E. 心功能恢复
154. 患儿女，9 个月。生后一直奶粉喂养，未加辅食，体检：营养差，皮肤苍白，化验：血红蛋白 60 g/L，红细胞 $2 \times 10^{12}/L$ ，此患儿确诊为营养性缺铁性贫血，导致该患儿缺铁的主要原因是
- A. 铁的丢失过多
B. 铁的储存不足
C. 生长发育快
D. 铁的摄入不足
E. 铁的吸收利用障碍
155. 男，45 岁，吸烟史 20 年，慢性支气管炎史 5 年，近 1 年咳嗽咳痰，发作频繁。护士为病人进行健康教育，下列哪项不妥
- A. 增强营养
B. 注意保暖
C. 戒烟和体育锻炼
D. 需经常使用抗生素
E. 镇咳祛痰药
156. 患者，男性，30 岁。诊断再生障碍性贫血。血常规显示红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 60 g/L，白细胞 $2.8 \times 10^9/L$ ，血小板 $80 \times 10^9/L$ ，该病人最大的危险是
- A. 心力衰竭
B. 失血过多
C. 继发感染
D. 牙龈出血
E. 颅内出血
157. 患儿男，5 岁，出生后 2 个月发现心脏杂音，确诊室间隔缺损，近日来，患儿无诱因出现青紫、不喜动、乏力、呼吸急促，考虑该患儿可能出现
- A. 艾森门格综合征
B. 法洛三联症
C. 呼吸衰竭
D. 差异性青紫
E. 心力衰竭
158. 病人腹壁静脉曲张，脐以上的腹壁静脉血流方向由下向上，脐以下亦由下向上。可能性最大的原因是
- A. 门静脉高压
B. 上腔静脉回流受阻
C. 下腔静脉回流受阻
D. 大量腹水
E. 脾肿大
159. 某病人心前区较饱满。体查：有奇脉，颈静脉怒张，肝颈静脉回流征阳性。应考虑为
- A. 先天性心脏病
B. 右心功能不全
C. 左心功能不全

- D. 心包积液
E. 纵膈肿瘤
160. 王女士，25 岁，因被车撞伤，病人烦躁不安，脉快，收缩压正常、脉压小，面色苍白，出冷汗考虑是
- A. 疼痛引起
B. 休克早期
C. 休克期
D. 休克晚期
E. 精神紧张引起
161. 孙先生，40 岁，因寒战高热，咳嗽，胸痛，来院急诊，胸透右上肺有云絮状阴影，查痰肺炎球菌(+)，该病人血象如何
- A. 嗜酸性粒细胞增加
B. 淋巴细胞增加
C. 中性粒细胞增加
D. 大单核细胞增加
E. 嗜碱性细胞增加
162. 患儿，2 岁，消瘦，哭闹时青紫，平静后青紫消失，查体：胸骨左缘 2~3 肋间可闻及收缩期杂音，肺动脉瓣区第二心音亢进，并固定分裂。该患儿最可能的诊断是
- A. 室间隔缺损
B. 房间隔缺损
C. 动脉导管未闭
D. 法洛四联症
E. 主动脉狭窄
163. 患者，女性，70 岁，突感胸骨后疼痛，窒息濒死感，伴恶心、呕吐及出冷汗，含服硝酸甘油疼痛不缓解。最可能的诊断为
- A. 急性胰腺炎
B. 心绞痛
C. 主动脉狭窄
D. 急性心肌梗死
E. 心肌炎
164. 呼吸衰竭发生时，最早因缺氧发生损害的组织器官是
- A. 大脑
B. 心脏
C. 肝脏
D. 脾脏
E. 肺脏
165. 二尖瓣面容的特点是
- A. 两颊部蝶形红斑
B. 两颊部紫红，口唇轻度发绀
C. 两颊黄褐斑
D. 午后两颊潮红，面色红润
E. 面部毛细血管扩张
166. 对血液疾病患者进行长期用药指导的内容不包括
- A. 药物的名称剂量、用药方法

- B. 教会病人或家属观察药物的不良反应监测
C. 教会病人或家属观察药物的疗效
D. 根据药物疗效调整药物剂量
E. 指导患者时间药效的观点
167. 强迫症的发病高峰的年龄阶段是
A. 婴儿期
B. 幼儿期
C. 青少年期
D. 性成熟期
E. 老年期
168. 典型心绞痛发作的部位常位于
A. 心前区且向左上肢前内侧放射
B. 胸骨体中段或上段后且向左上肢前内侧放射
C. 胸骨下段且向左肩背部放射
D. 心尖区且向左肩背部放射
E. 右肋缘且向右上肢前外侧放射
169. 急性心肌梗死的处理中不正确的是
A. 控制休克
B. 消除心律失常
C. 使用止痛药物
D. 再灌注心肌
E. 保护肾功能
170. 成年男性正常的血红蛋白参考值为
A. 100~140 g/L
B. 110~150 g/L
C. 120~160 g/L
D. 140~170 g/L
E. 170~200 g/L
171. 网织红细胞减少，主要见于
A. 缺铁性贫血
B. 出血性贫血
C. 再生障碍性贫血
D. 溶血性贫血
E. 营养性巨幼细胞贫血
172. 下列哪项化验结果是冠心病的危险因素
A. 血清总胆固醇下降
B. 血清甘油三脂下降
C. 血清高密度脂蛋白一胆固醇增高
D. 血清低密度脂蛋白一胆固醇增高
E. 血清肌酸磷酸激酶降低
173. 右心衰竭病人查体时可出现
A. 细脉
B. 颈静脉怒张
C. 阵发性夜间呼吸困难

- D. 心尖区收缩期奔马律
E. 双肺底湿啰音
174. 慢性支气管炎最常见的并发症为
- A. 肺脓肿
B. 呼吸道感染
C. 阻塞性肺气肿
D. 支气管扩张
E. 哮喘
175. 支气管扩张患者一天中咳嗽、咳痰最重的时间是
- A. 晨起
B. 白天
C. 睡醒
D. 凌晨
E. 傍晚
176. 支气管扩张大咯血患者最危险且最常见的并发症是
- A. 严重失血
B. 休克
C. 窒息
D. 继发感染
E. 高热
177. 王先生，35 岁，长期吸烟，右下肢反复发作为静脉炎，并有间歇性跛行，最可能的诊断是
- A. 雷诺病
B. 动脉栓塞
C. 大动脉炎
D. 血栓闭塞性脉管炎
E. 动脉硬化性闭塞症
- (共用题干 178~180)
- 患儿，8 个月，母乳喂养，未加辅食。近 1 个月来，面色苍白，烦躁易怒，舌面光滑，有轻微震颤，肝于肋下 3.6 cm。血常规：Hb 90 g/L, RBC $1.9 \times 10^{12}/L$ ，血清维生素 B₁₂ 降低。
178. 该患儿可能的诊断是
- A. 营养性巨幼细胞贫血
B. 缺铁性贫血
C. 营养性混合性贫血
D. 再生障碍性贫血
E. 溶血性贫血
179. 该患儿最适宜的治疗是给予
- A. 输红细胞
B. 铁剂和维生素 C
C. 维生素 B₁₂ 和叶酸
D. 补叶酸
E. 补铁剂
180. 护士向患儿家长介绍预防本病的重点是
- A. 按时补充维生素 D 和补钙

- B. 多晒太阳
C. 按时添加辅食
D. 纠正不良饮食习惯
E. 注意休息
181. 强迫症的发病年龄通常为
A. 青少年期
B. 幼儿期
C. 中年期
D. 老年期
E. 婴儿期
182. 患者，男性，55 岁，首发症状为动作不灵活和震颤入院，经进一步检查诊断为帕金森病，此病的特征不包括
A. 肌强直
B. 体位不稳
C. 运动减少
D. 运动性震颤
E. 起病缓慢，逐渐加重
183. 患者，男性，70 岁。身高 170 cm，体重 80 kg，患高血压 15 年，为控制患者体重所采取的措施不应包括
A. 制订个体化膳食方案
B. 检测体重变化
C. 吃减肥药
D. 规律运动
E. 控制饮食
184. 心包腔内液体的生理作用
A. 营养心肌
B. 润滑作用
C. 免疫作用
D. 维持心包腔内压力
E. 维持心肌张力
185. 急性白血病化疗诱导缓解后，病人发生头痛、呕吐、视力障碍，甚至瘫痪，这是由于
A. 中枢神经系统白血病
B. 脑出血
C. 脑血栓形成
D. 脑膜炎
E. 蛛网膜下腔出血
186. 不符合心绞痛特点的是
A. 疼痛位于胸骨体中与上段之后
B. 疼痛可伴有濒死感
C. 疼痛多数持续在 15 分钟以上
D. 休息可缓解疼痛
E. 常有诱发因素
187. 导致左心衰竭症状的原因主要是
A. 心室颤动

- B. 高血压
C. 体循环淤血
D. 肺循环派血
E. 循环血量减少
188. 患者，男性，70 岁，风湿性心脏病，下床、洗漱、就餐、走动后即气喘、出汗，自诉心慌、胸闷，但卧床休息时无此不适。最恰当的指导是
- A. 绝对卧床休息，取半卧位
B. 不限制活动，但需劳逸结合
C. 以卧床休息为主，限制运动
D. 可打太极拳，忌剧烈运动
E. 每天爬一层楼梯，需增加睡眠
189. 皮肤白皙的贫血患者就诊，护士检查时最能反映贫血的部位是
- A. 面颊皮肤及上腭黏膜
B. 手背皮肤及口腔黏膜
C. 耳廓皮肤
D. 颈部皮肤及舌面
E. 睑结膜指甲、口唇
190. 患者男性，67 岁，患慢性支气管炎，近几天咳嗽加剧，痰液黏稠，不易咳出，给予超声雾化吸入治疗，首选的药物是
- A. 青霉素
B. 氨茶碱
C. 地塞米松
D. 沙丁胺醇
E. α -糜蛋白酶
191. 患者女性，64 岁。因头晕、头痛 3 天就医，查体：血压 165/105 mmHg，可考虑为
- A. 正常高限
B. 单纯收缩压期高血压
C. I 级高血压
D. II 级高血压
E. III 级高血压
192. 治疗慢性再生障碍性贫血的首选药是
- A. 糖皮质激素
B. 免疫抑制剂
C. 造血因子
D. 雄激素
E. 雌激素
193. 患儿女，6 岁，以病毒性脑膜炎入院。经积极治疗，除右侧肢体仍活动不利，其他临床症状明显好转，家长要求回家休养，护士为其进行出院指导，不妥的是
- A. 给予高热量、高蛋白、高维生素饮食
B. 患侧肢体保持功能位，尽量减少活动
C. 指导用药的注意事项
D. 保持患儿心情舒畅
E. 指导定期随访
194. 患者，女性，60 岁。因心力衰竭收住入院，采用地高辛治疗。护士查房时，患者主诉

食欲明显减退，视力模糊，护士测心率 50 次/分，心律不齐，上述症状最可能的原因是

- A. 心力衰竭加重
- B. 颅内压增高
- C. 心源性休克
- D. 低钾血症
- E. 洋地黄中毒

195. 患儿，2 个月。发热 2 天。体温高达 $38.9\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 39.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，面色苍白，呻吟，呼吸困难，呼吸 $55\sim 65$ 次/分，心率 $160\sim 180$ 次/分，心音低钝，肝肋下 2 cm，双肺可闻及中量的细小啰音，X 线片示双肺大小不等的片状阴影，WBC $13\times 10^9/\text{L}$ ，此患儿应用抗生素的时间应为

- A. 7~10 天
- B. 10~14 天
- C. 体温正常后
- D. 体温正常后 3 天
- E. 临床症状消失后 3 天

196. 患者男性，78 岁。反复咳嗽、喘息 20 年，5 年前诊断为 COPD，2 天前合并肺部感染入院。目前患者的医疗诊断是肺源性心脏病，患者首先应选用的药物是

- A. 洋地黄
- B. 抗生素
- C. 利尿剂
- D. 糖皮质激素
- E. 抗心律失常药

197. 老年人虽然死记硬背能力减退，但理解能力变化不大，因此保持比较好的记忆是

- A. 近期记忆
- B. 逻辑记忆
- C. 机械记忆
- D. 次级记忆
- E. 远期记忆

198. 患者男性，53 岁，两天前以急性心肌梗死急诊入院，患者吸氧的目的是

- A. 减少疼痛
- B. 改善心肌缺氧
- C. 增加活动耐力
- D. 预防心力衰竭
- E. 促进梗死心肌恢复

199. 患儿男，3 岁，发现心脏杂音，确诊室间隔缺损 3 年，近日来，患儿无诱因出现持续性青紫，该患儿可能出现

- A. 差异性青紫
- B. 呼吸衰竭
- C. 心力衰竭
- D. 缺血缺氧性脑病
- E. 艾森门格综合征

200. 患儿，2 岁，发热 2 天后口角、舌面及齿龈处出现成簇小水疱，部分破溃成溃疡，颌下淋巴结肿大，咽充血，心肺正常。护士考虑该患儿的疾病是

- A. 鹅口疮
- B. 疱疹性口腔炎

- C. 溃疡性口腔炎
D. 疱疹性咽峡炎
E. 咽结合膜热
201. 将骨盆各平面中点的假想的轴线称为
- A. 胎产式
B. 胎位
C. 胎先露
D. 胎势
E. 骨盆轴
202. 育龄期妇女适用于口服避孕药避孕的是
- A. 患有严重心血管疾病者
B. 子宫畸形者
C. 哺乳期内
D. 患有血液病
E. 患有糖尿病
203. 产后出血最重要的预防措施是
- A. 适度做会阴侧切术
B. 胎肩娩出后立即肌内注射缩宫素 10U
C. 督促产妇及时排空膀胱
D. 产后 24 小时内观察阴道流血及宫缩情况
E. 产后早期哺乳
204. 新生儿生理性体重下降是指平均比出生时下降了
- A. 2%
B. 3%~9%
C. 10%~13%
D. 16%
E. 18%
205. 列入乙类传染病，但按甲类传染病管理的
- A. 传染性非典型肺炎
B. 病毒性肝炎
C. 流行性乙型脑炎
D. 艾滋病
E. 肺结核
206. 青春期最突出的表现是
- A. 意外发生率高
B. 生长发育最迅速时期
C. 生长发育速度变慢，语言及动作能力提高较快
D. 接受教育的最佳时期
E. 生长发育旺盛，生殖器官迅速发育成熟
207. 未母乳喂养或未做到及时有效母乳喂养的产妇，通常可于产后 3~4 天因乳房血管、淋巴管极度充盈可有发热，称为
- A. 泌乳热
B. 乳腺炎
C. 产后热

- D. 产褥热
E. 产褥感染
208. 小儿发育成熟最晚的系统是
- A. 淋巴系统
B. 循环系统
C. 消化系统
D. 神经系统
E. 生殖系统
209. 引起产后出血最常见的原因是
- A. 产道裂伤
B. 胎盘剥离不全
C. 宫缩乏力
D. 凝血机制障碍
E. 滞产
210. 判断小儿体格发育的常用指标有
- A. 体重、身高、头围、腹围
B. 语言发育程度
C. 智力发育水平
D. 对外界反应能力
E. 动作能力或运动能力
211. 乙肝疫苗初次免疫接种的年龄是
- A. 生后 24 小时内
B. 2 个月以上
C. 8 个月以上
D. 3 个月以上
E. 1 岁以上
212. 使用蓝光疗法时，为使患儿皮肤均匀受热，更换体位时间是
- A. 每 1 小时一次
B. 每 2 小时一次
C. 每 3 小时一次
D. 每 4 小时一次
E. 每 5 小时一次
213. 女性各阶段的生理特点正确的是
- A. 儿童后期卵巢内的卵泡有一定发育，但并不分泌性激素
B. 青春期是卵巢生殖内分泌功能最旺的时期
C. 月经初潮标志生殖器官发育成熟
D. 围绝经期一般历时半年
E. 绝经过渡期的突出表现为卵巢功能逐渐衰退
214. 早产儿生理性黄疸血胆红素最高不超过
- A. $330 \mu\text{mol/L}$
B. $257 \mu\text{mol/L}$
C. $205.2 \mu\text{mol/L}$
D. $543 \mu\text{mol/L}$
E. $120 \mu\text{mol/L}$

215. 临产后的主要产力是
- A. 腹肌收缩力
 - B. 膈肌收缩力
 - C. 产妇向下屏气
 - D. 子宫收缩力
 - E. 肛提肌收缩力
216. 出生后多长时间内将新生儿俯卧在母体胸前
- A. 30 分钟内
 - B. 40 分钟内
 - C. 50 分钟内
 - D. 60 分钟内
 - E. 70 分钟内
217. 确诊肺结核最可靠的检查方法是
- A. CT 检查
 - B. X 线检查
 - C. 结核菌素试验
 - D. 痰结核菌检查
 - E. 纤维支气管镜检查
218. 子宫脱垂是指子宫颈外口达
- A. 坐骨结节水平以上
 - B. 坐骨结节水平以下
 - C. 坐骨棘水平以上
 - D. 坐骨棘水平以下
 - E. 尾骨以下
219. 哪段时期可做阴道灌洗
- A. 月经期
 - B. 妊娠期
 - C. 产褥期
 - D. 排卵期
 - E. 阴道流血期
220. 胎盘附着面的子宫内膜完全修复需到产后
- A. 2 周
 - B. 3 周
 - C. 4 周
 - D. 5 周
 - E. 6 周
221. 新生儿生后脐带脱落的时间一般为
- A. 1~7 天
 - B. 8~14 天
 - C. 15~21 天
 - D. 22~28 天
 - E. 29~35 天
222. 下列选项不符合正常足月儿的特点的是
- A. 哭声响亮

- B. 皮肤红润
C. 胎毛少
D. 耳壳软
E. 指甲达到或超过指端
223. 小儿出生后，生长发育最快的阶段是
A. 婴儿期
B. 幼儿期
C. 学龄前期
D. 学龄期
E. 新生儿期
224. 传染病的流行过程必须具备哪三个基本环节
A. 病原体环境、易感人群
B. 病原体环境、传染源
C. 传染源、传播途径、易感人群
D. 病原体、传播途径、易感人群
E. 传染源、传播途径、环境
225. 为小儿测量体重时，错误的做法是
A. 晨起空腹排尿后进行
B. 进食后立即进行
C. 每次测量应在同一磅秤上称量
D. 测量前应先校正磅秤为零点
E. 脱去衣裤鞋袜后进行
226. 决定心脏病患者是否妊娠，最重要的是
A. 生育史
B. 家族史
C. 心脏病的种类
D. 心功能分级
E. 治疗情况
227. 羊水栓塞多发生在
A. 妊娠早期流产
B. 妊娠中期流产
C. 妊娠晚期流产
D. 分娩期破膜后
E. 产后 24 小时内
228. 小儿会爬的年龄是
A. 3~4 个月
B. 5~6 个月
C. 8~9 个月
D. 9~10 个月
E. 10~11 个月
229. 第二产程时娩出胎儿的主要辅助力量是
A. 肛提肌收缩
B. 宫缩后肌纤维
C. 子宫肌收缩

- D. 腹肌和膈肌收缩力
E. 平滑肌和横纹肌
230. 产后血性恶露持续的时间一般是
- A. 1~2 天
B. 3~4 天
C. 8~10 天
D. 10~15 天
E. 15~20 天
231. 下列哪项对促进乳汁分泌是有害的
- A. 授乳
B. 精神受刺激
C. 按摩乳房
D. 充足睡眠
E. 良好营养
232. 麻疹的主要传播途径是
- A. 消化道传播
B. 接触传播
C. 虫媒传播
D. 飞沫传播
E. 血液传播
233. 为预防佝偻病，出生后开始服用维生素 D 的时间是
- A. 15 天
B. 5 个月
C. 2 个月
D. 6 个月
E. 4 个月
234. 属于孕激素的生理作用是
- A. 使增生期子宫内膜转化为分泌期
B. 促使子宫发育及肌层变厚
C. 使乳腺腺管增生
D. 使阴道上皮增生角化
E. 促使水钠潴留
235. 下列哪项与骨盆底作用无关
- A. 承载和支持盆腔脏器
B. 控制排尿
C. 保持盆腔脏器的正常位置
D. 分娩时协助先露部旋转与下降
E. 封闭骨盆出口
236. 下述哪项属于子宫附件
- A. 阴道口
B. 大阴唇
C. 小阴唇
D. 阴唇系带
E. 输卵管

237. 新生儿排出胎便的正常时间是
- A. 12 小时内
 - B. 18 小时内
 - C. 24 小时内
 - D. 36 小时内
 - E. 48 小时内
238. 新生儿期是指
- A. 自出生脐带结扎开始至生后 28 天内
 - B. 自受孕至生后脐带结扎
 - C. 自受孕 28 周开始至生后 28 天
 - D. 自出生脐带结扎开始至生后 7 天
 - E. 自出生脐带结扎开始至生后满 1 个月
239. 母乳喂养有利于预防佝偻病的主要原因是
- A. 母乳中乳白蛋白含量多
 - B. 不饱和脂肪酸多
 - C. 糖含量高
 - D. SIgA 多
 - E. 钙磷比例合适
240. 新生儿硬肿症最先受累的部位是
- A. 上肢
 - B. 面颊
 - C. 下肢
 - D. 后背
 - E. 臀部
241. 水痘患者作为唯一的传染源，其具有传染性的时段为
- A. 潜伏期
 - B. 出疹期
 - C. 出前 10 天至出疹后 5 天
 - D. 出疹前 10 天至第一批疹退
 - E. 出疹前 1~2 天至全部疱疹结痂
242. 妊娠后心血管系统发生变化不会出现的是
- A. 心搏出量增加
 - B. 心率加快
 - C. 大血管扭曲
 - D. 心尖部可闻舒张期杂音
 - E. 膈肌上抬，心脏变位
243. 新生儿出生时呼吸频率约为
- A. 10~20 次/分
 - B. 20~30 次/分
 - C. 30~40 次/分
 - D. 40~60 次/分
 - E. 60~70 次/分
244. 单纯性甲状腺肿的主要病因是
- A. 缺碘

- B. 甲状腺素释放障碍
C. 甲状腺素合成障碍
D. 食用海产品过多
E. 垂体功能减弱
245. 鼓励母乳喂养的措施中，不正确的是
- A. 母婴同室
B. 按需哺乳
C. 增加哺乳次数
D. 两次哺乳间给婴儿加少量糖水
E. 早接触早哺乳
246. 青春期是体格发育的
- A. 第一个生长高峰
B. 第二个生长高峰
C. 第三个生长高峰
D. 第四个生长高峰
E. 第五个生长高峰
247. 下列对新生儿的特殊生理现象的描述，应除外
- A. 生理性贫血
B. 乳房肿块
C. 生理性黄疸
D. 假月经
E. 脱水热
248. 有关使用避孕药的注意事项，下述哪项是错误的
- A. 乳房有肿块者忌服
B. 针剂应深部肌内注射
C. 肾炎病人忌服
D. 防止避孕药片潮解，影响效果
E. 哺乳期妇女适宜服避孕药
249. 关于母乳喂养的有效指标，不正确的陈述是
- A. 哺乳后安静入睡
B. 哺乳后双乳坚硬
C. 婴儿的体重增加
D. 每天尿布湿 6 次以上
E. 每天排大便数次
250. 胎儿脐静脉有
- A. 0 根
B. 1 根
C. 2 根
D. 3 根
E. 4 根
251. 2 岁以内小儿乳牙数目正确的计算方法是
- A. 月龄 - (2~4)
B. 月龄 - (4~6)
C. 月龄 - (2~8)

- D. 月龄—(2~10)
- E. 月龄—(6~12)
252. 对新生儿颅内出血的护理, 下列哪项是错误的
- A. 保持安静, 避免各种惊扰
- B. 头肩部抬高 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$, 以减轻水肿
- C. 注意保暖, 必要时给氧
- D. 经常翻身, 防止肺部淤血
- E. 喂奶时应卧在床上, 不要抱起患儿
253. 婴儿开始有意模仿并发出“爸爸”“妈妈”的音节是在
- A. 10~11 个月
- B. 7~8 个月
- C. 9~10 个月
- D. 8~9 个月
- E. 1 岁
254. 青春期孩子心理行为教育的侧重点是
- A. 法制和品德教育
- B. 预防疾病和意外
- C. 养成健康的生活方式
- D. 性心理教育
- E. 社会适应性的培养
255. 肺结核的化疗原则不包括
- A. 早期
- B. 规律
- C. 全程
- D. 足量
- E. 联合
256. 婴儿佝偻病的主要病因是
- A. 饮食中缺钙
- B. 甲状旁腺激素缺乏
- C. 缺乏维生素 D
- D. 缺乏维生素 A
- E. 食物中钙、磷比例不当
257. 服用短效避孕药期间如漏服, 补服的时间应在
- A. 4h 内
- B. 8h 内
- C. 12h 内
- D. 24h 内
- E. 36h 内
258. 出现子宫破裂时应立即用
- A. 哌替啶
- B. 钙剂
- C. 硫酸镁
- D. 地塞米松
- E. 缩宫素

259. 下列哪项是重度子痫前期孕妇的表现
- A. 全血黏度持续升高
 - B. 尿雌三醇值急剧下降
 - C. 后穹窿穿刺阳性
 - D. 出现病理性缩复环
 - E. B 超见宫颈有部分胎盘
260. 最早开始母乳喂养应在出生后
- A. 30 分钟内
 - B. 1 小时内
 - C. 6 小时内
 - D. 24 小时内
 - E. 48 小时内
261. 经期卫生哪项不对
- A. 保持外阴清洁，每天进行阴道冲洗
 - B. 要用干净的月经带或卫生巾
 - C. 可照常参加工作
 - D. 防止寒冷刺激
 - E. 保持愉快的心情
262. 胎盘合成的激素不包括
- A. 雌三醇
 - B. 孕酮
 - C. 胎盘生乳素
 - D. 肾上腺皮质激素
 - E. 绒毛膜促性腺激素
263. 护理新生儿颅内出血时下列正确的是
- A. 保持安静，避免声、光等刺激
 - B. 不断吸痰以保持呼吸道通畅
 - C. 给高浓度吸氧以纠正缺氧
 - D. 将患儿置于稍凉的环境中
 - E. 快速大量静脉输入新鲜血
264. 青春期是指
- A. 1~3 岁
 - B. 3~6 岁
 - C. 6~12 岁
 - D. 18~35 岁
 - E. 女孩从 11~12 岁开始至 17~18 岁，男孩从 13~14 岁开始至 18~20 岁
265. 新生儿记录中属于非生理性改变的是
- A. 出生后 2 天出现黄疸
 - B. 出生后 2~3 天无尿
 - C. 出生后 5~7 天有阴道出血
 - D. 出生后 1 周有乳腺肿大
 - E. 出生后 9 天体重下降 8%
266. 口服第一片短效口服避孕药的时间是
- A. 月经来潮的第 3 天

- B. 月经来潮的第 5 天
C. 月经来潮的第 10 天
D. 月经来潮的第 14 天
E. 月经来潮的第 21 天
267. 不属于先兆子宫破裂的临床表现为
A. 子宫收缩力强
B. 子宫病理性缩复环
C. 子宫下段压痛
D. 胎心率 100 次/分
E. 腹壁下清楚触及胎儿肢体
268. 母乳喂养哺喂方法正确的是
A. 小婴儿取卧位哺乳
B. 出生即定时哺乳
C. 两侧乳房轮流排空
D. 哺乳完毕置婴儿于左侧卧位
E. 有乳房硬块时停止哺乳
269. 对月经的描述, 正确的是
A. 初潮时多是有排卵型月经
B. 两次月经第 1 日的间隔时间为 1 个月经周期
C. 在分泌期, 子宫内膜主要受雌激素影响
D. 月经失血量 > 100mL 为病理状态
E. 月经血是凝固的
270. 羊水的功能不包括
A. 保证胎儿活动度, 防止与羊膜粘连
B. 气体交换
C. 保护胎儿不受外来损伤
D. 羊水检查可监测胎儿成熟度
E. 分娩时传导子宫收缩的压力
271. 1 岁小儿, 结核菌素试验呈强阳性反应, 多表示
A. 近期内初次感染结核菌
B. 体内有活动性的结核病
C. 体内有陈旧性结核病灶
D. 为接种卡介苗后反应
E. 对结核病有免疫力, 不会再感染结核
272. 标志女性青春期开始的是
A. 音调度高
B. 生殖器为成人型
C. 阴毛、腋毛生成
D. 第二性征显现
E. 月经初潮
273. 肺结核最主要的传播途径是
A. 食物和水
B. 毛巾或餐具
C. 皮肤接触

- D. 尘埃
E. 飞沫
274. 导致我国产妇死亡的首位原因是
- A. 羊水栓塞
B. 子宫破裂
C. 弥散性血管内凝血
D. 妊娠合并贫血
E. 产后出血
275. 患儿，5 岁。曾与水痘患儿接触，对其该采取的措施是
- A. 注射维生素 D3
B. 入院治疗
C. 注射疫苗
D. 隔离观察
E. 静脉注射抗生素
276. 母乳喂养时间最迟不超过
- A. 6 个月
B. 8 个月
C. 12 个月
D. 18 个月
E. 24 个月
277. 在胎儿分娩过程中，下列哪项贯穿于整个产称
- A. 衔接
B. 下降
C. 俯曲
D. 内旋转
E. 仰伸
278. 防止子宫脱垂的主要韧带是
- A. 圆韧带
B. 阔韧带
C. 主韧带
D. 宫骶韧带
E. 卵巢悬韧带
279. 患儿被诊断为麻疹，护士做健康教育时，错误的指导是
- A. 多饮开水
B. 勤剪指甲，防止抓伤皮肤
C. 穿透气舒适的衣服保持皮肤清洁干燥
D. 及时清除鼻痂，保持呼吸道通畅
E. 发热时应用物理或药物方法为患儿迅速降温
280. 正常分娩胎膜自然破裂是在
- A. 第二产程
B. 不规律宫缩开始后
C. 有规律宫缩开始
D. 宫口近开全
E. 宫口开大 5cm 时

281. 产褥期是指
- A. 从胎儿娩出到生殖器官恢复正常
 - B. 从胎盘娩出到除乳腺外全身各器官完全恢复正常的一段时间
 - C. 从第二产程到生殖器官恢复正常
 - D. 从胎儿娩出到全身恢复正常
 - E. 从胎儿娩出到恶露干净这段时间
282. 新生儿易发生溢乳，是由于
- A. 胃自主神经调节能力强
 - B. 贲门括约肌紧张
 - C. 幽门括约肌松弛
 - D. 胃容量较小
 - E. 胃呈水平位
283. 关于牛乳与母乳成分的比较，对牛乳的叙述正确的是
- A. 乳糖含量高于母乳
 - B. 含不饱和脂肪酸多
 - C. 矿物质含量少于母乳
 - D. 铁含量少，吸收率高
 - E. 蛋白质含量高，以酪蛋白为主
284. 过期妊娠是指孕妇妊娠期达到或超过
- A. 38 周
 - B. 39 周
 - C. 40 周
 - D. 42 周
 - E. 44 周
285. 关于女性内生殖器的描述中不正确的是
- A. 卵巢是具有生殖和内分泌功能性腺器官
 - B. 子宫颈癌的好发部位是子宫颈外口鳞状上皮与柱状上皮交界处
 - C. 输卵管是精子与卵子相遇结合成为受精卵的部位
 - D. 非孕子宫峡部正常情况下长为 2cm
 - E. 环绕子宫颈周围的部分称为阴道穹窿，是腹腔的最低部分
286. 某甲状腺功能亢进症患者，行基础代谢率测定时间宜在
- A. 下午 6 点、餐后和静卧
 - B. 清晨空腹和静卧
 - C. 下午 4 点，静卧
 - D. 午间 12 点、餐后和静卧
 - E. 下午 2 点，静卧
287. 骨盆入口前后径短，横径正常者，属于
- A. 漏斗骨盆
 - B. 均小骨盆
 - C. 男性骨盆
 - D. 扁平骨盆
 - E. 畸形骨盆
288. 下列产褥感染的诱因，不包括
- A. 生殖系统的自然防御能力降低

- B. 使用缩宫素
C. 器械助产
D. 产程延长
E. 产道损伤
289. 晚期产后出血最常见的原因是
- A. 胎盘、胎膜残留
B. 蜕膜残留
C. 剖宫产术后子宫伤口裂开
D. 感染
E. 子宫胎盘附着部位复旧不全
290. 乙脑病毒主要侵犯的人体系统是
- A. 免疫系统
B. 呼吸系统
C. 循环系统
D. 骨骼肌肉系统
E. 中枢神经系统
291. 某新生儿确诊为低钙血症，医嘱：静脉注射 10%葡萄糖酸钙，护士要注意观察的是
- A. 防止心动过缓，保持心率 >80 次/分
B. 防止心动过缓，保持心率 >90 次/分
C. 防止心动过缓，保持心率 >100 次/分
D. 防止心动过速，保持心率 <80 次/分
E. 防止心动过速，保持心率 <100 次/分
292. 初产妇，规律宫缩 16 小时，肛诊宫口开大 6cm，宫缩转弱，每 5~6 分钟 1 次，每次持续 25~30s，2 小时后肛诊宫口仍开大 6cm。该产程曲线属于
- A. 潜伏期延长
B. 活跃期延长
C. 活跃期停滞
D. 胎头下降延缓
E. 第二产程停滞
293. 小儿，男，10 个月，到儿童保健门诊做生长发育监测。以下发育异常的是
- A. 能独站片刻
B. 体重 8.6kg
C. 身长 75cm
D. 乳牙 4 颗
E. 头围 49cm
294. 某患者，30 岁。妊娠 32 周出现少量阴道流血，以往曾有 3 次早产史，主要的处理原则是
- A. 迅速结束分娩
B. 给氧
C. 抑制宫缩，促进胎儿肺成熟
D. 等待自然分娩
E. 左侧卧位
295. 某孕妇，孕前基础血压为 120/80mmHg。孕 30 周时出现下肢水肿，头痛头晕，查体：血压 150/100mmHg，蛋白尿(+)，诊断为妊娠期高血压疾病，患者出现上述的症状的病理生理

变化基础是

- A. 底蜕膜出血
- B. 全身的小动脉痉挛
- C. 水钠潴留
- D. 内分泌功能失调
- E. 肾小管重吸收功能降低

296. 孕妇，26 岁，孕 39 周，午后胎动频繁，听诊胎心 160 次/分，考虑胎儿窘迫，可能的病因是

- A. 胎儿贫血
- B. 母婴血型不合
- C. 胎盘植入异常
- D. 胎盘形状异常
- E. 脐带因素

297. 某产妇，胎儿娩出后，立即出现阴道活动性出血。量多，呈鲜红色，有血凝块。子宫平脐、宫体较硬。最可能的出血原因是

- A. 胎盘植入
- B. 凝血功能障碍
- C. 宫缩乏力
- D. 软产道损伤
- E. 胎盘粘连

298. 某初产妇，28 岁，妊娠 38 周自觉宫缩急诊入院，诊断为临产先兆，该产妇最可靠的征象是

- A. 不规律宫缩
- B. 抬头下降感
- C. 见红
- D. 上腹部不适感
- E. 尿频、尿急

299. 新生儿女，出生第 5 天。因全身冰冷，拒奶 24 小时入院。查体：T35℃，反应差，皮肤呈暗红色，心音低钝，双小腿皮肤如硬橡皮样。脐带已脱落。最可能的诊断是

- A. 新生儿水肿
- B. 新生儿红斑
- C. 新生儿寒冷损伤综合征
- D. 新生儿败血症
- E. 新生儿皮下坏疽

300. 孕妇，23 岁，孕 23 周，近日来子宫急剧增大，孕妇自觉呼吸费力、不能平卧。体检：口周紫、下肢水肿，经辅助检查排除胎儿畸形。此时，最佳的处理是

- A. 及时终止妊娠
- B. 人工破膜引产
- C. 经腹穿刺放羊水
- D. 控制饮食和水分
- E. 单纯利尿消肿

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	C	C	E	E	C	E	C	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	E	B	B	C	E	B	D	D	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	B	C	B	A	D	D	B	A	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	C	B	C	D	C	A	E	D	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
E	C	C	B	B	B	D	C	D	D
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	C	D	B	E	D	D	E	D	E
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
A	C	D	D	D	A	C	A	B	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	A	B	C	C	D	B	A	B	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	C	A	B	B	C	E	B	E	C
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	A	A	C	B	D	B	C	B	D
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
B	E	C	D	C	B	D	D	E	B
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D	B	A	C	E	B	E	D	B	C
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	E	A	E	D	C	D	D	E	B
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
B	A	D	A	E	D	A	A	D	B
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
C	E	A	C	D	E	A	E	A	D
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
A	E	B	D	D	C	A	C	D	B
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
C	B	D	A	B	D	C	B	E	C
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
C	D	B	C	A	C	D	A	C	C
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
A	D	C	B	A	C	D	C	E	E
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
D	D	B	E	E	B	B	B	E	B
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
E	B	B	B	A	E	A	E	C	A
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220

A	B	E	B	D	A	D	D	D	E
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
A	D	A	C	B	D	D	C	D	B
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
B	D	A	A	B	E	C	A	E	C
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
E	D	D	A	D	B	E	E	B	B
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
B	D	C	D	D	C	C	A	A	A
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
A	D	A	E	B	B	E	C	B	B
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
B	E	E	E	D	E	B	C	E	D
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
B	E	E	D	D	B	D	B	A	E
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
A	C	E	C	B	E	D	C	C	C