

全国执业药师职业资格考试  
《中药学综合知识与技能》  
2年真题及参考答案

金英杰医考官

# 目 录

2020 年全国执业药师职业资格考试 《中药学综合知识与技能》真题 .....	1
2019 年全国执业药师职业资格考试 《中药学综合知识与技能》真题 .....	17
2020 年全国执业药师职业资格考试 《中药学综合知识与技能》真题参考答案 .....	33
2019 年全国执业药师职业资格考试 《中药学综合知识与技能》真题参考答案 .....	42

金英杰医考官方公众号

# 2020 年全国执业药师职业资格考试

## 《中药学综合知识与技能》真题

一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最佳答案。）

- 关于中药药学服务的说法，错误的是（ ）。
  - 中药药学服务是以促进合理用药为核心的相关服务
  - 中药药学服务重点要加强中药学专业技术服务
  - 中药药学服务的内容不包括参与临床会诊
  - 提供中药药学服务的药师必须具有良好的人文道德素养
  - 提供中药药学服务的药师必须具备与药学服务相关的药事管理与法规知识
- 开创了中医学内伤杂病辨证论治体系，对后世临床医学发展有深远影响的著作是（ ）。
  - 《黄帝内经》
  - 《伤寒论》
  - 《金匱要略》
  - 《温疫论》
  - 《诸病源候论》
- 根据五行相克关系确定的治法（ ）。
  - 肝肾阴虚证临床表现为头晕目眩，采用滋水涵木法
  - 肝胃不和证临床表现为脘腹胀痛，采用抑木扶土法
  - 脾肾阳虚证临床表现为五更泄泻，采用益火补土法
  - 肺肾阴虚证临床表现为干咳少痰，采用金水相生法
  - 肺脾两虚证临床表现为痰多清稀，采用培土生金法
- 根据藏象理论，在吸收水谷精微的同时，也吸收大量水液，泌别清浊，所属脏腑功能是（ ）。
  - 肺通调水道
  - 脾运化水液
  - 肾主水液
  - 小肠主液
  - 大肠主津
- 某女，2 岁。囟门迟闭，手足软弱，食少纳呆，智力低下。分析其病变的主要原因是（ ）。
  - 胃气虚
  - 卫气虚
  - 营气虚
  - 宗气虚
  - 元气虚
- 某男，9 岁。咽喉疼痛，望诊可见咽部有灰白色假膜，擦之不去，重擦出血，随即复生。病属白喉，其病机是（ ）。
  - 肺胃积热
  - 肺火炽盛
  - 肺热阴伤
  - 虚火上浮
  - 热毒壅盛
- 下列有关执业药师在日常药学服务中为保证合理用药所采取具体措施的说法，错误的是（ ）。
  - 需要熟练掌握并始终学习中医药理论和基本知识，特别是临床中药学

- B.在回答患者咨询问题时，应先全面了解其病史、病情资料，准确掌握其病证后再回答
- C.在进行发药交待时，对育龄期妇女的身体状况只需明确其是否妊娠即可
- D.在采购与调剂饮片时，要确保药品品种不混乱、药用部位准确、炮制适当
- E.对患者进行用药教育时，应告知患者关注偏性突出、作用强烈中药的正确使用
- 8.某女，38岁。先天禀赋不足，近半年来月经延后7~10天，量少，色淡，伴四肢乏力，精神不振，面色无华，舌淡苔白，脉缓弱。诊断为月经后期，证属血虚血滞、经血运行不畅。宜选用的中成药是（ ）。
- A.得生丸  
B.四物益母丸  
C.调经丸  
D.益母丸  
E.调经活血片
- 9.某男，27岁。颜面红斑、丘疹、散在脓包，并伴皮肤灼热、口干渴、思冷饮、大便秘结，舌红苔黄腻，脉滑数。诊断为粉刺，证属湿热毒邪聚结肌肤。宜选用的中成药是（ ）。
- A.消痤丸  
B.黄连上清丸  
C.四妙丸  
D.当归苦参丸  
E.化瘀祛斑胶囊
- 10.可引起恶心，呕吐，腹泻，面色苍白，瞳孔极度缩小，血压下降，昏睡，呼吸浅而不规则等不良反应的饮片是（ ）。
- A.罂粟壳  
B.朱砂  
C.苦杏仁  
D.蜈蚣  
E.苍耳子
- 11.某女，77岁。4月前因肺癌手术治疗，其后化疗3次。刻下面色萎黄，气短懒言，语声低微，头昏神疲，肢体无力，舌淡，边有齿痕，苔薄白，脉虚无力。宜选用的基础方剂是（ ）。
- A.四物汤  
B.小建中汤  
C.桂附地黄丸  
D.四君子汤  
E.沙参麦冬汤
- 12.关于处方应付的说法，错误的是（ ）。
- A.僵蚕应调配酒炙品  
B.紫苏子应调配清炒品  
C.鳖甲应调配烫制品  
D.益智仁应调配盐炙品  
E.枇杷叶应调配蜜炙品
- 13.舌质与舌苔异常，可以反映病情的变化。下列关于舌质、舌苔主病的说法，错误的是（ ）。
- A.舌光无苔，胃阴大伤  
B.苔白积粉，气虚有湿  
C.苔灰干燥，阴虚火旺  
D.舌苔黄腻，食积内停  
E.舌苔腐腻，痰浊邪盛
- 14.某女，39岁。情绪低落，闷闷不乐，喜叹息，胸闷胁痛，腹胀便溏，心烦不寐，急躁易怒，舌红苔黄，脉弦细数。诊断为郁证，证属肝郁化火、肝脾不和。宜选用的中成药是（ ）。
- A.舒肝平胃丸  
B.木香顺气丸

C.人参健脾丸

D.丹栀逍遥丸

E.龙胆泻肝丸

15.某男，64岁。喘促日久，动则喘甚，呼多吸少，气不得续，小便常因咳甚而失禁，尿有余沥，形瘦神疲，汗出肢冷，面唇青紫，舌淡苔薄，脉沉弱。宜选用的基础方剂是（ ）。

A.桑白皮汤

B.三子养亲汤

C.越婢加半夏汤

D.肾气丸合参蛤散

E.苏子降气汤

16.某女，25岁。经期小腹冷痛，腰膝无力，血色暗淡，子宫虚冷。诊断为痛经，证属寒凝血瘀。宜选用的中成药是（ ）。

A.益母丸

B.女金丸

C.温经丸

D.调经丸

E.定坤丹

17.某女，55岁。近来因关节疼痛、屈伸不利而服用祛风止痛片，但其求愈心切，自行将单次剂量增加到2倍。服药7日后，出现口舌麻木、头晕、心悸气短等症状。分析上述症状是由过量服用祛风止痛片所致，原因是其药物组成中含有（ ）。

A.蟾酥

B.马钱子

C.制草乌

D.雄黄

E.细辛

18.幼儿机体正处于生长发育的过程中，脏腑、筋骨、津液等均柔弱不足，关于幼儿患者合理用药的说法，正确的是（ ）。

A.小儿脏腑娇嫩，用药不宜过早，处方要精，用量要轻

B.小儿脾气不足，用药应佐以健脾和胃，消食导滞之品

C.小儿外有表邪，内有火热，用药以苦寒清热为主，避免热邪伤津

D.小儿纯阳之体，外感病邪易出现惊风，用药应以平肝息风为主

E.小儿生机旺盛，易营养不足，应注意及时予以滋补之品

19.某男，30岁，已婚3年，未育，来院就诊，检查结果显示精子存活率低，患者平时阳事不兴，伴小腹急满，小便短赤，舌苔薄黄，脉弦滑，宜选用的基础方剂是（ ）。

A.柴胡舒肝散

B.大补元煎

C.小蓟饮子

D.程氏萆薢分清饮

E.启阳娱心丹

20.具有清心热、养心、安神、开窍的功能，用于热病攻心、神昏谵语的藏成药是（ ）。

A.五味麝香丸

B.八味沉香散

C.六味安消散

D.七味红花殊胜丸

E.十味黑冰片丸

21.中药蜜丸贮藏不当易发生霉变。适宜霉菌生长的温度和相对湿度是（ ）。

A.10~30℃，70%以上

B.10~30℃，75%以上

C.20~35℃, 75%以上

D.18~35℃, 70%以上

E.18~35℃, 75%以上

22.某男, 6岁。口干多饮, 纳呆食少, 面黄肌瘦, 四肢倦怠, 精神不振, 体虚多汗、大便干结, 舌红少苔, 脉细。诊断为厌食, 证属脾胃虚弱、胃阴不足。宜选用中成药是( )。

A.儿宝颗粒

B.枳术丸

C.启脾丸

D.健胃消食片

E.保和丸

23.肺胀是多种肺系疾患反复发作, 迁延不愈, 导致肺气胀满, 不得敛降的一种肺系疾病, 临床表现为胸部膨满, 憋闷如塞, 喘息上气, 咳嗽痰多等症状。可参考肺胀辨证论治的疾病是( )。

A.慢性阻塞性肺疾病

B.支气管哮喘

C.社区获得性肺炎

D.上呼吸道感染

E.病毒性肺炎

24.传统汤剂是将药物用煎煮或浸泡后去渣取汁的方法制成的液体剂型。关于汤剂煎煮程序的说法, 错误的是( )。

A.为便于煎出有效成分, 在煎煮前先加常温水浸泡 20~30 分钟

B.第一煎加水量一般高于药面 2~5cm, 第二煎加水量酌减

C.每剂药煎好后, 待放凉再滤出煎液

D.每剂药的总煎出量, 成人一般为 400~600ml

E.剩余残渣挤出的残液量不超过残渣总重量的 20%

25.药店的某一列中药斗谱排列如图所示。该斗谱中, 因排列不合理需调整的斗谱组合是( )。



A.黄芪与党参

B.青皮与陈皮

C.公丁香与母丁香

D.玫瑰花与月季花

E.生龙骨与生牡蛎

26.某男, 25岁。因上呼吸道感染, 临床给予喜炎平注射液 150mg, 加入到 5%葡萄糖注射液 250mL 中静脉滴注, 输液 5 分钟后, 患者出现寒战、发热、心悸、前胸及后背皮肤多发红疹,

伴瘙痒，渐至呼吸困难，随即停止输液，予以对症处理，药师分析为喜炎平引起的药物不良反应。该不良反应的类型是（ ）。

- A.过敏反应
- B.副作用
- C.毒性反应
- D.继发反应
- E.后遗作用

27.某女，69岁。患糖尿病3年，服用消糖灵胶囊，血糖控制良好。半年前确诊为高血压病，加用珍菊降压片，服用1个月后，发现血糖控制不佳，其原因是珍菊降压片含有影响血糖的成分，该成分是（ ）。

- A.枸橼酸钠
- B.氢氯噻嗪
- C.盐酸异丙嗪
- D.吲哚美辛
- E.盐酸苯海拉明

28.某男，24岁。右侧肩胛骨内缘突发疔肿，周围色红肿硬，触痛明显，伴有恶寒，发热，口干，尿黄，大便干，舌红苔黄腻，脉滑数。证属湿毒蕴结。宜选用的中成药是（ ）。

- A.连翘败毒丸
- B.皮肤病血毒丸
- C.牛黄化毒片
- D.活血解毒丸
- E.活血消炎丸

29.某男，55岁。恶寒发热，无汗，头身痛，伴有形寒肢冷，面白声微，舌淡苔白，脉浮无力。宜采用的治法是（ ）。

- A.助阳解表
- B.益气解表
- C.养血解表
- D.滋阴解表
- E.散寒解表

30.某男，36岁。身热，腹硬满痛，大便燥结，口干渴，舌燥苔焦黄。临床应采用的治则是（ ）。

- A.标本兼治
- B.急则治标
- C.缓则治本
- D.塞因塞用
- E.热因热用

31.中药牛蒡子的别名，错误的是（ ）。

- A.大力子
- B.鼠黏子
- C.牛子
- D.梭罗子
- E.恶实

32.某女，56岁。素有关节疼痛，刻下因咳嗽痰多就诊。诊断为：（1）痹证，证属痛痹；（2）咳嗽，证属痰热壅肺。处方：橘红丸（化橘红、浙贝母、陈皮、制半夏、茯苓、苦杏仁、紫苏子、桔梗、紫菀、款冬花、瓜蒌皮、石膏、地黄、麦冬、甘草）；小活络丸（制川乌、制草乌、制乳香、制没药、胆南星、地龙），执业药师对该处方进行审核，发现其存在的配伍问题是（ ）。

- A.相使药同用
- B.相杀药同用
- C.相反药同用
- D.相恶药同用

E.相畏药同用

33.某女, 30岁。咽痛干痒, 有异物感, 干咳少痰, 颧红, 潮热, 耳鸣, 多梦, 舌红苔少, 脉细数。宜选用的基础方剂是( )。

A.清咽利膈汤

B.养阴清肺汤

C.疏风清热汤

D.半夏厚朴汤

E.枇杷清肺饮

34.中成药联用在临床上普遍存在, 关于中成药合理联用的说法, 正确的是( )。

A.脑立清胶囊与桂附地黄丸联用治疗高血压肝肾阴虚证, 前药为主, 后药为辅, 辅药能提高主药功效

B.乌鸡白凤丸与香砂六君丸联用治疗月经不调, 后者可辅助前者, 增强养血调经之功

C.二陈丸与平胃散联用治疗湿痰咳嗽, 两药功效相似, 可以起到互相增强疗效的协同作用

D.内服六神丸与外用冰硼散联用治疗咽喉肿痛, 后者能够抑制前者的偏性

E.舟车丸与金匱肾气丸联用治疗阳水, 后者能够明显消除前者的偏性

35.某男, 59岁。腰部冷痛, 酸软无力, 卧则减轻, 得热则舒, 肢冷畏寒, 面色皤白, 舌淡, 脉沉细无力。宜选用的基础方剂是( )。

A.右归丸

B.理中汤

C.左归丸

D.四妙丸

E.四物汤

36.某女, 35岁。痔疮, 大便带血, 血色鲜红, 时有肛门瘙痒, 舌红苔薄黄, 脉浮数。宜采用的治法是( )。

A.清热利湿止血

B.清热凉血祛风

C.清热凉血化瘀

D.理气祛风活血

E.清热利湿消痔

37.根据中药饮片所含化学成分或炮制方法的不同, 确定不同的贮藏方法。关于中药饮片贮藏的说法, 错误的是( )。

A.山药、葛根含淀粉多, 应贮藏于通风、干燥处, 以防虫蛀

B.种子类饮片因炒制后增加了香气, 易受虫害, 应密闭贮藏

C.动物类饮片易生虫和泛油, 并有腥臭气, 应密封保存

D.薄荷、当归含挥发油多, 应置于 25℃ 以下, 阴凉、干燥处贮藏

E.盐炙饮片易吸湿而受潮, 温度过高, 盐分会析出, 应贮藏于密闭容器, 置通风干燥处

38.某女, 42岁。反复咳嗽 3 年余, 刻下咳嗽, 痰多黏稠, 时而色白, 时而微黄, 胸脘满闷, 苔白腻, 脉弦滑。诊断为咳嗽, 证属痰气阻肺、肺失宣降。宜选用的中成药是( )。

A.清肺化痰丸

B.复方鲜竹沥液

C.百合固金丸

D.橘贝半夏颗粒

E.二母宁嗽丸

39.某男, 40岁。嗜食肥甘厚味, 喜好饮酒, 形体肥胖, 检查结果: 总胆固醇 8.22 mmol/L,



引起该指标升高的疾病不包括（ ）。

- A.高脂血症
- B.消耗性疾病
- C.阻塞性黄疸
- D.肾病综合征
- E.甲状腺功能减退症

40.某女，45岁。带下量多，绵绵不断，质清稀如水，腰痛如折，畏寒肢冷，小腹冷感，面色晦暗，小便清长，夜尿频多，大便溏薄，舌淡苔白润，脉沉迟。宜选用的治法是（ ）。

- A.健脾益气，除湿止带
- B.温肾培元，固涩止带
- C.疏肝健脾，利湿止带
- D.健脾固肾，除湿止带
- E.清热解毒，利湿止带

二、配伍选择题（共50题，每题1分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复使用，也可不选用。每题只有1个备选项最符合题意）

【41-42】

- A.肝
- B.脾
- C.心
- D.肺
- E.肾

41.具有统摄血液、维持血行于脉内的生理功能的脏是（ ）。

42.具有贮藏血液、调节血量、防止出血的生理功能的脏是（ ）。

【43-45】

- A.肾阴阳两虚
- B.肾阳虚
- C.肾气虚
- D.肾精不足
- E.肾阴虚

43.某女，63岁。头晕目眩，耳鸣耳聋，五心烦热，口燥咽干，腰膝酸软，舌红苔少，脉细数。辨证是（ ）。

44.某男，82岁。精神呆钝，动作迟缓，足痿无力，耳鸣耳聋，健忘恍惚，舌暗红苔薄白，脉沉弱。辨证是（ ）。

45.某男，65岁。畏寒肢冷，精神不振，腰膝酸软，小便清长，性欲减退，阳痿早泄，舌淡苔白，脉沉迟。辨证是（ ）。

【46-48】

- A.连蒲双清片
- B.四神丸
- C.加味保和丸
- D.人参健脾丸
- E.槟榔四消丸

46.某男，34岁。因工作压力大，平素喜欢吸烟、饮酒，经常熬夜。刻下腹痛，泻下急迫，粪色黄褐而臭，肛门灼热，烦热口渴，小便短黄，舌红苔黄腻，脉濡数。宜选用的中成药是（ ）。

47.某男，37岁。因饮食、饮酒无度，出现腹胀腹痛，泻下则缓，大便不调，纳食减少，噎腐吞酸，舌苔厚腻。宜选用的中成药是（ ）。

48.某女,48岁。大便溏泻,水谷不化,稍进油腻之物,则大便次数增多,饮食减少,恶心呕吐,脘腹疼痛,胀闷不舒,伴面色萎黄,肢倦乏力,舌淡苔白,脉细弱。宜选用的中成药是( )。

【49-51】

- A.芎菊上清丸  
B.通天口服液  
C.清眩丸  
D.脑立清丸  
E.川芎茶调颗粒

49.某男,30岁。野外勘查归来后,头痛时作,伴见恶寒、发热、鼻塞。宜选用的中成药是( )。

50.某女,60岁。患高血压病7年,近1周头痛如锥刺,痛处固定不移,反复发作,头晕目眩,恶心呕吐,恶风。宜选用的中成药是( )。

51.某女,45岁。近日常因子女学习问题气恼,头胀痛,恼怒加重,伴面色潮红,烦躁易怒,失眠多梦。宜选用的中成药是( )。

【52-54】

- A.连花清瘟胶囊  
B.柴银口服液  
C.桑菊感冒片  
D.感冒清热颗粒  
E.参苏丸

52.某女,18岁。流感流行时期,与同学一起去看电影,次日发热,体温38.3℃,症见恶寒,肌肉酸痛,咳嗽,头痛,舌偏红苔黄,脉浮。宜选用的中成药是( )。

53.某女,40岁。初春,衣着较少,自觉恶寒,体温37.6℃,症见头痛,恶寒身痛,鼻流清涕,咳嗽,咽干,舌红苔薄白,脉浮。宜选用的中成药是( )。

54.某男,73岁。元旦与家人一起游园,次日发热,体温37.5℃,症见头痛鼻塞,咳嗽痰多,胸闷,呕逆,乏力,气短,舌胖淡,苔薄白,脉虚。宜选用的中成药是( )。

【55-57】

- A.红粉  
B.雄黄  
C.斑蝥  
D.蟾酥  
E.轻粉

55.根据《中国药典》,只可外用,不可内服的毒性中药是( )。

56.根据《中国药典》,内服剂量为0.015~0.03g的毒性中药是( )。

57.根据《中国药典》,孕妇慎用的毒性中药是( )。

【58-59】

- A.固阴煎  
B.膈下逐瘀汤  
C.温经汤  
D.人参归脾丸  
E.逍遥散

58.某女,27岁。月经或提前或错后,经量时多时少,色暗红或紫红,夹有血块,经行不畅,胸胁、乳房、少腹胀痛,脘闷不舒,时叹息,暖气食少;苔薄黄,脉弦。宜选用的基础方剂是( )。

59.某女,35岁。月经提前10日,量少,色淡质稀,腰膝酸软,头晕耳鸣,面色晦暗;舌淡

暗苔白，脉沉细。宜选用的基础方剂是（ ）。

【60-61】

- A.牛黄化毒片  
B.乳康片  
C.乳疾灵颗粒  
D.乳增宁胶囊  
E.乳癖消胶囊

60.某女，34岁。哺乳期患急性乳腺炎，症见乳房胀痛，皮色微红，皮肤发热，内有肿块，乳汁不畅，舌红苔薄黄，脉弦数。宜选用的中成药是（ ）。

61.某女，43岁。患乳腺增生病，症见双侧乳房疼痛并出现肿块，月经前加重，经后缓解，乳房肿块大小不一、边界不清，时伴胸闷胁胀，善郁易怒，月经失调，心烦口苦。宜选用的中成药是（ ）。

【62-63】

- A.佐金平木法  
B.培土制水法  
C.金水相生法  
D.益火补土法  
E.培土生金法

62.某女，52岁。畏寒肢冷，腰膝冷痛，五更泄泻，下利清谷，舌淡胖，边有齿痕，苔白滑，脉沉无力，证属脾肾阳虚，宜采用的治法是（ ）。

63.某男，48岁。急躁易怒，胸胁胀痛，口苦咽干，咳逆阵作，咳时面赤，痰黏，舌红苔薄黄，脉弦细数，证属肺阴不足、肝火上逆犯肺。宜采用的治法（ ）。

【64-65】

- A.10~25℃  
B.10~30℃  
C.2~10℃  
D.2~8℃  
E.不超过20℃

根据《中国药典》“凡例”【贮藏】项下对各名词术语的规定

64.常温所指的环境温度是（ ）。

65.凉暗处是指避光且环境温度是（ ）。

【66-67】

- A.消疲灵颗粒  
B.芪苈强心胶囊  
C.参松养心胶囊  
D.安神补心丸  
E.朱砂安神片

66.某女，65岁。心悸不安，气短乏力，动则加剧，胸部闷痛，失眠多梦，盗汗，神倦懒言，舌暗，脉结代。诊断为心悸，证属气阴两虚、心络瘀阻。宜选用的中成药是（ ）。

67.某男，70岁。心慌气短，动则加剧，夜间不能平卧，下肢浮肿，倦怠乏力，小便短少，口唇青紫，畏寒肢冷，咳吐稀白痰，舌淡苔白，脉虚弱。诊断为心悸，证属阳虚气虚、络瘀水停。宜选用的中成药是（ ）。

【68-70】

- A.蓖麻子  
B.白矾

C.苦杏仁

D.香加皮

E.胆矾

68.过量服用可出现心律失常，早搏，血压先升后降等不良反应的饮片是（ ）。

69.过量服用可出现认知功能障碍、痴呆等不良反应的饮片是（ ）。

70.过量服用可出现口麻，咽部灼感，腹痛腹泻，甚至严重脱水、溶血等不良反应的饮片是（ ）。

【71-73】

A.华山参

B.川楝子

C.青风藤

D.天仙藤

E.五味子

71.肝功能不全患者应避免使用的饮片是（ ）。

72.青光眼、前列腺重度肥大患者应避免使用的饮片是（ ）。

73.肾功能不全患者应避免使用的饮片是（ ）。

【74-76】

A.红舌

B.淡红舌

C.绛舌

D.紫舌

E.淡白舌

74.某女，45岁。纳呆食少，神疲乏力，大便稀溏，每日2~3次，面色无华，证属脾阳虚，其常见的舌象是（ ）。

75.某女，52岁。外感热病，身热夜甚，口渴不甚，烦热躁扰，斑疹隐现，手足瞤动，证属热入营血，其常见的舌象是（ ）。

76.某男，61岁。胸胁胀痛，烦躁易怒，头晕目眩，夜寐梦多，大便秘结，小便黄，口干苦，证属里实热，其常见的舌象是（ ）。

【77-78】

A.白芷

B.蛇蜕

C.蝉蜕

D.补骨脂

E.木蝴蝶

77.破故纸的正名是（ ）。

78.白故纸的正名是（ ）。

【79-80】

A.柏子仁和酸枣仁

B.炙黄芪和炙甘草

C.浙贝母和川贝母

D.天葵子和冬葵子

E.鸡矢藤和鸡血藤

某药店的部分中药斗谱排列如下（图）

柏 子 仁	酸 枣 仁	鸡 矢 藤	鸡 血 藤	浙 贝 母	川 贝 母	炙 黄 芪	炙 甘 草	天 葵 子	冬 葵 子
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

79.因气味恶劣,不宜与其他饮片装于同一药斗中,需要调整斗谱位置的是( )。

80.因饮片外观性状相似易引起混淆,需要调整斗谱位置的是( )。

【81-83】

A.药物配伍联用存在证候禁忌

B.药物中的成分存在“十八反”配伍禁忌

C.药物中的相同成分存在“叠加”现象

D.药物中的毒性成分存在“叠加”现象

E.药物中的成分存在“十九畏”配伍禁忌

81.某男,56岁。患胆结石服用利胆排石片。近日又出现高热烦躁,尿赤便秘,拟加服紫雪散。执业药师指出,此中成药联用不合理,原因是( )。

82.某男,56岁。因胸痹心痛长期服用复方丹参滴丸。近日因跌倒扭伤足踝,拟口服七厘散以散瘀止痛。执业药师指出,此中成药联用不合理,原因是( )。

83.某女,65岁。因患风湿性关节炎多年,长期服用风湿骨痛胶囊。近日因外感头痛,拟服用正天丸。执业药师指出,此中成药联用不合理,原因是( )。

【84-85】

A.可增加药物排泄

B.可减少药物排泄

C.可发生酶抑反应

D.可发生酶促反应

E.可发生药效拮抗

84.某女,65岁。因患有糖尿病长期服用格列本脲。近日因外感咳嗽,医师予以含大量甘草的中药汤剂治疗。执业药师指出,此中西药联用不合理,原因是( )。

85.某男,68岁。因帕金森病长期服用司来吉兰。近日因外感风热出现鼻塞、流黄稠涕,医师予以千柏鼻炎片。执业药师指出,此中西药联用不合理,原因是( )。

【86-87】

A.灼痛

B.刺痛

C.重痛

D.胀痛

E.隐痛

86.气血不足引起的头痛多见( )。

87.瘀血阻滞经脉引起的头痛多见( )。

【88-90】

A.葛根汤颗粒

B.补中益气丸

C.龙胆泻肝丸

D.耳聋左慈丸

E.导赤丸

88.耳鸣耳聋,证属肝火上扰者,宜选用的中成药是( )。

89.耳鸣耳聋,证属脾胃虚弱者,宜选用的中成药是( )。

90.耳鸣耳聋,证属肾精亏损者,宜选用的中成药是( )。

三、综合分析选择题(共20题,每题1分,题目分为若干组,每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的各选项中,只有1个最符合题意)

(一)

某女，4岁。壮热烦躁，面红，大汗出，口渴喜冷饮，尿少色黄，便秘；舌红苔黄，脉数。

- 91.根据中医理论，分析其病机是（ ）。
- A.阴胜则阳病  
B.阳胜则阴病  
C.阴虚则热  
D.阳虚则寒  
E.阴虚则阳亢
- 92.该患儿体温进一步升高，出现手足厥冷，脉沉伏有力。分析其病机是（ ）。
- A.阴胜则寒  
B.阴盛格阳  
C.阳虚则寒  
D.阳盛格阴  
E.阳气亡失
- 93.分析其病情的变化，辨证是（ ）。
- A.实热  
B.虚热  
C.真寒假热  
D.真热假寒  
E.虚寒
- 94.根据病情变化的辨证结果，宜采用的治法是（ ）。
- A.以热治热  
B.以寒治热  
C.以寒治寒  
D.以热治寒  
E.用热远热

(二)

某男，34岁。胃痛隐隐，绵绵不休，喜温喜按，劳累，受凉或空腹时疼痛明显，进食后疼痛缓解，时呕清水，神疲纳少，四肢倦怠，手足不温，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱。医师诊断为胃痛，证属脾胃虚寒处方如下：炙黄芪9g，桂枝9g，白芍18g，生姜6g，炙甘草9g，大枣6g，饴糖10g，7剂，水煎服，每日1剂早、午、晚分服。

- 95.以下有关药师针对处方中白芍饮片的遴选建议最适合的是（ ）。
- A.选用盐炒白芍，增强补益作用  
B.选用酒炒白芍，增强止痛作用  
C.选用醋炒白芍，增强止痛作用  
D.选用清炒白芍，缓和寒性  
E.选用土炒白芍，增强止泻作用
- 96.以下有关药师对此患者的用药教育内容，正确的是（ ）。
- A.重视精神的调摄，避免过度劳累  
B.汤剂水煎温服，每日2次，宜餐后服用  
C.方中大枣宜擘开入煎，饴糖宜冲服  
D.嘱患者服中药疼痛不缓解，可服用水杨酸类止痛药  
E.嘱患者少食多餐，多吃高纤维食物
- 97.患者欲改服中成药巩固治疗，根据辨证结果，不宜选用的中成药是（ ）。
- A.黄芪健胃膏  
B.胃疡灵颗粒  
C.胃乐新颗粒  
D.虚寒胃痛胶囊  
E.温胃舒胶囊

(三)

某女，27岁。1周前因右前臂出现鲜红色皮疹，皮疹为圆形红斑，上附糠状鳞屑，自服复方青黛胶囊，每次4粒，每天3次。服药4天后出现恶心、乏力、腹胀、身黄、目黄，遂停药就诊。入院查体：体温37℃，皮肤及巩膜黄染，无肝掌及蜘蛛痣，心肺听诊未闻及异常，腹软；实验室检查：丙氨酸氨基转移酶600U/L，天门冬氨酸氨基转移酶528U/L，总胆红素98μmol/L，甲、乙丙型肝炎病毒学检查均为阴性。经询问，患者服药期间未服用其他药物及保健品，但2年前曾服用过复方青黛胶囊，也曾出现过转氨酶升高的情况。入院对症处理后症状缓解，复查肝功能：丙氨酸氨基转移酶100U/L，天门冬氨酸氨基转移酶98U/L，总胆红素18μmol/L。

98. 执业药师对该患者肝损伤与复方青黛胶囊之间的关联性进行评价，正确的评价结果是（ ）。

- A. 可能无关
- B. 肯定相关
- C. 可能相关
- D. 很可能相关
- E. 无法评价

99. 执业药师分析导致该患者出现肝损伤的原因，正确的是（ ）。

- A. 患者特异体质
- B. 服药剂量过大
- C. 服药疗程过长
- D. 没有辨证用药
- E. 药物相互作用

#### (四)

某男，50岁。冠心病心绞痛病史5年，查血清肌酐、尿素氮均增高。近因劳累复发，心前区疼痛加重1周，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌体胖大有齿痕，舌质淡暗，舌苔薄白，脉弱而涩。

100. 四诊合参，辨析其证候是（ ）。

- A. 寒凝心脉
- B. 气虚血瘀
- C. 心肾阳虚
- D. 气滞血瘀
- E. 痰瘀痹阻

101. 根据辨证结果，宜采用的治法是（ ）。

- A. 行气活血，通脉止痛
- B. 益气活血，通脉止痛
- C. 豁痰化瘀，通阳宣痹
- D. 温补心肾，活血通脉
- E. 温阳散寒，宣通心阳

102. 根据辨证结果，宜选用的基础方剂是（ ）。

- A. 血府逐瘀汤
- B. 苏合香丸
- C. 补阳还五汤
- D. 瓜蒌薤白桂枝汤
- E. 桃仁红花煎

103. 1周后，患者诉上述症状有所好转，但最近因家庭琐事劳心过度，出现入睡困难，多梦易醒，心悸健忘，纳差。应避免使用的中成药是（ ）。

- A. 柏子养心丸
- B. 北芪五加片
- C. 人参归脾丸
- D. 眠安宁口服液
- E. 脑力静糖浆

#### (五)

某女，40岁。呃逆、暖气1周余。因与家人吵架生气后，呃声不断，暖气则舒，胃脘痞塞，时有嘈杂反酸，急躁易怒，多梦，大便不畅，舌红，苔薄黄腻，脉弦。既往史：乙型肝炎5年，十二指肠溃疡2年。医师处方如下旋覆花9g，吴茱萸5g，黄连5g，枳实9g，紫苏梗10g，香附10g，陈皮10g，竹茹10g，甘草9g，7剂，水煎服，每日1剂早、晚分服。

104.患者服药后，呃逆频次减少，胃脘痞塞减轻，但仍暖气反酸，食欲不振。自行到药店买药，要求购药21剂。执业药师告知患者，长期服用该处方存在风险，因其含有（ ）。

- A.黄连
- B.吴茱萸
- C.旋覆花
- D.枳实
- E.香附

105.患者听取上述建议后复诊，医师处以复方猴头颗粒巩固治疗。执业药师提醒患者，该药含西药成分，应注意不要与含相同成分的西药合用。复方猴头颗粒所含的西药成分除硫酸铝、三硅酸镁外，还有（ ）。

- A.碳酸氢钠
- B.氯化铵
- C.碱式硝酸铋
- D.氧化锌
- E.碳酸钙

### (六)

某男，68岁。半年前因中风，遗留半身不遂，口眼喎斜，言语謇涩，出院后常规服用阿司匹林肠溶片（每次100mg，每日1次）。近2周，因过度劳累，患侧肢体无力、活动不便加重，伴浮肿，面色少华：伸舌右偏，舌色淡紫，舌边有瘀斑，苔薄白，脉细涩无力。医师诊断为中风，证属气虚血瘀，处方如下：黄芪30g，桃仁10g，当归6g，川芎9g，红花10g，赤芍10g，地龙6g，半夏6g，7剂，水煎服，每日1剂，早、晚分服。

106.关于对该案例开展药学服务的说法，错误的是（ ）。

- A.建议中药处方选用炒桃仁、酒赤芍、生黄芪
- B.建议黄芪一般用量为30~60g，长期服用，每日用量不宜超过120g
- C.建议桃仁捣碎后入煎：水煎温服，每日2次，宜餐前服用
- D.患者不欲服用汤剂，建议改服消栓胶囊每次2粒，每日3次，饭后服用
- E.建议患者加强偏瘫肢体的被动活动，进行各种功能锻炼

107.1周后，患者因外感风寒，内伤湿滞，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻，医师予以藿香正气水内服，执业药师应告知正确的服用方法是（ ）。

- A.餐前服用藿香正气水，餐后服用阿司匹林肠溶片
- B.餐前服用藿香正气水，餐中服用阿司匹林肠溶片
- C.餐中服用藿香正气水，餐前服用阿司匹林肠溶片
- D.餐后服用藿香正气水，餐前服用阿司匹林肠溶片
- E.餐后服用藿香正气水，餐中服用阿司匹林肠溶片

### (七)

某女，65岁，糖尿病史8年，刻下口渴引饮，小便频数，多食善饥，肢体消瘦，体倦乏力，睡眠欠佳，腰膝酸痛，舌淡红，苔白而干，脉细弱。

108.四诊合参，辨析其证候是（ ）。



- A.脾胃气虚
- B.气阴两虚
- C.阴虚燥热
- D.胃阴不足
- E.阴阳两虚

109.根据辨证结果，宜选用的中成药是（ ）。

- A.消渴丸
- B.益津降糖口服液
- C.消糖灵胶囊
- D.六味地黄丸
- E.金匮肾气丸

110.服药后，上述症状减轻。近因劳累，过食辛辣，又见小便频数，尿色黄赤，灼热涩痛，大便干结，尿常规检查：白细胞 90 个/HP，蛋白质（±），葡萄糖（+）。根据病情变化，宜选用的中成药是（ ）。

- A.净石灵胶囊
- B.济生肾气丸
- C.知柏地黄丸
- D.分清五淋丸
- E.萆薢分清丸

**四、多项选择题（共 10 题，每题 1 分，每题备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，错选，少选均不得分）**

111.某男，76 岁。小便点滴而下，尿如细线，甚则阻塞不通，小腹胀满，烦躁口苦，舌紫暗，苔黄腻，脉涩。诊断为癃闭，证属湿热瘀阻。可选用的中成药有（ ）。

- A.前列通片
- B.癃闭舒胶囊
- C.热淋清颗粒
- D.前列通瘀胶囊
- E.前列舒丸

112.执业药师在调剂审方中，要关注中成药的联用，保证患者安全、合理用药。下列中成药联用存在配伍禁忌的有（ ）。

- A.人参再造丸与通宣理肺丸
- B.尪痹冲剂与川贝枇杷露
- C.祛痰止咳颗粒与镇咳宁胶囊
- D.朱砂安神丸与天王补心丸
- E.磁朱丸与消瘦五海丸

113.某女，42 岁。腹内出现肿块，固定不移，疼痛拒按，形体消瘦，纳谷减少，面色晦暗，肌肤甲错，舌暗紫，有瘀斑、瘀点，脉细涩。诊断为积聚，证属瘀血内结。可选用的中成药有（ ）。

- A.康力欣胶囊
- B.肝脾康胶囊
- C.鳖甲煎丸
- D.和络舒肝胶囊
- E.化癥回生片

114.某男，10 岁。近 2 日发热，咽痛，时咳，腹泻，日 5~6 次。家长的朋友根据个人育儿经验，推荐治疗腹泻可用双歧杆菌三联活菌胶囊，发热、咽痛、时咳可用中药方（金银花、连翘、鱼腥草、黄芩、甘草）。家长遂去药店咨询，执业药师告知，服用双歧杆菌三联活菌胶囊，应避免同时使用的中药有（ ）。

- A.金银花
- B.连翘

- C.鱼腥草  
E.黄芩
- D.甘草

- 115.据阴阳互根互济的原理，对于阴阳偏衰的治法有（ ）。  
A.阴病治阳  
B.阴阳双补  
C.阳病治阴  
D.阳中求阴  
E.阴中求阳
- 116.根据痰饮的致病特点，其所致的病症有（ ）。  
A.头目眩晕  
B.阴疽流注  
C.身体痛重  
D.癥积痞块  
E.癫狂痴呆
- 117.执业药师在提供药学服务时，需加以提示的特殊情况有（ ）。  
A.同时使用 2 种含同一成分的药品  
B.患者第一次使用某药品  
C.同一种药品有多种适应症  
D.药品说明书近期有修改  
E.需特殊贮存的药品
- 118.发药是中药调剂工作的最后一个环节，执业药师与患者核对药品种类和数量，并对其进行用药指导，关于中成药用药指导内容和要点的说法，正确的有（ ）。  
A.中成药的使用禁忌和注意事项  
B.需特殊贮存的药品，应提醒患者按要求贮存  
C.中西药联用，应向患者交代间隔半小时左右服用  
D.中成药的药物组成  
E.栓剂，滴眼液等特殊剂型，应向患者说明正确的使用方法
- 119.某患者因类风湿关节炎服用雷公藤制剂，执业药师对其进行用药指导，正确的建议有（ ）。  
A.服药期间可能出现腹痛、腹泻，恶心、呕吐等消化系统症状  
B.定期检测血常规，关注血小板、白细胞、血红蛋白等的变化  
C.本药可抑制男女生殖功能，有生育需求者禁用  
D.服药期间可能出现头晕，失眠、听力减退等神经系统症状  
E.出现任何不良反应，必须立即停药
- 120.肾功能不全时，药物代谢和排泄会受到影响。关于肾功能不全患者用药基本原则和注意事项的说法，正确的有（ ）。  
A.根据治疗情况及时调整剂量或更换治疗药物  
B.尽量不用可能导致肾功能损害的药物  
C.坚持少而精的用药原则  
D.部分中药有特殊煎煮时间要求，应合理选择煎煮时间  
E.多种药物联用时，应注意药物相互作用，避免产生新的肾损害

# 2019 年全国执业药师职业资格考试

## 《中药学综合知识与技能》真题

### 一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1.某女，38 岁。自觉咽中不适，如有物梗塞，胸闷，经前乳房胀痛，舌苔白腻，脉弦滑。辨证为痰气互结证。所谓“证”是指（ ）。

- A.症状表现
- B.病理概括
- C.诊断方法
- D.疾病名称
- E.疾病过程

2.某女，50 岁。月经淋漓不断，色淡质稀，食少便溏，畏寒肢冷，少气懒言，头晕乏力，舌淡，脉细弱。基于气的生理功能分析，该病证属于（ ）。

- A.推动作用失常
- B.温煦作用失常
- C.防御作用失常
- D.固摄作用失常
- E.气化作用失常

3.某男，30 岁。发热喜凉，面红目赤，伴有口臭，牙龈肿痛，大便干燥，小便短赤，舌红，苔黄，脉数。中医辨证是（ ）。

- A.实热
- B.虚热
- C.虚实错杂
- D.实寒
- E.里寒表热

4.某男，49 岁。虚烦失眠，心悸健忘，手足心热，头晕耳鸣，腰酸梦遗，舌红，无苔，脉细数。中医辨证是（ ）。

- A.心阴虚
- B.心火亢盛
- C.心肾不交
- D.心脾两虚
- E.肝肾阴虚

5.某男，28 岁。突然发热，高热不退，周身酸痛，咽喉疼痛，舌红，苔黄，脉浮数。自诉有多位同事出现类似症状。中医诊断是（ ）。

- A.风寒感冒
- B.风热感冒
- C.暑湿感冒
- D.体虚感冒
- E.时行感冒

6.某男，68 岁。长期吸烟，干咳 3 个月，近日咳嗽加重，午后咳甚，少痰，痰中带血，颧红潮热，五心烦热，耳鸣，舌红，少苔，脉细数。中医辨证是（ ）。

- A.风寒犯肺
- B.风热犯肺
- C.燥邪伤肺
- D.肺肾阴虚
- E.痰热壅肺

7.中药雷公藤制剂广泛用于类风湿关节炎、肾病综合征等疾病的治疗。国家药品不良反应监

测中心病例报告显示，雷公藤制剂可引起肝、肾、血液系统和生殖系统等损害。执业药师在进行雷公藤制剂用药指导时，用药建议错误的是（ ）。

- A.患者服用该类药物时应从最小剂量开始
- B.严格控制用药剂量和疗程，一般连续用药不宜超过3个月
- C.心、肝、肾功能不全者禁用，老年有严重心血管病者慎用
- D.育龄期有孕育要求者，用药时应严格控制剂量和疗程，并密切监测不良反应
- E.用药期间应定期随诊，并注意检查血、尿常规，加强心电图和肝肾功能的监测

8.含有毒成分的中成药联合应用时应注意有毒成分的“叠加”，以免引起不良反应。因药物组成含附子，不宜与大活络丸联用的中成药是（ ）。

- A.天麻丸
- B.苏合香丸
- C.天王补心丸
- D.牛黄清心丸
- E.牛黄醒消丸

9.某女，23岁。风热感冒，服用银翘解毒丸。为增强药物疗效，服用时可使用药引。正确的药引和服用方法是（ ）。

- A.焦三仙煎汤送服
- B.鲜芦根煎汤送服
- C.清茶送服
- D.米汤送服
- E.姜汤送服

10.某男，38岁。因口腔溃疡，疼痛明显来医院就诊，兼见口渴，心烦，小便短赤，大便干结，检查见口腔黏膜多处溃疡，基底覆以黄苔，周围黏膜色红，舌红，苔黄腻，脉数有力。宜选用的中成药是（ ）。

- A.加味逍遥丸
- B.当归龙荟丸
- C.清胃黄连丸
- D.连蒲双清片
- E.口炎清颗粒

11.国家药品不良反应监测中心病例报告显示，莲必治注射液不良反应表现为急性肾功能损害、皮疹、头晕、胃肠道反应、过敏样反应等，并在药品不良反应信息通报中进行了相关报告。关于莲必治注射液相关用药指导的说法，错误的是（ ）。

- A.有肾脏疾患的患者应避免使用该药
- B.老年人、儿童、哺乳期妇女禁用
- C.应避免与氨基糖苷类等有肾毒性药物联合使用
- D.严格掌握适应症，加强对用药患者肾功能的监测
- E.如患者用药后出现腰痛、腰酸等，应立即到医院就诊，检查肾功能情况

12.某女，57岁。因上呼吸道感染，给予10%葡萄糖注射液250ml，加入注射用双黄连3.6g静脉滴注约输入150ml时，患者出现皮肤瘙痒，继之全身出现红色皮疹、呼吸困难、大汗、血压75/50mmHg，立即停用注射用双黄连，给予生命体征监护，并经静脉推注地塞米松，皮下注射肾上腺素，3小时后症状逐渐消失。根据《药品不良反应报告和监测管理办法》要求，报告该病例不良反应最迟应不超过（ ）。

- A.5 个工作日
- B.15 个工作日
- C.10 个工作日
- D.20 个工作日
- E.30 个工作日

13.某男，40 岁。3 年前头部曾受外伤，经住院治疗症状改善。近 6 个月反复头痛，部位固定在左颞部，痛如锥刺，舌紫暗，苔薄白，脉涩。宜选用的方剂是（ ）。

- A.羚角钩藤汤加减
- B.川芎茶调散加减
- C.补阳还五汤加减
- D.通窍活血汤加减
- E.桃仁承气汤加减

14.某男，56 岁。喘促日久，动则喘甚，舌淡，苔薄，辨证为肾不纳气，给予金匱肾气丸治疗，但久治不愈，且见咽干烦躁，医师决定加用其他中成药。宜与金匱肾气丸联用的中成药是（ ）。

- A.四君子丸
- B.通宣理肺丸
- C.生脉胶囊
- D.小青龙合剂
- E.清肺化痰丸

15.某女，25 岁。妊娠 7 周，近日脘腹胀满，噯腐吞酸，不欲饮食，舌苔薄白，脉滑。宜选用的中成药是（ ）。

- A.清宁丸
- B.开胸顺气丸
- C.保和丸
- D.槟榔四消丸
- E.山楂化滞丸

16.某男，35 岁。形体肥胖，嗜食肥甘，口中黏腻，来院进行血糖、血脂等相关检查。检查结果：FBG 5.6mmol/L，TC 5.16mmol/L，TG 2.45mmol/L，HDL-C 1.4mmol/L，LDL-C 2.27mmol/L。其中，指标异常的是（ ）。

- A.FBG
- B.TG
- C.TC
- D.HDL-C
- E.LDL-C

17.某男，75 岁。患消渴病 20 余年，尿频量多，饮一溲一，口干舌燥，耳鸣，腰膝酸软，畏寒肢冷。诊察患者见面容憔悴，耳轮干枯，舌淡，苔白少津，脉沉细无力。中医辨证是（ ）。

- A.阴阳两虚
- B.肾阴亏虚
- C.脾胃气虚
- D.阴虚燥热
- E.肾阳虚衰

18.某女，31 岁。每年春天皮肤起风团，色鲜红，灼热剧痒，症状加重时伴有发热，恶寒，咽喉疼痛不适；舌红，苔薄黄，脉浮数。宜选用的方剂是（ ）。

- A.香薷饮加减
- B.防风汤加减
- C.杏苏散加减
- D.消风散加减
- E.银翘散加减

19.鞣质可分为缩合鞣质和可水解鞣质。研究表明，缩合鞣质的毒性较低，对肝脏无毒或只有轻度损害；可水解质的毒性较高，长期大量应用可引起肝小叶中央坏死、脂肪肝、肝硬化。

因含有大量可水解鞣质，进入机体后几乎全部被分解成倍酸与焦酸，极大量时可引起灶性肝细胞坏死的中药是（ ）。

- A.川楝子
- B.五倍子
- C.苍耳子
- D.黄药子
- E.蓖麻子

20.《神农本草经》是现存最早的本草学专著，载药 365 种，包括（ ）。

- A.上品 120 种，中品 125 种，下品 120 种
- B.上品 125 种，中品 120 种，下品 120 种
- C.上品 120 种，中品 120 种，下品 125 种
- D.上品 120 种，中品 115 种，下品 130 种
- E.上品 115 种，中品 130 种，下品 120 种

21.某女，44 岁。与同事争吵后出现胃脘胀痛，连及胁肋，嗳气时作，食欲不振，嘈杂吞酸，舌淡红，苔薄白，脉弦。宜选用的方剂是（ ）。

- A.丹栀逍遥散加减
- B.柴胡疏肝散加减
- C.二陈汤加减
- D.保和丸加减
- E.良附丸加减

22.中西药联用得当合理、相互为用，可取长补短使疗效增强，病程缩短，药物的毒副作用减少。具有协同增效作用的中西药联用药组是（ ）。

- A.四逆汤与地高辛
- B.磁朱丸与诺氟沙星
- C.急支糖浆与地高辛
- D.参茸片与格列本脲
- E.健胃消食片与红霉素

23.中成药有很多剂型不同剂型采用的贮藏养护方法各不相同。一般而言，应置于阴凉、干燥处并密闭贮藏、防止受潮的剂型是（ ）。

- A.软膏剂
- B.酒剂
- C.颗粒剂
- D.胶剂
- E.胶囊剂

24.某男，6 岁。不思饮食，腹满喜按，神疲肢倦，大便稀溏腥臭，夹有不消化食物，面色萎黄，舌淡，苔白，脉濡细。宜选用的方剂是（ ）。

- A.保和丸加减
- B.理中丸加减
- C.枳术丸加减
- D.健脾丸加减
- E.良附丸加减

25.某男，69 岁。因肛门有脱出物且大便带血到医院就诊。患者常年肛门松弛，时有痔核脱出，需手法还纳，便血色淡，面白，乏力，纳呆；舌淡边有齿痕，脉弱。宜选用的方剂是（ ）。

- A.槐花散加减
- B.补中益气汤加减
- C.脏连丸加减
- D.止痛如神汤加减
- E.凉血地黄汤加减

26.某男,68岁。因感冒、发热、头痛、鼻塞流涕、四肢乏力等不适症状就诊,测体温39℃,医师开具吲哚美辛栓退热。不宜与该药联用的中成药是( )。

- A.清开灵胶囊
- B.感冒软胶囊
- C.新癬片
- D.连花清瘟颗粒
- E.疏风解毒胶囊

27.某女,5岁。母亲诉患儿饭量比同龄孩子少,但饮水较多且常说口干,平时容易发脾气,手足心热,大便偏干,小便黄。诊察见患儿毛发皮肤失于润泽,舌红,舌苔花剥,脉细数。中医辨证是( )。

- A.脾失健运
- B.脾胃气虚
- C.胃阴不足
- D.脾胃湿热
- E.肝胃不和

28.大黄廑虫丸处方组成为大黄、土鳖虫、水蛭、虻虫、蛭螭、干漆、桃仁、地黄、白芍、黄芩、苦杏仁、甘草。方中大黄宜选用的炮制品是( )。

- A.生大黄
- B.酒大黄
- C.醋大黄
- D.熟大黄
- E.大黄炭

29.某男,32岁。因银屑病来医院就诊医师辨证为血虚风燥,开具的处方为:土茯苓、半枝莲、龙葵、生地黄、当归、白芍、徐长卿、牡丹皮、紫草、水牛角、炒槐花、北豆根、生侧柏、白鲜皮、地肤子、鬼箭羽。煎煮时需要后下的饮片是( )。

- A.牡丹皮
- B.徐长卿
- C.土茯苓
- D.炒槐花
- E.白鲜皮

30.含有砷、汞等矿物类成分的中成药,长期服用可造成血尿、蛋白尿等肾功能损害,肾功能不全患者应慎用。同时含有砷、汞等矿物类成分的中成药是( )。

- A.人参再造丸
- B.苏合香丸
- C.安宫牛黄丸
- D.天王补心丸
- E.牛黄解毒丸

31.属于配伍禁忌,斗谱排列时不能装于一斗及上下斗的饮片是( )。

- A.当归与独活
- B.天葵子与冬葵子
- C.藜芦与漏芦
- D.甘草与芫花
- E.法半夏与川贝母

32.某男,52岁。胃脘隐痛10余年,嗳气,无烧心反酸,时便秘,舌淡红,苔白,脉沉缓。胃镜检查结果为萎缩性胃炎。宜选用的藏药方剂是( )。

- A.六味安消散
- B.二十五味松石丸
- C.坐珠达西丸
- D.仁青芒觉胶囊
- E.三十五味沉香丸

33.某男，75岁。患中风3年。现左侧肢体僵硬拘挛，活动不遂，头痛头晕，面赤耳鸣，舌红，苔薄黄，脉弦。宜选用的中成药是（ ）。

- A.消栓颗粒
- B.天麻钩藤颗粒
- C.脑心通胶囊
- D.醒脑再造胶囊
- E.通天口服液

34.某男，55岁。患痹证20余年，肢体关节疼痛，屈伸不利，关节肿大、僵硬、变形，筋脉拘急，腰膝酸软，骨蒸潮热；舌红，少苔，脉细数。中医辨证是（ ）。

- A.行痹
- B.痛痹
- C.尪痹
- D.热痹
- E.着痹

35.某女，48岁。经血量多，非时而下，淋漓不净，血色紫暗有块，小腹疼痛，舌紫暗，脉弦涩有力。中医辨证是（ ）。

- A.气血两虚
- B.脾不统血
- C.肝肾不足
- D.瘀血阻络
- E.冲任不固

36.某男，52岁。平素脾胃虚弱。近3日因目赤肿痛，自行服用黄连上清丸，出现胃脘不适，大便稀溏等。针对该患者体征，其适宜的服药时间是（ ）。

- A.饭后
- B.空腹
- C.饭前
- D.睡前
- E.餐中

37.某女，29岁。小便频数短涩，灼热刺痛，尿色黄赤，少腹拘急胀痛，发热，口苦，大便秘结，舌红，苔黄腻，脉滑数。宜采用的治法是（ ）。

- A.清热利湿通淋
- B.清热养阴生津
- C.清热排石通淋
- D.滋补肝肾利尿
- E.补肾健脾利湿

38.中药在贮藏过程中，由于受到诸多因素的影响，其质量也会不断发生变化。对中药质量变异有影响的自身因素是（ ）。

- A.水分、虫害、油脂
- B.油脂、淀粉、色素
- C.日光、淀粉、色素
- D.虫害、霉菌、容器
- E.空气、水分、包装

39.毒性中药药性峻烈，治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒甚则死亡，因此掌握毒性中药饮片的正确用法尤为重要。下列毒性中药不可内服的是（ ）。

- A.雄黄
- B.白降丹
- C.生藤黄
- D.砒石
- E.蟾酥

40.某男，36岁，因感冒初起，咽喉肿痛就诊。医师处方：金银花、蒲公英、连翘、薄荷、甘



草，代茶饮。代茶饮的服用方法是（ ）。

- A.不拘时频服
- B.1 次顿服
- C.每日服 2 次
- D.每日服 3 次
- E.4 小时服 1 次

二、配伍选择题（共 50 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组分别对应一组备选项，备选项可重复选用，也可不选用。每题只有 1 个最佳答案）

【41-43】

- A.血府逐瘀汤加减
- B.附子汤加减
- C.补阳还五汤加减
- D.乌头赤石脂丸加减
- E.生脉散加减

41.某男，65 岁。胸痛胸闷，胸胁胀满，心悸；唇舌紫暗，脉涩。宜选用的方剂是（ ）。

42.某男，50 岁。胸痛隐隐，遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌淡暗，脉弱而涩。宜选用的方剂是（ ）。

43.某女，53 岁。胸痛彻背，感寒痛甚，胸闷气短，心悸，形寒肢冷，舌淡，苔薄白，脉沉迟。宜选用的方剂是（ ）。

【44-45】

- A.面黄红润
- B.面黄萎黄
- C.面黄如橘
- D.面黄虚胖
- E.面黄晦暗

44.肝胆湿热、内蕴脾胃，常见的面色特征是（ ）。

45.脾气虚衰、湿邪内阻，常见的面色特征是（ ）。

【46-47】

- A.肺司呼吸失常
- B.脾主运化失常
- C.肾主藏精失常
- D.心主血脉失常
- E.肝主疏泄失常

46.某男 50 岁。胸痛连背，背痛彻胸，气短，劳则尤甚；舌紫暗，脉沉涩。基于五脏的生理功能分析其病变属于（ ）。

47.某女，35 岁。胸胁胀痛，咽中异物感，时咳，痰少黏稠，舌淡红，脉沉弦。基于五脏的生理功能分析，其病变属于（ ）。

【48-50】

- A.后下
- B.对服
- C.包煎
- D.先煎
- E.冲服

某男，75 岁。近日入睡困难，心烦，口干，舌燥，小便短赤，大便干燥；舌尖红，脉数。医师诊断为不寐，证属心火炽盛，治以清心泻火。开具的处方为黄连、生地黄、当归、生大黄、

甘草、珍珠母、羚羊角粉。对患者进行煎药服用方法的指导。

48.珍珠母应采用的方法是（ ）。

49.生大黄应采用的方法是（ ）。

50.羚羊角粉应采用的方法是（ ）。

【51-53】

A.小青龙合剂

B.养阴清肺丸

C.清气化痰丸

D.七味都气丸

E.百合固金丸

51.某男，78岁。喘促日久，呼多吸少，气不得续，动则喘甚，形瘦神疲，汗出肢冷，舌淡，苔薄，脉沉。宜选用的中成药是（ ）。

52.某男，43岁。有慢性支气管炎病史，7日前因患感冒，现症状加重，咳嗽气粗，胸部胀痛，痰黏稠色黄，胸中烦闷，身热，有汗，口渴喜冷饮，咽干，面红，尿赤，便秘，舌红，苔黄腻，脉滑数。宜选用的中成药是（ ）。

53.某女，35岁。受凉后出现喘咳气逆，呼吸急促，胸部胀闷，痰多色白稀薄而带泡沫，兼头痛鼻塞，无汗，恶寒，发热，舌苔薄白而滑，脉浮紧。宜选用的中成药是（ ）。

【54-56】

A.斑蝥

B.麻黄

C.罂粟壳

D.大黄

E.艾叶

54.属于医疗用毒性药品的中药是（ ）。

55.须按麻醉药品管理的中药是（ ）。

56.根据2015年版《中国药典》，有小毒的中药是（ ）。

【57-58】

A.盐知母

B.蜜知母

C.醋知母

D.生知母

E.姜知母

57.白虎汤用于外感热病，调配时知母应给付的是（ ）。

58.大补阴丸用于阴虚火旺，调配时知母应给付的是（ ）。

【59-60】

A.真武汤

B.小青龙汤

C.桂枝汤

D.四物汤

E.芍药甘草汤

59.中西药联用时，可与皮质激素类药联用而减轻其副作用的是（ ）。

60.中西药联用时，可与利尿药联用而减轻其口渴副作用的是（ ）。

【61-63】

A.急性肾功能损害、皮疹、头晕、胃肠道反应、过敏样反应

- B.肝肾功能异常、粒细胞、白细胞和血小板减少、精子数量减少
- C.肝损害、剥脱性皮炎
- D.胰腺炎、低钾血症、低氯血症、低钠血症
- E.过敏性休克、急性喉头水肿、过敏性哮喘、过敏性间质性肾炎

- 61.服用克银丸发生严重不良反应时可见（ ）。
- 62.使用清开灵注射液发生严重不良反应时可见（ ）。
- 63.服用珍菊降压片发生严重不良反应时可见（ ）。

**【64-66】**

- A.六味地黄丸
- B.薯蓣丸
- C.龟龄集
- D.龟鹿二仙膏
- E.生脉饮

老年人因脏腑生理功能衰退，常感体力不济，记忆力不如以前，想服用滋补药增强体质，但需辨证选药，合理使用。

- 64.阴阳两虚者宜用（ ）。
- 65.肾阴虚者宜用（ ）。
- 66.肾阳虚者宜用（ ）。

**【67-69】**

- A.微脉
- B.弱脉
- C.缓脉
- D.细脉
- E.虚脉

- 67.某男，70岁。患消渴病多年，饮食减少，神疲乏力，四肢倦怠，舌淡，苔白，脉来三部举按皆无力，隐隐蠕动指下，此脉象是（ ）。
- 68.某男，80岁。久病，不耐寒热，头晕，神疲乏力，自汗盗汗，脉来沉细，应指无力，此脉象是（ ）。
- 69.某男，74岁。久病泄泻，气短汗出，神情淡漠，面色苍白，手足逆冷，舌淡，苔白，脉来若有若无，按之欲绝，此脉象是（ ）。

**【70-72】**

- A.清茶送服
- B.生姜煎汤送服
- C.黄酒送服
- D.米汤送服
- E.淡盐水送服

- 70.某女，75岁。大便干结难下2月余，脘腹胀满，口干口苦，心烦不宁，舌苔黄腻，脉弦。诊断为便秘，给予更衣丸。为增强疗效，执业药师建议可使用的药引和服用方法是（ ）。
- 71.某女，65岁。恶寒重，发热轻，头身疼痛，鼻塞，流清涕，舌淡，苔白，脉浮紧。给予正柴胡饮颗粒。为增强疗效，执业药师建议可使用的药引和服用方法是（ ）。
- 72.某男，25岁。踝关节扭伤，活动受限，舌暗，苔白脉弦。给予活血止痛胶囊。为增强疗效，执业药师建议可使用的药引和服用方法是（ ）。

【73-75】

- A. 湿热内蕴
- B. 脾肾阳虚
- C. 肝气乘脾
- D. 食伤肠胃
- E. 脾胃气虚

73. 某男，46岁。常年泄泻，大便时溏时泻，水谷不化，迁延反复，食少，食后脘闷不适，稍进油腻之物则便次明显增多，面色萎黄，肢倦乏力，舌淡，苔薄白，脉细弱。中医辨证是（ ）。

74. 某男，32岁。泄泻腹痛，泻下急迫，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，小便短黄，烦热口渴，舌红，苔黄腻，脉滑数。中医辨证是（ ）。

75. 某男，29岁。3天前饱食后出现腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，夹有不消化食物，泻后痛减，脘腹胀满，噎腐吞酸，舌苔厚腻，脉滑。中医辨证是（ ）。

【76-77】

- A. 金银花、首乌藤
- B. 金银花、金银藤
- C. 金银花、海风藤
- D. 款冬花、金银藤
- E. 款冬花、首乌藤

76. 处方中的并开药“忍冬花藤”，执业药师在调配时应付（ ）。

77. 处方中的并开药“金银花藤”，执业药师在调配时应付（ ）。

【78-79】

- A. 乌鸡白凤丸
- B. 加味道遥丸
- C. 益母丸
- D. 妇科调经片
- E. 艾附暖宫丸

78. 某女，35岁。因月经不调就诊，诊断为月经先期，辨证属肝经郁热证，宜选用的中成药是（ ）。

79. 某女，42岁。因月经不调就诊，诊断为月经后期，辨证属气滞血瘀证，宜选用的中成药是（ ）。

【80-81】

- A. 阳盛
- B. 阳虚
- C. 亡阳
- D. 阴盛
- E. 阴虚

80. 某男，27岁。壮热口渴，烦躁不安，面红目赤，舌红苔黄，脉洪大。分析该病机是（ ）。

81. 某男，84岁，久病，近患感冒，因发汗过多，出现精神疲惫，肌手足逆冷，冷汗淋漓，脉微欲绝。分析该病机是（ ）。

【82-83】

- A. 归脾丸
- B. 八珍颗粒
- C. 小金丸
- D. 双黄连口服液
- E. 枣仁安神胶囊

妊娠期妇女使用中成药时要慎重选择，以免损伤胎儿及母体。

82.根据 2015 年版《中国药典》，孕妇应禁用的中成药是（ ）。

83.根据 2015 年版《中国药典》，孕妇应慎用的中成药是（ ）。

【84-85】

- |       |       |
|-------|-------|
| A.泽泻  | B.吴茱萸 |
| C.牡丹皮 | D.灯心草 |
| E.细辛  |       |

84.按照对抗贮存法，宜与冰片同贮的中药是（ ）。

85.按照对抗贮存法，宜与蛤蚧同贮的中药是（ ）。

【86-87】

- |          |           |
|----------|-----------|
| A.2~10℃  | B.10~25℃  |
| C.2~5℃   | D.不超过 20℃ |
| E.10~30℃ |           |

根据 2015 年版《中国药典》“凡例”【贮藏】项下对药品贮藏与保管基本要求的规定。

86.阴凉处的温度应控制在（ ）。

87.冷处的温度应控制在（ ）。

【88-90】

- |        |        |
|--------|--------|
| A.气滞血瘀 | B.气不摄血 |
| C.气随血脱 | D.气虚血瘀 |
| E.气血两虚 |        |

88.某女，57 岁。胸胁胀满，走窜疼痛，性情急躁，舌紫暗，有瘀斑，脉涩。中医辨证是（ ）。

89.某女，48 岁。月经出血量多，大汗淋漓，四肢厥冷，唇舌色淡，脉微细，中医辨证是（ ）。

90.某女，51 岁。少气懒言，乏力自汗，面色苍白，舌淡而嫩，脉细弱，中医辨证是（ ）。

三、综合分析选择题（共 20 题，每题 1 分，题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

（一）

某女，67 岁，大便秘结，二三日一行，量少，排出不畅，面色无华，头晕目眩，心悸，口干，舌淡，苔少，脉细涩。

91.四诊合参，中医辨证是（ ）。

- |        |        |
|--------|--------|
| A.津亏肠燥 | B.热结肠胃 |
| C.气滞郁结 | D.胃肠积滞 |
| E.阳虚寒凝 |        |

92.宜采用的治法是（ ）。

- |        |        |
|--------|--------|
| A.养血润燥 | B.清热润肠 |
| C.顺气行滞 | D.温通开秘 |
| E.泻下导滞 |        |

93.宜选用的中成药是（ ）。

- A.清宁丸
- B.当归芦荟丸
- C.补中益气丸
- D.麻仁丸
- E.槟榔四消丸

(二)

某女 35 岁。因银屑病口服复方青黛丸，每日 3 次，每次 6g。服药 23 天后，出现乏力、恶心、腹胀、纳差。检查结果显示患者肝功能异常，临床诊断为药物性肝损伤。排除了其他因素后，停用复方青黛丸，肝功能逐步恢复正常。查阅患者病历，患者 2 年前服用该药 20 天，也曾出现相同症状。

94.该患者肝功能异常的不良反应与复方青黛丸之间的因果关系应评价为（ ）。

- A.很可能
- B.可能
- C.可能无关
- D.肯定
- E.无法评价

95.复方青黛丸常见的不良反应不包括（ ）。

- A.头晕
- B.腹痛腹泻
- C.肾功能损伤
- D.胃肠道出血
- E.肝功能异常

(三)

某女，25 岁。月经延迟，小腹胀痛拒按，经血量少，血色紫暗有块，经行不畅，经前胸胁、乳房胀痛，饮食可，二便调，舌暗，苔白，脉弦。

96.根据中医诊法理论与实践，本病例所见小腹胀痛，经前胸胁、乳房胀痛的病机分析是（ ）。

- A.气虚
- B.气滞
- C.血虚
- D.血瘀
- E.气逆

97.四诊合参，本病例的中医辨证是（ ）。

- A.气滞血瘀
- B.阳虚内寒
- C.瘀血阻络
- D.寒滞肝脉
- E.寒凝气滞

(四)

某男，48 岁。因口渴多饮、多食、多尿、腰膝酸软、四肢乏力等不适症状就诊，近 2 月来体重下降 5kg，相关检查显示随机血糖 15mmol/L，HbA1c 8.5%，临床诊断为 2 型糖尿病。

98.HbA1c 是目前临床诊断糖尿病常用检测指标之一，其水平反映近 2~3 月的平均血糖水平，正常参考值应为（ ）。

- A.3.5%~6%
- B.4%~6%
- C.5%-7.1%
- D.5%~7.8%
- E.5%~8%

99.医师开具格列本脲，执业药师进行用药指导时，建议不要自行同服含有相同西药成分的中

成药。下列药物中含有格列本脲的是（ ）。

- A.十味玉泉胶囊
- B.金芪降糖片
- C.消糖灵胶囊
- D.糖脉康胶囊
- E.渴乐宁胶囊

100.该患者近期偶患感冒，发热，头痛，咳嗽，咽痛，不宜选用的中成药是（ ）。

- A.桑菊感冒丸
- B.感冒清热颗粒
- C.银翘解毒胶囊
- D.双黄连胶囊
- E.复方金黄连颗粒

### (五)

某男，57岁。自诉眩晕，动则加剧，常因劳累而加重，心悸少寐，入睡困难，神疲懒言，食欲不振，面色无华，舌淡，脉细弱。

101.中医辨证是（ ）。

- A.痰浊上蒙
- B.气阴两虚
- C.气血亏虚
- D.肝肾阴虚
- E.脾胃气虚

102.宜采用的治法是（ ）。

- A.滋肾柔肝
- B.益气养血
- C.涤痰宣窍
- D.益气养阴
- E.益气健脾

103.宜选用的方剂是（ ）。

- A.朱砂安神丸加减
- B.涤痰汤加减
- C.八珍汤加减
- D.杞菊地黄丸加减
- E.生脉散加减

104.宜选用的中成药是（ ）。

- A.半夏天麻丸
- B.左归丸
- C.养血安神丸
- D.归脾丸
- E.补中益气丸

### (六)

某女，36岁。平素汗出较多，易患感冒。因近日鼻塞不通、常流脓涕、前额头痛等不适症状就诊。医师诊断为鼻渊，辨证为风热蕴肺兼表虚不固，开具饮片处方如下：

XX医院处方笺

就诊卡号：XXXXXX		就诊科室：中医科门诊	
姓名：XXX	性别：女	年龄：36	费别：医保
临床诊断： 鼻渊	黄芪 15g 炒白术 15g 辛夷 <sup>(包煎)</sup> 10g 菊花 10g	炒苍耳子 15g 防风 10g 黄芩 12g 龙胆草 9g	青蒿 10g 白芷 12g 薄荷 <sup>(后下)</sup> 5g 甘草 6g
7剂，水煎服			
医师签名（签章）：XXX XXXX年X月X日			

金额：XXX 审核/调配签名（签章）：XX 核对/发药签名（签章）：XX

105.该患者服用7剂后，出现恶心、呕吐、食少等症状，相关检查显示血ALT、AST显著升高，处方中最可能引起该不良反应的中药是（ ）。

- A.黄芩
- B.苍耳子
- C.龙胆草
- D.白芷
- E.青蒿

106.该中药中引起肝损伤的主要化学物质属于（ ）。

- A.毒蛋白类
- B.多肽类
- C.黄酮类
- D.生物碱类
- E.萜类

### (七)

某男，45岁。平素喜饮浓茶，嗜好烟酒，经常熬夜。现入睡困难，且多梦易醒，心悸健忘，虚烦不安，时有盗汗，舌淡，苔薄，脉细。医师诊断为不寐。

107.中医辨证是（ ）。

- A.心火炽盛
- B.肝气郁结
- C.心脾两虚
- D.阴血亏虚
- E.心肾不交

108.宜采用的治法是（ ）。

- A.交通心肾
- B.滋阴养血
- C.清心泻火
- D.疏肝解郁
- E.健脾养心

109.宜选用的方剂是（ ）。

- A.逍遥散加减
- B.温胆汤加减
- C.朱砂安神丸加减
- D.天王补心丹加减
- E.交泰丸加减

110.对该患者的健康指导，正确的是（ ）。

- A.晚餐不宜过饱，不饮浓茶，睡前推荐阅读，11点前入睡
- B.晚餐尽量饱食，不饮浓茶，睡前避免阅读，11点后入睡
- C.晚餐不宜过饱，不饮浓茶，睡前推荐阅读，11点后入睡
- D.晚餐不宜过饱，不饮浓茶，睡前避免阅读，11点前入睡
- E.晚餐尽量饱食，不饮浓茶，睡前避免阅读，11点前入睡

**四、多项选择题（共10题，每题1分，每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选，少选均不得分）**

111.盐酸麻黄碱有较强的兴奋中枢神经作用，大剂量使用可引起失眠、头痛、心悸、心动过速等不良反应，故高血压、动脉硬化、心绞痛患者应禁用。含盐酸麻黄碱成分的中成药有（ ）。

- A.安嗽糖浆
- B.舒肺糖浆



- C.川贝枇杷糖浆  
E.镇咳宁糖浆
- 112.婴幼儿患者合理应用中药的原则有（ ）。
- A.用量宜轻  
B.宜用轻清之品  
C.宜用健脾和胃之品  
D.宜用滋补之品  
E.宜佐凉肝定惊之品
- 113.根据未病先防的原则，培养正气，提高抗病能力的方法有（ ）。
- A.讲究卫生  
B.注意起居  
C.锻炼身体  
D.人工免疫  
E.避免病邪
- 114.某女，75岁。形体较瘦，头晕耳鸣，眼目干涩，口燥咽干，潮热颧红，五心烦热，盗汗，小便短黄，大便干结；舌红，无苔，脉细数。可选用的中成药有（ ）。
- A.左归丸  
B.六味地黄丸  
C.杞菊地黄丸  
D.右归丸  
E.济生肾气丸
- 115.某女，45岁。自觉畏寒，腰膝冷痛，面白，舌淡，脉沉迟。辨证为阳虚证，可采用的治法有（ ）。
- A.阳病治阴  
B.阳中求阴  
C.阴阳双补  
D.阴病治阳  
E.阴中求阳
- 116.中药饮片斗谱的编排是否科学、合理，直接影响配方效率和质量。处方中常以药对出现可放于同一斗中的饮片有（ ）。
- A.射干、北豆根  
B.盐杜仲、盐续断  
C.姜半夏、淡附片  
D.羌活、独活  
E.知母、浙贝母
- 117.某男，35岁。大便干结，面红身热，口臭口干，腹胀腹痛，舌红，苔黄，脉滑数，医师给予大承气汤，效果显著。该方剂体现的治法有（ ）。
- A.塞因塞用  
B.热因热用  
C.实则泻之  
D.通因通用  
E.热者寒之
- 118.药学咨询服务是执业药师应用所学专业面向患者、医护人员、公众等提供直接的、负责任的、与药品使用有关的服务，以期增强患者用药的依从性，减少药物不良反应，提高药物治疗的安全性、有效性与经济性。执业药师在用药咨询过程中的沟通技巧包括（ ）。
- A.认真倾听  
B.注意语言表达  
C.注意非语言的运用  
D.咨询时间宜长不宜短  
E.提供的信息不宜过多



# 2020 年全国执业药师职业资格考试

## 《中药学综合知识与技能》真题参考答案

### 一、最佳选择题

1. 【答案】C

【解析】中药药学服务的主要实施内容包含与患者用药相关的全部需求，因此药学服务的具体工作，除传统的中药处方调剂工作以外，还包括中药处方点评、用药咨询、中药医嘱审核、参与临床查房、开展药学查房、开展药学监护、参与临床会诊、患者用药教育、健康宣教、个体化药学服务及用药安全性检测等多个环节。

2. 【答案】C

【解析】《金匮要略方论》全书以《内经》理论为指导，理论联系实际，开创了内伤杂病辨证论治的体系，对后世临床医学的发展有深远影响。

3. 【答案】B

【解析】根据五行相克规律确定的治法，主要有抑木扶土法、培土制水法、佐金平木法、泻南补北法等。抑木扶土法即疏肝健脾或平肝和胃的治法，又称疏肝健脾法。

4. 【答案】D

【解析】小肠的主要生理功能有受盛、化物和泌别清浊。小肠在吸收水谷精微的同时，也吸收了大量水液，无用之水液入于膀胱，故称“小肠主液”。

5. 【答案】E

【解析】凶门迟闭，手足软弱，食少纳呆，智力低下与生长发育失常有关，元气的功能是推动和促进人体的生长发育，温煦和激发各脏腑、经络等组织器官的生理活动。

6. 【答案】C

【解析】有灰白色假膜，擦之不去，重擦出血且随即复生为白喉，属肺热阴伤之证。

7. 【答案】C

【解析】育龄期妇女除一些需要常规需要关注的情况之外，还需要询问妊娠以及哺乳情况。

8. 【答案】B

【解析】月经后期的血虚证中成药选用复方益母草膏、四物益母丸。

9. 【答案】A

【解析】粉刺的胃肠湿热证，中成药选用消痤丸、金花消痤丸、清热暗疮片。

10. 【答案】A

【解析】罂粟壳临床表现为昏睡或昏迷，抽搐，呼吸浅表而不规则，恶心、呕吐、腹泻，面色苍白，发绀、瞳孔极度缩小呈针尖样，血压下降等。

11. 【答案】D

【解析】气短懒言，语声低微，头昏神疲，肢体无力，脉虚无力辨证为气虚证，基础方剂是四君子汤。

12.【答案】A

【解析】僵蚕应调配麸炒品。

13.【答案】B

【解析】若舌上满布白苔，有如白粉堆积在舌上，扪之不燥，为积粉苔，由于外感秽浊不正之气，毒热内盛所致，常见于瘟疫，亦见于内痈。

14.【答案】D

【解析】郁证肝气郁结证中成药应用逍遥丸和丹栀逍遥丸、越鞠丸。丹栀逍遥丸主治情志不遂，肝郁化火，肝失疏泄，肝脾不和所致郁证。症见情绪低落，闷闷不乐，喜叹息，胸闷胁痛，腹胀便溏，心烦不寐，甚至急躁易怒，舌红苔黄，脉弦细数。

15.【答案】D

【解析】根据“喘促”辨病为喘证，根据辨证要点“动则喘甚，呼多吸少，气不得续”，辨证为肾不纳气证，选用的方剂是肾气丸合参蛤散加减。

16.【答案】C

【解析】寒凝血瘀证导致的痛经应选用的中成药有：温经丸、少腹逐瘀丸、妇科万应膏。

17.【答案】C

【解析】祛风止痛片含有制草乌，制草乌中毒，神经系统出现口舌、四肢及全身麻木、头痛、头晕、精神恍惚、语言不清或小便失禁，继而四肢抽搐、牙关紧闭、呼吸衰竭等症状；循环系统出现心悸气短、心律失常、血压下降、面色苍白、口唇发绀、四肢厥冷等症状。

18.【答案】B

【解析】婴幼儿患者合理应用中药的原则：（1）用药及时，用量宜轻小儿得病急，变化快，需及时用药，小儿脏腑娇嫩，对药敏感，处方要精，用量要轻。（2）宜用轻清之品，小儿脏气清灵，对大苦、大辛、大寒、大热、攻伐和药性猛烈的药物要慎用。（3）宜佐健脾和胃之品，小儿脾气不足，消化能力差，因此应佐以健脾和胃，消食导滞之品。（4）宜佐凉肝定惊之品，小儿体属纯阳，热病偏多，且肝常有余，易出现肝热抽搐、惊风之症。救治小儿疾病特别是外感病邪，出现壮热、烦躁、惊惕等症，则应在清热透解之时，佐以平肝息风之品。（5）不宜滥用滋补之品，小儿生机旺盛，宜饮食调理，不宜滥用滋补之品，否则使机体阴阳失衡，伤及脏腑气机。

19.【答案】D

【解析】根据精子存活率低，患者平时阳事不兴，伴小腹急满，小便短赤，舌苔薄黄，脉弦滑，辨证为男性不育症的湿热下注证，宜选用的方剂是程氏萆薢分清饮加减。

20.【答案】B

【解析】八味沉香散的功效是清心热、养心、安神、开窍，用于热病攻心、神昏谵语；冠心病，心绞痛。

21.【答案】C

【解析】一般室温在 20~35℃，相对湿度在 75%以上，霉菌极易萌发为菌丝，发育滋长。

22.【答案】A

【解析】厌食的脾胃阴虚证应选用的中成药是儿宝颗粒。

23.【答案】A

【解析】肺胀是多种肺系疾患反复发作，迁延不愈，导致肺气胀满，不得敛降的疾病，临床表现为胸部膨满，憋闷如塞，喘息上气，咳嗽痰多，烦躁，心悸，面色晦暗，或唇甲青紫，脘腹胀满，肢体浮肿等。西医学中慢性阻塞性肺疾病、慢性肺源性心脏病有上述表现者，可参考此内容辨证论治。

24.【答案】C

【解析】每剂药煎好后，应趁热及时滤出煎液，以免因温度降低而影响煎液的滤出及有效成分的含量。

25.【答案】D

【解析】玫瑰花与月季花属于外观相似功效不同的药物，不能放在同一个药斗。

26.【答案】A

【解析】喜炎平注射液不良反应表现：全身性损害表现为过敏样反应、过敏性休克等；呼吸系统损害表现为呼吸困难等；皮肤及附件损害表现为全身皮疹等；心血管系统表现为发绀等。

27.【答案】B

【解析】珍菊降压片含有西药成分是盐酸可乐定、氢氯噻嗪。氢氯噻嗪可抑制胰岛素释放，可使糖耐量降低、血糖升高。

28.【答案】B

【解析】湿毒蕴结选用的中成药是皮肤病血毒丸，连翘败毒丸治疗热毒蕴结的疖，牛黄化毒片治疗热毒炽盛的乳痈，活血解毒丸、活血消炎丸治疗气滞热壅的乳痈。

29.【答案】A

【解析】扶正解表法适用于体虚外感表证。体虚随气虚、血虚、阴虚、阳虚的不同，又分为益气解表法、养血解表法、滋阴解表法、助阳解表法四种。助阳解表法适用于阳虚外感表证，症见恶寒发热，无汗，头痛等表证外，兼见形寒肢冷，面白声微，舌淡苔白，脉浮无力。

30.【答案】A

【解析】标本兼治是指标本并重或均不太急时，当标本兼治。如临床表现有身热、腹硬满痛、大便燥结、口干渴、舌燥苔焦黄等，此属邪热里结为标，阴液受伤为本，标本俱急，治当标本兼顾，可用增液承气汤治之。泻下与滋阴同用，泻其实热可以存阴，滋阴润燥则有利于通下，标本同治可收相辅相成之功。

31.【答案】D

【解析】牛蒡子的别名是大力子、鼠黏子、牛子、恶实。梭罗子是娑罗子的别名。

32.【答案】C

【解析】橘红丸含有浙贝母、半夏、瓜蒌，小活络丸含有乌头类药物，一起联用属于十八反的配伍禁忌。

33.【答案】B

【解析】由咽部干燥，干咳少痰，颧红潮热，脉细数辨证为咽喉肿痛的虚火上炎证，治宜选

用的方剂是养阴清肺汤。

34.【答案】B

【解析】脑立清胶囊与六味地黄丸配伍使用，用于高血压病证属肝肾阴虚、风阳上扰者，属于两种功效相似的中成药同用治疗一种病证，达到增强疗效的协同作用；二陈丸燥湿化痰为主药，辅以平胃散同用，属于一药为主，一药为辅，辅药能够提高主药功效；内服六神丸，外用冰硼散吹喉，属于疾病的治疗方法不同；舟车丸常配合四君子丸同用，金匱肾气丸配麦味地黄丸、生脉散或参蛤散同用，属于一种药物能够明显抑制或消除另一种中成药的偏性或副作用。

35.【答案】A

【解析】腰部冷痛，得热则舒，肢冷畏寒，辨证为腰痛肾阳虚证，宜选用的方剂为右归丸。

36.【答案】B

【解析】根据痔疮，大便带血，舌红，苔薄黄，脉浮数，辨病为痔，证属风伤肠络证，宜选用的治法是清热凉血祛风。

37.【答案】D

【解析】薄荷、当归含挥发油多，应阴凉、干燥处贮存，贮藏时室温不可太高。

38.【答案】D

【解析】咳嗽痰湿蕴肺证选用的中成药是橘贝半夏颗粒。

39.【答案】B

【解析】胆固醇升高的临床意义：（1）血脂升高：高胆固醇血症或混合型高脂血症；（2）其他疾病：糖尿病、甲状腺功能减退症、肾病综合征以及阻塞性黄疸等；（3）应用某些药物；（4）长期高脂饮食。

40.【答案】B

【解析】带下量多，质清稀如水，腰痛如折，畏寒肢冷，小腹冷感。辨证带下过多肾阳亏虚证，宜选用的治法是温肾培元，固涩止带。

## 二、配伍选择题

【41-42】B、A

【解析】脾具有统摄血液、维持血行于脉内的功能。肝具有贮藏血液、调节血量、防止出血的功能。

【43-45】E、D、B

【解析】肾阴虚证的临床表现，常见头晕目眩，耳鸣耳聋，牙齿松动，失眠遗精，口燥咽干，五心烦热，盗汗，腰膝酸痛，舌红，脉细数。一般以肾病的主要症状和阴虚内热症状同见为辨证要点；肾精不足证的临床表现，常见男子精少不育，女子经闭不孕，性功能减退。小儿发育迟缓，身材矮小，智力和动作迟钝，囟门迟闭，骨骼痿软。成人早衰，发脱齿摇，耳鸣耳聋，健忘恍惚，动作迟缓，足痿无力，精神呆钝等。一般以小儿生长发育迟缓、成人早衰、生殖功能减退的表现为辨证要点；肾阳虚证的临床表现，常见形寒肢冷，精神不振，腰膝酸

软，或阳痿不举，舌淡苔白，脉沉迟或两尺无力。一般以全身功能低下伴见寒象为辨证要点。

【46-48】A、C、D

【解析】泻下急迫，粪色黄褐而臭，肛门灼热，烦热口渴，小便短黄；舌红苔黄腻，脉濡数辨证为泄泻湿热伤中证，宜选用的中成药是连蒲双清片。噎腐吞酸，舌苔厚腻辨证为泄泻食滞肠胃证，宜选用的中成药是加味保和丸。稍进油腻之物，则大便次数增多，伴面色萎黄，肢倦乏力辨证为泄泻脾胃虚弱证，宜选用的中成药是人参健脾丸。

【49-51】E、B、D

【解析】恶寒、发热辨证为风寒头痛，宜选用的中成药是川芎茶调颗粒。头痛如锥刺，痛处固定不移辨证为瘀血头痛，宜选用的中成药是通天口服液。头胀痛，恼怒加重，伴面色潮红，烦躁易怒辨证为肝阳头痛，宜选用的中成药是脑立清丸。

【52-54】A、D、E

【解析】流感流行时期辨证为时行感冒，宜选用的中成药是连花清瘟胶囊，自觉恶寒，体温 $37.6^{\circ}\text{C}$ ，恶寒身痛，鼻流清涕辨证为风寒感冒，宜选用的中成药是感冒清热颗粒；乏力，气短，脉虚辨证为气虚感冒，宜选用的中成药是参苏丸。

【55-57】A、D、D

【解析】红粉有大毒只可外用，不可内服，外用亦不宜久用，孕妇禁用；蟾酥内服用量 $0.015\sim 0.03\text{g}$ ，多入丸散，孕妇慎用；雄黄 $0.05\sim 0.1\text{g}$ 入丸散用，孕妇禁用；斑蝥内服 $0.03\sim 0.06\text{g}$ ，炮制后多入丸散用，孕妇禁用；轻粉内服每次 $0.1\sim 0.2\text{g}$ ，内服慎用，孕妇禁用。

【58-59】E、A

【解析】月经或提前或错后辨病为月经先后不定期，胸胁、乳房、少腹胀痛，脘闷不舒，时叹息，暖气食少；苔薄黄，脉弦辨证为肝郁证，宜选用的方剂是逍遥散，月经提前10日辨病为月经先期，腰膝酸软辨证为肾虚，宜选用的方剂是固阴煎。

【60-61】A、D

【解析】哺乳期患急性乳腺炎辨病为乳痈，皮肤发热，舌红苔薄黄，脉弦数辨证为热毒炽盛，宜选用的中成药是牛黄化毒片。乳腺增生病辨病为乳癖，双侧乳房疼痛并出现肿块，月经前加重，经后缓解辨证为冲任失调，宜选用的中成药是乳增宁胶囊。

【62-63】D、A

【解析】脾肾阳虚要温肾健脾，采用益火补土法；肺阴不足、肝火上逆犯肺要滋肺清肝，采用佐金平木法。

【64-65】B、E

【解析】常温是 $10\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，凉暗处是避光且不超过 $20^{\circ}\text{C}$ 。

【66-67】C、B

【解析】心悸的瘀阻心脉证的中成药选用参松养心胶囊；心悸的心阳不振证的中成药选用芪苈强心胶囊。

【68-70】D、B、A

【解析】香加皮含有强心苷，心血管系统主要为心律失常，如心率减慢、早搏，房室传导阻

滞等。白矾慢性中毒主要为明矾中的铝离子长期摄入导致的蓄积反应，神经毒性，阿尔茨海默病、痴呆和认知功能障碍；骨骼软化和营养不良；肝肾功能损伤；非缺铁性的小细胞低色素性贫血等。蓖麻子①消化系统口麻、咽部烧灼感、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、出血性胃肠炎，黄疸以及中毒性肝病等。②呼吸、循环系统呼吸、循环衰竭。③网状内皮系统严重脱水、低蛋白血症、水肿、毒血症、高热。④血液、泌尿系统溶血；血便、血尿、少尿、尿闭等中毒性肾病。⑤精神系统四肢麻木、行走不稳、烦躁不安、精神错乱、手舞足蹈、昏迷、幻觉、癫痫样发作。⑥有时可伴发过敏反应如口唇青紫、荨麻疹。

【71-73】B、A、D

【解析】川楝子具有肝毒性。华山参青光眼、前列腺重度肥大患者应避免使用。天仙藤具有肾毒性。

【74-76】E、C、A

【解析】淡白舌主虚寒证，阳气虚弱、气血不足；红舌主热证；可见于里实热证，也可见于阴虚内热。绛舌主内热深重，外感热病见绛舌，表示邪热深入营血，多见于热性病极期，内伤杂病中，绛舌常见于久病、重病之人，多属阴虚火旺。紫舌，舌见紫色，主病有寒热之分，绛紫色深，干枯少津，多系邪热炽盛、阴液两伤、血气壅滞不畅之象，淡紫或青紫湿润，多因阴寒内盛、血脉瘀滞所致。舌上有紫色斑点，称为瘀斑或斑点，多为血瘀之象。

【77-78】D、E

【解析】破故纸的正名是补骨脂，白故纸的正名是木蝴蝶。

【79-80】E、B

【解析】因气味恶劣，不宜与其他饮片装于同一药斗中的是鸡矢藤和鸡血藤。因饮片外观性状相似易引起混淆的是炙黄芪和炙甘草。

【81-83】E、C、D

【解析】利胆排石片含有郁金，紫雪散含有丁香，郁金和丁香属于十九畏内容，所以药物中的成分存在“十九畏”配伍禁忌；复方丹参滴丸和七厘散均含有冰片，属于药物中的相同成分存在“叠加”现象；风湿骨痛胶囊和正天丸含有乌头类毒性饮片，属于药物中的毒性成分存在“叠加”现象。

【84-85】E、C

【解析】格列本脲是降糖药，含甘草的汤剂可以升高血糖，二者不能一起联用可以产生拮抗作用；千柏鼻炎片含有麻黄碱成分不能与单胺氧化酶抑制药司来吉兰一起联用可以发生酶抑反应。

【86-87】E、B

【解析】隐痛多见于气血不足，阴寒内生；刺痛多见于瘀血。

【88-90】C、B、D

【解析】耳聋耳鸣肝火上扰证选用的中成药是龙胆泻肝丸；耳聋耳鸣脾胃虚弱证选用的中成药是补中益气丸；耳鸣耳聋肾精亏损证宜选用的中成药是耳聋左慈丸。

### 三、综合分析题



91.【答案】B

【解析】根据壮热烦躁，面红，大汗出，口渴喜冷饮，尿少色黄，便秘；舌红苔黄，脉数，辨证为实热证，是由阳偏盛引起的，阳盛则阴虚，体现的是阳盛则阴病。

92.【答案】D

【解析】除见身热、面红等实热症状外，又见手足厥冷，脉沉伏有力等假寒之象，属于邪热过剩，深浮于里，阳气被遏，郁闭于外，不能外透布达于肌表，从而形成阴阳排斥，而格阴于外，属于阳盛格阴。

93.【答案】D

【解析】阳盛格阴属于真热假寒证。

94.【答案】C

【解析】真热假寒证采取的治法是以寒治寒。

95.【答案】B

【解析】酒白芍可以缓和白芍苦寒之性，增强止痛作用。

96.【答案】A

【解析】黄芪建中汤水温煎服，每日3次，宜餐前或餐后1小时服用；饴糖临用时烊化兑服；少食多餐，忌粗糙多纤维饮食，慎用水杨酸、肾上腺皮质激素等西药；保持乐观的情绪，避免过度劳累与紧张。

97.【答案】C

【解析】辨证为脾胃虚寒证，治法应温中健脾，和胃止痛。宜选用的中成药为黄芪健胃膏、温胃舒胶囊、胃疡灵颗粒、虚寒胃痛胶囊。胃乐新颗粒宜用于胃阴亏耗证。

98.【答案】B

【解析】复方青黛丸（散、胶囊）可导致肝损伤、引起药物性肝炎。

99.【答案】A

【解析】特异质反应是指由于遗传因素机体产生的不良反应。为患者先天性代谢紊乱表现的特殊形式，即只有在接触某种药物后才表现出来的先天性代谢异常。

100.【答案】B

【解析】根据冠心病，辨病为胸痹，根据辨证要点神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌质淡暗，脉涩。辨证为气虚血瘀证。

101.【答案】B

【解析】胸痹气虚血瘀证宜选用的治法是益气活血，通脉止痛。

102.【答案】C

【解析】胸痹气虚血瘀证宜选用的方剂是补阳还五汤加减。

103.【答案】A

【解析】根据入睡困难，多梦易醒，心悸健忘，纳差，辨证为不寐属心脾两虚证，宜选用的中成药是北芪五加片、眠安宁口服液、脑力静糖浆、人参归脾丸。柏子养心丸用于心胆气虚证。

104.【答案】B

【解析】吴茱萸能够引起肝损伤，使用过量会引起腹痛、腹泻、视力障碍、错觉、脱发、胸闷、头痛、眩晕或皮疹、孕妇易流产的不良反应。

105. 【答案】C

【解析】复方猴头颗粒含有的西药成分为硫酸铝、碱式硝酸铋、三硅酸镁。

106. 【答案】D

【解析】消栓胶囊每次2粒，每日3次，饭前半小时服用。

107. 【答案】D

【解析】餐后服用藿香正气水，阿司匹林肠溶片应饭前适量水送服。

108. 【答案】B

【解析】根据糖尿病8年，辨病为消渴，根据辨证要点多食善饥，体倦乏力，辨证为气阴两虚。

109. 【答案】A

【解析】消渴气阴两虚证宜选用的中成药消渴丸。

110. 【答案】D

【解析】小便频数，尿色黄赤，灼热涩痛，大便干结，辨证为淋证热淋。宜选用的中成药是分清五淋丸。

#### 四、多项选择题

111. 【答案】ABD

【解析】癃闭湿热瘀阻证宜选用的中成药有前列通片、癃闭舒胶囊、前列通瘀胶囊。

112. 【答案】ABCDE

【解析】人参再造丸含有附子，通宣理肺丸含有川贝、半夏属于十八反，疔瘰冲剂含有附子，与川贝枇杷露川贝、半夏属于十八反，祛痰止咳颗粒含有甘遂，镇咳宁胶囊含有甘草属于十八反。朱砂安神丸与天王补心丸，均含有毒性成分朱砂。含朱砂（汞）（磁朱丸、更衣丸、安宫牛黄丸）与含还原性溴离子或含碘离子的中成药（消瘦五海丸、内消瘰疬丸）在肠内会形成有刺激性的溴化汞或碘化汞，导致药源性肠炎，赤痢样大便。

113. 【答案】CE

【解析】积聚瘀血内结证可选用的中成药有鳖甲煎丸、化癥回生片。

114. 【答案】ABCE

【解析】金银花、连翘、鱼腥草、黄芩等及其中成药不宜与菌类制剂如乳酶生、双歧杆菌等联用，避免抗菌的中药服用后，抗菌的同时抑制或降低西药菌类制剂的活性。

115. 【答案】DE

【解析】据阴阳互根互济的原理，对于阴阳偏衰的治法是阳中求阴、阴中求阳。

116. 【答案】ABCE

【解析】痰饮阻滞气血运行，影响水液代谢，易于蒙蔽心神。易形成痰饮以及阴疽流注。常见的病理表现为头目眩晕、恶心呕吐、气短、心悸或癫狂、昏不识人、身体痛重。

117. 【答案】ABCDE

【解析】执业药师在进行药学服务时，需特殊提示的情况较多，（1）多种药物合并应用。（2）出现不良反应。（3）依从性不好。（4）病情需要，处方用法用量与说明书不一致的。（5）超越说明书范围的适应证或剂量。（6）配伍禁忌。（7）首次使用的药品。（8）近期说明书有修改的。（9）患者使用的药品近期有严重或罕见的不良反应。（10）使用含有毒成分的药品。（11）同一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大或剂量接近阈值。（12）药品被重新包装，而包装的标识物不清晰。（13）使用需特殊条件贮存的药品，或临近有效期。

118.【答案】ABCE

【解析】中成药用药指导为：①确认用法用量。②说明中成药的使用禁忌和注意事项。③联合用药，说明应注意的问题。④提醒患者按照储存条件储存。⑤特殊人群，询问详细信息，避免发生药害事件。⑥关于药品疗效等相关咨询，应尽可能解答。

119.【答案】ABCDE

【解析】雷公藤的主要不良反应为：消化系统出现腹痛、腹泻，恶心、呕吐，食欲不振，肝损害，少数可致伪膜性肠炎，严重者可致消化道出血；血液系统出现血小板、白细胞、血红蛋白减少，严重者可发生急性粒细胞减少、再生障碍性贫血等；生殖系统出现男性患者雷公藤可抑制精细胞中酶的活性，导致精子产生和成熟发生障碍，表现为精子数量显著减少，长期用药还会导致性欲减退、睾丸萎缩；对女性患者雷公藤可抑制其卵巢功能，表现为月经紊乱，经量减少、卵巢早衰；神经系统出现头晕、乏力、失眠、听力减退、嗜睡、复视，还可引起周围神经炎；泌尿系统主要表现为急性肾功能衰竭，服药后迅速出现或逐渐发生少尿、水肿、血尿、蛋白尿、管型尿、腰痛或伴肾区叩击痛，常常发生于过量中毒时；心血管系统出现心悸、胸闷、心动过缓、气短、心律失常、心电图改变（ST-T段改变），严重者可可见血压急剧下降，个别出现室颤、心源性休克而死亡；皮肤黏膜损害出现皮肤糜烂、溃疡、斑丘疹、荨麻疹、瘙痒等。以及任何不良反应，必须立即停药。

120.【答案】ABCE

【解析】结合患者肾功能不全的患者，其用药基本原则和注意事项为：（1）明确疾病诊断和治疗目标。（2）忌用有肾毒性的药物。（3）注意药物相互作用，避免产生新的肾损害。（4）坚持少而精的用药原则。（5）定期检查，及时调整治疗方案。

# 2019 年全国执业药师职业资格考试

## 《中药学综合知识与技能》真题参考答案

### 一、最佳选择题

1.【答案】B

【解析】证是机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概况。诊断方法是辨证的方法。

2.【答案】D

【解析】月经淋漓不断，色淡质稀，食少便溏体现了气的固摄作用失常。

3.【答案】A

【解析】发热喜凉，大便干燥，小便短赤，舌红苔黄，脉数，辨证为实热。

4.【答案】C

【解析】心悸健忘定位在心，腰酸梦遗定位在肾，辨证为心肾不交。

5.【答案】E

【解析】根据辨证要点突然发热，高热不退，有多位同事出现类似症状辨证为时行感冒。

6.【答案】D

【解析】【此考点与新大纲有变化】该患者咳嗽辨病为咳嗽，根据辨证要点午后咳甚，五心烦热，舌红，少苔，脉细数辨证为肺肾阴虚。现大纲变为：该患者咳嗽辨病为咳嗽，根据辨证要点午后咳甚，五心烦热，舌红，少苔，脉细数辨证为肺阴亏耗。

7.【答案】D

【解析】雷公藤具有生殖毒性，抑制男性精细胞中酶的活性，抑制女性卵巢功能，育龄期有孕育要求者禁用。

8.【答案】A

【解析】含有附子不能与大活络丸联用的中成药是天麻丸，苏合香丸与天王补心丹含有朱砂，牛黄清心丸有朱砂、雄黄，牛黄醒消丸含有雄黄。

9.【答案】B

【解析】银翘解毒丸功效辛凉解表，清热解毒，选用鲜芦根煎汤送服。

10.【答案】C

【解析】【此考点与新大纲有变化】患者辨证为心脾积热的口疮，选用的中成药为清胃黄连丸。现大纲变为：患者辨证为心脾积热的口疮，选用的中成药为牛黄清胃丸、导赤丸。连蒲双清片功效：清热解毒，燥湿止痢，用于湿热蕴结所致的肠炎，痢疾，乳腺炎，疖肿，外伤发炎。口炎清颗粒功效：滋阴清热，解毒消肿，用于阴虚火旺所致的口腔炎症。

11.【答案】B

【解析】老年人、儿童、哺乳期妇女应避免使用莲必治注射液。

12.【答案】B

【解析】《药品不良反应报告和监测管理办法》要求对新的或严重的不良反应需用有效方式

快速报告，最迟应不超过 15 个工作日。

13.【答案】D

【解析】该患者头痛辨病为头痛，根据辨证要点痛如锥刺，舌紫暗，脉涩辨证为瘀血阻络，选用的方剂是通窍活血汤加减。

14.【答案】C

【解析】生脉胶囊与金匮肾气丸联用，可防止金匮肾气丸燥烈伤阴，降低副作用。

15.【答案】C

【解析】妊娠可以选用的中成药是保和丸，其他都是妊娠禁用药。

16.【答案】B

【解析】TG 成人正常范围 $<1.70$  mmol/L。

17.【答案】A

【解析】口干舌燥，耳轮干枯为阴虚，畏寒肢冷为阳虚，综合辨证为阴阳两虚。

18.【答案】D

【解析】根据风团辨病为瘾疹，根据辨证要点发热，咽喉疼痛不适，舌红，脉浮数辨证为风热犯表，选用的方剂是消风散加减。

19.【答案】B

【解析】含有大量可水解鞣质，进入机体后几乎全部被分解成倍酸与焦酸，极大量时可引起灶性肝细胞坏死的中药是五倍子。苍耳子和蓖麻子含有毒蛋白，川楝子和黄药子含有萜类。

20.【答案】C

【解析】神农本草经载药 365 种，其中上品 120 种，中品 120 种，下品 125 种。

21.【答案】B

【解析】根据胃脘胀痛辨病为胃痛，根据辨证要点胀痛，连及胁肋，嗳气，食欲不振辨证为肝气犯胃，采用的方剂为柴胡疏肝散加减。

22.【答案】A

【解析】四逆汤与地高辛联用，可以提高疗效和改善心功能不全患者的自觉症状。

23.【答案】D

【解析】需阴凉、干燥处并密闭贮藏、防止受潮的剂型是胶剂。软膏剂应置于阴凉、干燥处，遮光，密闭保存。酒剂应密封，置阴凉处贮存。颗粒剂应密封，在干燥处贮存，防止受潮。胶囊剂置于阴凉干燥处，密封保存。

24.【答案】D

【解析】根据辨证要点面色萎黄，神疲肢倦，夹有不消化食物，苔白，脉濡细辨证该患儿为脾虚夹积的积滞，选用的方剂为健脾丸加减。

25.【答案】B

【解析】根据辨证要点有痔核脱出，乏力，纳呆辨证该患者为脾虚气陷的痔，选用的方剂为补中益气汤加减。

26.【答案】C

【解析】新癪片中含有吡啶美辛，不宜与吡啶美辛栓联用。

27.【答案】C

【解析】【此考点与新大纲有变化】口干，手足心热，大便偏干、毛发皮肤失于润泽、舌苔花剥辨证为胃阴不足。现大纲变为：口干，手足心热，大便偏干、毛发皮肤失于润泽、舌苔花剥辨证为脾胃阴虚。

28.【答案】D

【解析】大黄虻虫丸功效：活血破瘀，通经消癥，宜用熟大黄。

29.【答案】B

【解析】徐长卿有效成分久煎易破坏，需后下。

30.【答案】C

【解析】同时含有砷、汞矿物类成分的中成药是安宫牛黄丸。人参再造丸含有附子，苏合香丸和天王补心丹含有朱砂，牛黄解毒丸含有雄黄。

31.【答案】D

【解析】甘草和芫花属于配伍禁忌“十八反”的内容。

32.【答案】D

【解析】藏药仁青芒觉胶囊功效：清热解毒，益肝养胃，明目醒神，愈疮，滋补强身。可用于治疗萎缩性胃炎。

33.【答案】B

【解析】【此考点与新大纲有变化】根据辨证要点头痛头晕，舌红，脉弦辨证为肝阳上亢的半身不遂，选用的中成药是天麻钩藤颗粒。现大纲变为：根据辨证要点头痛头晕，舌红，脉弦辨证为风阳上扰的中风，选用的中成药是心脑静片，松龄血脉康胶囊，全天麻胶囊。

34.【答案】C

【解析】根据辨证要点患痹证 20 余年辨证为尪痹。

35.【答案】D

【解析】根据辨证要点血色紫暗有块，脉弦涩有力辨证为瘀血阻络。

36.【答案】A

【解析】该患者脾胃虚弱，适宜的服药时间为饭后，以减少药物对胃肠道刺激。

37.【答案】A

【解析】根据辨证要点小便短赤、灼热刺痛、苔黄腻辨证为热淋，采用的治法是清热利湿通淋。

38.【答案】B

【解析】对中药质量变异有影响的自身因素有油脂、淀粉、色素、水分、黏液质、挥发油等。环境因素有：温度、湿度、日光、空气、霉菌、虫害、包装容器、贮存时间。

39.【答案】B

【解析】白降丹具腐蚀性，只能外用，不可内服。

40.【答案】A

【解析】代茶饮的服用方法是不拘时频服。

## 二、配伍选择题

【41-43】A、C、D

【解析】根据辨证要点胸痛胸闷，胀满，唇舌紫暗辨证为气滞血瘀的胸痹，选用的方剂为血府逐瘀汤加减；根据辨证要点胸痛隐隐，遇劳则发，唇淡暗辨证为气虚血瘀的胸痹，选用的方剂为补阳还五汤加减；【此考点与新大纲有变化】据辨证要点胸痛彻背，感寒痛甚辨证为寒凝心脉的胸痹，选用的方剂为乌头赤石脂丸加减。现大纲变为据辨证要点胸痛彻背，感寒痛甚辨证为寒凝心脉的胸痹，选用的方剂为枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤加减。

【44-45】C、D

【解析】肝胆湿热、内蕴脾胃，常见的面色特征是面黄如橘；脾气虚衰、湿邪内阻，常见的面色特征是面黄虚胖。

【46-47】D、E

【解析】胸痛，气短，舌紫暗是气虚血瘀的表现，与气的推动作用失常有关，心主血脉，可以推动血液的运行；胸胁胀痛，咽中异物感，脉沉弦，是气滞的表现，与肝主疏泄失常有关。

【48-50】D、A、E

【解析】珍珠母属于贝壳类，质地坚硬，有效成分不易煎出，应先煎；生大黄有效成分久煎易被破坏，应后下；羚羊角粉应避免与其他药同煎而导致其成分被药渣吸附影响药效，应冲服。

【51-53】D、C、A

【解析】【此考点与新大纲有变化】根据辨证要点呼多吸少，气不得续辨证为肾不纳气的喘证，选用的中成药为七味都气丸；根据辨证要点咳嗽，痰黏稠色黄，舌红，脉滑数辨证为痰热郁肺的喘证，选用的中成药为清气化痰丸；根据辨证要点痰多色白，无汗，恶寒，脉浮紧辨证为风寒闭肺的喘证，选用的中成药为小青龙合剂。现大纲变为根据辨证要点呼多吸少，气不得续辨证为肾不纳气的喘证，选用的中成药为补金片。根据辨证要点咳嗽，痰黏稠色黄，舌红，脉滑数辨证为痰热郁肺的喘证，选用的中成药为清肺化痰丸，清肺抑火丸，复方鲜竹沥液。

【54-56】A、C、E

【解析】斑蝥毒性剧烈，属于医疗用毒性药品；罂粟壳具有成瘾性，须按麻醉药品管理；艾叶有小毒。

【57-58】D、A

【解析】知母功用清热，白虎汤用于外感热病，方中用生知母；大补阴丸用于阴虚火旺，宜用盐知母。

【59-60】C、A

【解析】桂枝汤、人参类方剂与皮质激素类药联用，可减少激素的用量和副作用；真武汤、木防己汤、越婢加术汤、分消汤等与利尿药联用可减轻其口渴副作用。

【61-63】C、E、D

【解析】克银丸严重不良反应可见肝损害、剥脱性皮炎；清开灵注射液严重不良反应可见过敏性休克、急性喉头水肿、过敏性哮喘、过敏性间质性肾炎；珍菊降压片严重不良反应可见胰腺炎、低钾血症、低氯血症、低钠血症。

【64-66】D、A、C

【解析】阴阳两虚老人宜选用龟鹿二仙膏；肾阴虚老人宜选用六味地黄丸；肾阳虚老人宜选用龟龄集。

【67-69】E、B、A

【解析】虚脉特征为脉来三部举按皆无力，隐隐蠕动指下；弱脉特征为脉来沉细，应指无力；微脉特征为脉来若有若无，按之欲绝。

【70-72】D、B、C

【解析】更衣丸采用米汤送服，保护胃气；正柴胡饮颗粒采用生姜煎汤送服，增强其发散风寒的功效；活血止痛胶囊采用黄酒送服，增强其活血散瘀，消肿止痛的功效。

【73-75】E、A、D

【解析】【此考点与新大纲有变化】根据辨证要点面色萎黄，肢倦乏力辨证为脾胃气虚；根据辨证要点肛门灼热，舌红，苔黄腻，脉滑数辨证为湿热内蕴；根据辨证要点泻下粪便臭如败卵，夹有不消化食物，噤腐吞酸辨证为食伤肠胃。现大纲变为根据辨证要点面色萎黄，肢倦乏力辨证为脾胃虚弱；根据辨证要点肛门灼热，舌红，苔黄腻，脉滑数辨证为湿热伤中；根据辨证要点泻下粪便臭如败卵，夹有不消化食物，噤腐吞酸辨证为食滞肠胃。

【76-77】B、B

【解析】并开药“忍冬花藤”，应付金银花、金银藤；并开药“金银花藤”，应付金银花、金银藤。

【78-79】B、C

【解析】【此考点与新大纲有变化】肝经郁热所致的月经先期，选用的中成药是加味逍遥丸；气滞血瘀所致的月经后期，选用的中成药是益母丸。现大纲变为肝郁血热所致的月经先期，选用的中成药是丹栀逍遥丸；气滞所致的月经后期，选用的中成药是益母丸。

【80-81】A、C

【解析】根据症状壮热，舌红苔黄，脉洪大，分析病机为阳盛；根据症状发汗过多，肌肤手足逆冷，冷汗淋漓，脉微欲绝，分析病机为亡阳。

【82-83】C、E

【解析】属于妊娠禁用药的是小金丸；属于妊娠慎用药的是枣仁安神口服液。

【84-85】D、B

【解析】与冰片同贮的是灯心草；与蛤蚧同贮的是花椒、吴茱萸、萆薢茄。

【86-87】D、A

【解析】阴凉处指不超过 20℃；冷处指 2~10℃。

【88-90】A、C、E

【解析】根据辨证要点胸胁胀满，舌紫暗，有瘀斑辨证为气滞血瘀；根据辨证要点出血量多，唇舌色淡，脉微细辨证为气随血脱；根据辨证要点少气懒言，面色苍白辨证为气血两虚。

### 三、综合分析题



91.【答案】A

【解析】根据辨证要点面色无华，头晕目眩，口干辨证为津亏肠燥。

92.【答案】A

【解析】津亏肠燥所致的便秘，应采用的治法是养血润燥。

93.【答案】D

【解析】津亏肠燥所致的便秘，应选用的中成药是麻仁丸。

94.【答案】D

【解析】排除了其他因素后，停用复方青黛丸，肝功能逐步恢复正常。查阅患者病历，患者2年前服用该药20天，也曾出现相同症状。表明该患者肝功能异常的不良反应与复方青黛丸肯定有关。

95.【答案】C

【解析】复方青黛丸的不良反应为腹泻、腹痛、肝炎、肝功能异常、头晕，严重者表现为药物性肝损伤和肠胃出血，不包括肾功能损伤。

96.【答案】B

【解析】小腹胀痛，经前胸胁、乳房胀痛的病机分析是气滞。

97.【答案】A

【解析】胀痛拒按，血色紫暗有块，经前胸胁、乳房胀痛，辨证为气滞血瘀。

98.【答案】B

【解析】HbA<sub>1c</sub>正常参考值为4%~6%。

99.【答案】C

【解析】含有格列本脲的中成药为消糖灵胶囊。

100.【答案】B

【解析】发热，咽痛辨证为风热感冒，感冒清热颗粒用于风寒感冒，不能选用。

101.【答案】C

【解析】根据辨证要点神疲懒言，面色无华辨证为气血亏虚。

102.【答案】B

【解析】气血亏虚所致的眩晕，采用的治法是益气养血。

103.【答案】C

【解析】【此考点与新大纲有变化】治疗气血亏虚所致的眩晕，选用的方剂是八珍汤加减。现大纲变为治疗气血亏虚所致的眩晕，选用的方剂是归脾汤加减。

104.【答案】D

【解析】治疗气血亏虚所致的眩晕，选用的中成药是归脾丸。

105.【答案】B

【解析】ALT、AST显著升高，表明是肝损伤，处方中引起肝损伤的中药是苍耳子。

106.【答案】A

【解析】苍耳子中引起肝损伤的主要化学物质是毒蛋白类。

107.【答案】D

【解析】根据辨证要点虚烦不安，时有盗汗，舌淡辨证为阴血亏虚。

108.【答案】B

【解析】阴血亏虚所致的不寐，采用的治法是滋阴养血。

109.【答案】D

【解析】阴血亏虚所致的不寐，选用的方剂是天王补心丹加减。

110.【答案】D

【解析】对该患者的健康指导为晚餐不宜过饱，不饮浓茶，睡前避免阅读，11点前入睡。

#### 四、多项选择题

111.【答案】ABDE

【解析】川贝枇杷糖浆不含盐酸麻黄碱成分。

112.【答案】ABCE

【解析】婴幼儿患者合理应用中药的原则有：（1）用药及时，用量宜轻；（2）宜用轻清之品（大苦、大辛、大寒、大热、攻伐、药性猛烈慎用）；（3）宜佐健脾和胃之品；（4）宜佐凉肝定惊之品。（5）不宜滥用滋补之品。

113.【答案】BCD

【解析】培养正气，提高抗病能力的方法有：重视精神调养；加强身体锻炼；注意生活起居；人工免疫。

114.【答案】ABC

【解析】【此考点与新大纲有变化】根据辨证要点头晕耳鸣，眼目干涩，五心烦热，盗汗，舌红，无苔，脉细数辨证为虚劳的阴虚证，可选用的中成药为左归丸、六味地黄丸、杞菊地黄丸。现大纲变为可选用的中成药为人参固本丸，河车大造丸。

115.【答案】CDE

【解析】阳虚可采用的治法有阴阳双补、阴病治阳、阴中求阳。

116.【答案】ABDE

【解析】常以药对出现可放于同一斗中的饮片有射干和北豆根、盐杜仲和盐续断、羌活和独活、知母和浙贝母。姜半夏和淡附片属于配伍禁忌，不能放一起。

117.【答案】CE

【解析】该患者辨证为热结肠胃所致的便秘，大承气汤功效峻下热结，体现的治法为实则泻之、热者寒之。

118.【答案】ABCE

【解析】执业药师的沟通技巧包括：（1）认真倾听；（2）注意语言表达；（3）注意非语言的运用；（4）注意掌握时间。时间不宜过长，提供的信息不宜过多；（5）关注特殊人群。

119.【答案】BD

【解析】该处方中含有乌头类药的中成药金匱肾气丸、风湿骨痛胶囊。

120.【答案】ACDE

【解析】含汞的中药有朱砂、轻粉、银朱、红粉，雄黄含砷。

金英杰医考官方公众号