

2023 年临床助理第二单元考生回忆真题试卷

温馨提示:

题目源自考生回忆,内容的进一步完善还需要大家的积极参与,若有不同建议及补充请联系身边的金英杰老师,我们会根据大家的反馈综合评估后进行实时修订,祝大家顺利拿证!

- 1.慢性酒精中毒不会出现下列哪种症状
 - A.戒断综合征
 - B.谵妄
 - C.遗忘
 - D.柯萨可夫综合征
 - E.病理性醉酒
- 2.主动脉瓣狭窄的典型症状
 - A.呼吸困难、心绞痛、晕厥
 - B.呼吸困难、晕厥、咯血
 - C.晕厥、咯血、心绞痛
 - D.呼吸困难、咯血、心绞痛
 - E.晕厥、呼吸困难、心悸
- 3.水痘不会出现的情况是
 - A.丘疹、疱疹和结痂同时出现
 - B.皮疹退后留疤痕
 - C.最初表现为斑丘疹
 - D.皮疹向心性分布
 - E.皮疹先出现在躯干和头部
- 4.恐惧障碍和广泛性焦虑的鉴别点是
 - A.精神焦虑
 - B.躯体焦虑
 - C.自我认知
 - D.行为干预
 - E.特异性指向对象
- 5.急性白血病患者最危及生命的出血是
 - A.消化道出血
 - B.咯血
 - C.眼底出血
 - D.颅内出血
 - E.尿血
- 6.川崎病的冠状动脉损害最常发生于起病的第
 - A.2~3 天
 - B.7~10 天
 - C.10~14 天
 - D.14~28 天
 - E.1~2 个月
- 7.通过粪一口途径传播的传染病是

- A. 戊型病毒性肝炎
 - B. 乙型病毒性肝炎
 - C. 丙型病毒性肝炎
 - D. 麻疹
 - E. 白喉
8. 好发于儿童及青少年的卵巢肿瘤是
- A. 非特异性间质瘤
 - B. 上皮性肿瘤
 - C. 性索间质肿瘤
 - D. 转移性癌
 - E. 生殖细胞肿瘤
9. 小儿麻疹最常见的并发症是
- A. 心肌炎
 - B. 脑炎
 - C. 肺炎
 - D. 喉炎
 - E. 结膜炎
10. 最能提示新生儿颅内压升高的表现是
- A. 前卤饱满，头颅增大
 - B. 恶心呕吐
 - C. 哭闹
 - D. 发热
 - E. 惊厥
11. 苯丙酮尿症患儿需定期监测
- A. 血酪氨酸
 - B. 尿有机酸
 - C. 血苯丙氨酸
 - D. 尿蝶呤
 - E. 尿三氯化铁
12. 心脏性猝死最常见的病因是
- A. 主动脉瓣狭窄或关闭不全
 - B. 长 Q-T 间期综合征
 - C. 冠心病
 - D. 二尖瓣脱垂
 - E. 心肌病
13. 评估患者营养状况指标不包括
- A. 前白蛋白
 - B. 外周血淋巴细胞计数
 - C. 血清转铁蛋白
 - D. 血小板计数
 - E. 血浆白蛋白
14. 消化性溃疡穿孔最容易发生部位是
- A. 胃底部
 - B. 胃大弯

- C.胃小弯
D.十二指肠球部前壁
E.十二指肠球部后壁
- 15.药物产生副作用主要是由于
- A.药物浓度低
B.药物对机体的选择性低
C.药物对机体的敏感性高
D.药物对机体的作用低
E.药物浓度高
- 16.子宫颈癌的发生与下列哪项因素有关
- A.HSV-1
B.HSV-2
C.CMN
D.HPV6、HPV11
E.HPV16、HPV18
- 17.小儿生理性贫血表现最明显的阶段是
- A.生后 2~3 天
B.生后 3~4 天
C.生后 2~3 个月
D.生后 3~4 个月
E.小于 6 个月
- 18.胎儿纵轴与母体纵轴间的关系称为
- A.胎产式
B.胎先露
C.胎方位
D.横产式
E.胎势
- 19.新生儿散发性、先天性甲状腺功能减退的表现
- A.贫血
B.腹泻
C.黄疸消退，又快速恢复
D.发热
E.面色苍白
- 20.胎儿先露的部位的指示点与母体骨盆的关系是
- A.胎方位
B.胎产式
C.胎先露
D.骨盆轴
E.胎姿势
- 21.心包积液的心影形态是
- A.普大心
B.烧瓶心
C.靴形心
D.梨形心

- E.主动脉形心
- 22.轻度心衰摄入 Na 的值控制在多少
- A.<1g/d
 - B.2~3g/d
 - C.6~8g/d
 - D.10~15g/d
 - E.4~5g/d
- 23.心源性猝死最常见的心脏病是
- A.冠心病
 - B.主动脉瓣狭窄
 - C.主动脉瓣关闭不全
 - D.二尖瓣脱垂
 - E.长 QT 延长
- 24.急性心肌梗死的主要死因是
- A.心律失常
 - B.心衰
 - C.心源性休克
 - D.室壁瘤
 - E.心脏破裂
- 25.最适合洋地黄使用的情况是
- A.二尖瓣狭窄+肺动脉高压
 - B.顽固性心绞痛
 - C.肥厚型心肌病
 - D.缩窄性心包炎+心肌炎 + 中心静脉压
 - E.扩张型心肌病 + 心衰
- 26.抑郁症急性发病期，抗抑郁剂的治疗时间最少是多少
- A.24 周
 - B.6 周
 - C.48 周
 - D.2 周
 - E.60 周
- 27.骨盆漏斗，韧带内走形的组织结构
- A.输卵管
 - B.中肾管遗迹
 - C.输尿管
 - D.卵巢动静脉
 - E.子宫动静脉
- 28.主动脉狭窄的三联征
- A.呼吸困难，水肿，心绞痛
 - B.呼吸困难，咯血，心绞痛
 - C.心绞痛，晕厥，水肿
 - D.水肿，咯血，晕厥
 - E.呼吸困难，晕厥，心绞痛
- 29.不需要初种和复种的计划免疫疫苗 A.灰质炎疫苗

- B.卡介苗
C.乙肝
D.流脑
E.乙脑
- 30.心脏骤停最常见的发生原因
A.无脉性电活动
B.心室颤动和室性心动过速
C.心搏骤停
D.缓慢性心律失常
E.终末期心力衰竭
- 31.关于激素合成，以下叙述错误的是
A.垂体通过分泌促激素来控制内分泌靶腺激素的产生
B.大多数激素基于机体需要即刻产生
C.甲状腺激素的储备很少
D.部分激素分泌具有昼夜节律性
E.生化信号参与激素合成
- 32.死亡率最高儿童年龄分期是
A.新生儿期
B.学龄期
C.幼儿期
D.婴儿期
E.学龄前期
- 33.关于羊水引起肺栓塞下列选项错误的是
A.易引起 DIC
B.栓子有羊水结构
C.左心衰
D.右心衰
E.Ⅱ型变态反应
- 34.严重肾功能不全的患者有高血压时，宜使用哪种降压药
A.ACEL(依那普利)
B.ARB(沙坦)
C.CCB(硝苯地平)
D.美托洛尔
E.呋塞米
- 35.感染破伤风时，最晚累及的肌肉是
A.四肢肌
B.腹肌
C.膈肌
D.面部表情肌
E.咀嚼肌
- 36.新生儿甲低最早出现的症状是
A.腹泻
B.贫血

C.生理性黄疸消退延迟

D.心率正常

E.体温低

37.女孩，4岁，自幼体弱，易患呼吸道感染。查体：心前区稍隆起，无震颤，胸骨左缘第2肋间闻及3/6级收缩期杂音，P2亢进，固定分裂。最可能的诊断是

A.动脉导管未闭

B.风湿性心脏病

C.室间隔缺损

D.法洛四联症

E.房间隔缺损

38.患者27岁，孕1产1，分娩7天后出现发热、腹痛，妊娠期体检发现子宫肌瘤，出现此症状的原因是

A.产褥感染

B.子宫肌瘤红色样变

C.子宫肌瘤玻璃样变

D.宫颈炎症

E.子宫内膜异位

39.女性，30岁，高血压三年，与别人吵架后剧烈头痛1天，查体：鼻唇沟变浅，右双下肢肌力三级，CT示：左基底节高密度影，考虑诊断是下面哪个

A.短暂性缺血性发作

B.蛛网膜下腔出血

C.脑血栓

D.脑出血

E.脑血栓形成

40.女，40岁，有胆结石病史8年。1天前出现左上腹剧烈疼痛，向腰背部放射，伴恶心、呕吐，但无发热，无血尿，无黄疸。为明确诊断，首选的实验室检查是

A.大便常规和潜血试验

B.血清转氨酶

C.血清淀粉酶检查

D.尿常规

E.上消化道钡餐透视

41.1岁男婴，腹泻伴呕吐5天，大便呈蛋花汤样，每日10余次，查体：嗜睡，前门、眼窝极度凹陷，哭时无泪，皮肤可见花纹。血钠140mmol/L。患儿腹泻脱水性质为

A.重度低渗性脱水

B.中度等渗性脱水

C.中度低渗性脱水

D.重度等渗性脱水

E.低度等渗性脱水

42.产妇24岁，孕37周+1，羊水正常S+1，胎位LOA，Apgar评分4分，胎心率136次/分，产妇有支气管哮喘病史，曾诊断2型糖尿病，血糖控制良好，对于该产妇，接下来的处理是

A.肌注哌替啶

B.继续观察，等待妊娠

C.人工破膜

D.手术剖宫产

E.肌注地西洋

43.男 60 岁左侧腰部肿胀，伴间歇性无痛性肉眼血尿 3 月余，IVU 可见左肾中盏充盈不全。首先考虑的是

- A.肾盂癌
- B.肾盂肾炎
- C.肾黄色肉芽肿
- D.肾盏结石
- E.肾结核

44.某幼儿园大班 11 名 6 岁儿童接受百白破疫苗注射后，其抗体滴度分别是 1:201:20, 1:20, 1:40, 1:40, 1:80, 1:80, 1:160, 1:160, 1:320, 1:640。描述其抗体滴度的集中趋势的指标应选用

- A.标准差
- B.极差
- C.算术平均数
- D.几何平均数
- E.四分位间距

45.女，40 岁。1 小时前服敌百虫 200ml,查体:躁动，瞳孔缩小，四肢强直、肺部可闻及湿罗音。下列处理措施不恰当的是

- A.药物导泻
- B.2%碳酸氢钠溶液洗胃
- C.应用解磷定
- D.静脉应用阿托品
- E.清洗呕吐物污染的皮肤

46.患者女，26 岁。头部撞伤疼痛 15 小时。神志清，眼睑青紫，眼结膜下出血嗅觉丧失，有淡红色液体从鼻腔流出。最可能的诊断是

- A.眼外伤
- B.颅前窝骨折
- C.颅中窝骨折
- D.颅后窝骨折
- E.面部软组织损伤

47.女性 65 岁，干咳，低热，盗汗半月，今突然咯血就诊，左肺可闻及湿罗音，首选考虑诊断

- A.肺炎链球菌肺炎
- B.肺结核
- C.支气管扩张
- D.肺脓肿
- E.肺癌

48.男，70 岁。右腹股沟区肿块 3 年，平卧消失，查体右耻骨结节外上方有一半球形肿块，未进入阴囊，可用手回纳，压住腹股沟韧带中点上方咳嗽时仍可见肿块突出。最可能的诊断是

- A.股疝
- B.精索鞘膜积液
- C.腹股沟直疝
- D.腹股沟斜疝

E.交通性鞘膜积液

49.男,60岁。右半结肠切除术后2天,便陈旧性血块100ml,中心静脉压5mmHg, BP90/60mmHg,有心衰史恰当的治疗为

- A.床旁心电图
- B.强心药
- C.补液实验
- D.腹部CT
- E.大量补液

50.女,65岁。左膝关节严重疼痛,步行距离少于500米,查体:左膝关节屈曲挛缩形,活动受限,负重位膝关节正位X线片显示左膝内侧关节间隙消失,骨质硬化边缘骨赘增生。最可能的诊断是

- A.骨关节炎
- B.痛风关节炎
- C.化脓性关节炎
- D.骨关节结核
- E.风湿性关节炎

51.患者,女,26岁。多个性伴侣,6天前发生性关系。自觉尿频、尿痛2天就诊,阴道检查见尿道口有大量脓性分泌物。此时考虑诊断为

- A.梅毒
- B.生殖器疱疹
- C.淋病
- D.天疱疮
- E.艾滋病

52.三岁小儿,查体发现心脏杂音,平日喜双腿下蹲,查体:胸骨第2、3肋间可闻及响亮粗糙的收缩期杂音,X线示:右室肥大,肺动脉凹陷,诊断考虑为

- A.法洛四联症
- B.房间隔缺损
- C.室间隔缺损
- D.肺动脉狭窄
- E.动脉导管未闭

53.男,60岁。直肠癌切除术后4天。晨起时突发左下肢肿胀,左腿皮温增高,股三角区有深压痛。最可能的诊断

- A.下肢血性浅静脉炎
- B.动脉栓塞
- C.深静脉血栓形成
- D.大隐静脉曲张
- E.淋巴水肿

54.男,60岁。近期出现尿频、排尿等待尿流变细等症状。首选的检查是

- A.膀胱镜
- B.CT
- C.直肠指诊
- D.B超
- E.尿流率

55.患者,女,32岁。尿频、尿急、尿痛进行性加重半年,抗生素治疗不见好转,且伴有右

侧腰部胀痛及午后潮热。对诊断具有决定性意义的尿液检查是

- A.尿相差显微镜检
- B.尿蛋白定量
- C.尿普通细菌培养
- D.尿沉渣找抗酸杆菌
- E.尿细胞学检查

56.男, 60 岁, 进食梗噎, 烧灼感 2 个月食管钡餐造影检查见:食管下段黏膜紊乱断裂, 管壁僵硬, 应该考虑

- A.食管炎
- B.食管癌
- C.贲门失弛缓症
- D.食管静脉曲张
- E.食管平滑肌瘤

57.女, 阴道分泌物多, 外阴瘙痒 2 个月口服抗生素 10 天之前因上呼吸道感染, 最可能是哪种致病菌

- A.滴虫性阴道炎
- B.细菌性阴道炎
- C.外阴假丝酵母菌
- D.萎缩性阴道炎
- E.非特异性外阴炎

58.患儿, 5 岁, 烫伤, 双下肢加臀部大小不一水泡, 剧烈疼痛, 心率 120 次/分, 呼吸 20 次/分, 烫伤程度面积为

- A.浅 II 度 46%
- B.III 度 46%
- C.深 II 度 41%
- D.深 II 度 46%
- E.浅 II 度 41%

59.男, 72 岁, 意识模糊伴剧烈呕吐 3 小时, 高血压病史 10 余年, 急诊头颅 CT 提示:左侧基底节区血肿。该患者脑出血的具体出血部位是

- A.大脑后动脉
- B.大脑中动脉
- C.大脑前动脉
- D.颈内动脉
- E.豆纹动脉

60.男性, 22 岁, 臀区痛 1 年, 活动后好转, 夜疼醒, 晨僵, 实验室: ESR30mm/h, CRP18mg/L, HLA-B27(+).骶髂关节 CT 示双侧髂关节面虫蚀样。首选治疗为

- A.非甾体抗炎药
- B.糖皮质激素
- C.甲氨蝶呤
- D.肿瘤坏死因子拮抗剂
- E.来氟米特

61.初产妇, 35 岁, 孕 39 周, 宫口开全 1 小时, 宫缩间隔 1-2 分钟, 用力屏气未见胎头拨露, 阴道检:胎头 S₊+2, 矢状线与骨盆前后位一致, 无头颅重叠及产瘤, 大囟在骨后方, 最可能的诊断是

- A.胎头高直前位
- B.前不均倾位
- C.持续性枕后位
- D.活跃期停滞
- E.第二产程延长

62.为了解某社区糖尿病的患病率，调查前将该社区分为经济条件好、经济条件中经济条件差3条街，随机抽取1/10的人进行调查的抽样方法属于

- A.随机抽取法
- B.分层抽样法
- C.实验研究法
- D.队列研究法
- E.对照研究法

63.男，34岁，有静脉吸毒史，血常规WBC、血小板下降，cd4300，可触及肿大的淋巴结，最可能是什么病

- A.淋巴结核
- B.坏死性淋巴炎
- C.淋巴瘤
- D.梅毒
- E.艾滋病

64.男，18岁，右上腹疼痛，伴发热，体温39.5℃，呼吸急促，血压85/65mmHg，查体：皮肤湿冷，右上腹有明显的压痛反跳痛。首选的治疗措施是

- A.急诊手术
- B.抗生素治疗
- C.补血容量
- D.胃肠减压
- E.继续观察

65.一个女孩子，强迫自己问别人一些不能理解的问题(人为什么有两只手，没有三只手鸟为什么会飞)，感到很烦恼，该患者应该用什么药控制

- A.碳酸锂
- B.氟西汀
- C.苯妥英钠
- D.奥氮平
- E.丙戊酸钠

66.患儿，女，2岁，发热、咽喉疼痛3天查聘咽弓、软聘及聘垂黏膜可体:咽部充血，见灰白色疱疹，周围伴红晕。患儿感染的病原体可能是

- A.流感病毒
- B.呼吸道合胞病毒
- C.柯萨奇病毒
- D.腺病毒
- E.支原体

67.女，27岁，孕37周，突发下腹疼痛拒按腹，既往子宫肌瘤剔除史，考虑诊断

- A.先兆子宫破裂
- B.子宫破裂
- C.胎盘早剥

D.异位妊娠

E.子宫内膜异位症

68.男, 50 岁。持续胸痛 8 小时, 喘憋 2 小时入院。心电图示 1、AVL、V1~V6 导联 ST 段抬高 0.1~0.4mV。既往高血压病史 10 余年, 药物控制满意。改善患者预后的药物不包括

A.阿司匹林

B.美托洛尔

C.硝酸异山梨酯

D.利他普利

E.请等待更新

69.男, 65 岁, 近 2 到 3 年自觉反应慢, 饮食和运动较前无明显变化, 但每年体重上涨 2kg, 高血压 10 年, 冠心病 3 年, 规范二级预防治疗, 查体:T36.1° C, P52 次/分 R18 次/分, BP100/70mmHg, 甲状腺肿大, 质韧, FT3 下降 FT4 下降, TSH 上升患者在进行甲状腺治疗时要先评估的是

A.血脂状况

B.肝功能

C.肾功能

D.肺功能

E.心功能

70.新生儿, 出生后 Apgar 评分 1 分钟, 5 分钟 10 分钟, 分别为 2, 5, 7。12 小时后出现吸吮、咂嘴等自主运动, 考虑是以下哪种情况

A.低血糖

B.新生儿缺氧缺血性脑病

C.脑出血

D.先天性脑发育不全

E.请等待更新

71.女, 46 岁, 受伤后检查未见异常, 颅内流血, 诊断

A.颅前窝骨折

B.颅中窝骨折

C.颅后窝骨折

D.额骨骨折

E.鼻骨骨折

72.男, 31 岁, 无痛性肉眼血尿 4 年, 上呼吸道感染后出现, 无水肿及高血压, 血尿原因

A.尿路结石

B.尿路感染

C.慢性膀胱炎

D.前列腺炎

E.肾病综合征

73.小儿最常见的染色体疾病

A.13-染色体疾病

B.21-染色体疾病

C.18-染色体疾病

D.5p-染色体疾病

E. Turner 疾病

74.患者, 男, 68 岁, 直肠癌术后 3 天, 术顺, 白天昏睡, 或被唤醒后又很快入睡晚上惊恐

不安，言语凌乱，难以理解，双腿跨车状，双上肢胡乱挥舞，患者突出的临床症状是

- A.昏睡状态
- B.幻觉状态
- C.谵妄状态
- D.应激状态
- E.妄想状态

75.女婴，发热咳嗽咳痰，低热，其母亲有浸润性肺结核病史，现出现昏迷，首选检查

- A.血常规
- B.尿常规
- C.痰液找抗酸杆菌
- D.脑脊液检查
- E.请等待更新

76.小儿 8 个月突然抽搐持续 2 分钟，发作时意识不清，自行缓解。不伴发热 3 天内抽搐 4 次。醒后活泼如常，枕部颅骨有乒乓球感可见枕秃

- A.蛋白质-能量营养不良
- B.维生素 D 缺乏性佝偻病
- C.癫痫
- D.维生素 D 缺乏性手足抽搐症
- E.婴儿痉挛症

77.男性，30 岁，1 年前下岗。近 5 个月来觉得邻居都在议论他，常不怀好意地盯着他，有时对着窗外大骂，自语自笑，整天闭门不出，拨 110 电话要求保护。该病人不存在

- A.幻听
- B.关系妄想
- C.被害妄想
- D.情绪低落
- E.行为退缩

78.27 岁，男性，有南方旅游史，曾下水游玩，粪便培养可见虫卵，该疾病的传播方式是

- A.呼吸道传播
- B.消化道传播
- C.接触传播
- D.虫媒传播
- E.性接触传播

79.男，25 岁。右胫前红肿 2 天，畏寒、发热 1 天。局部表皮发红，微隆起，指压稍褪色边界清，右腹股沟淋巴结肿痛，考虑诊断为

- A.丹毒
- B.蜂窝组织炎
- C.疖
- D.疔
- E.气性坏疽

80.男，22 岁。双下肢(包括足)及臀部烧伤有水疱，表面红润，明显疼痛，估计烧伤深度和面积。正确的是

- A.深 2°46%
- B.浅 2°41%
- C.浅 2°46%

D.浅 1°41%

E.深 2°41%

81.男性, 32岁, 4小时前跌伤后昏迷5分钟清醒后步行回家。1小时因剧烈疼痛呕吐3次来诊。查体:昏迷, P64次/分 BP180/90mmHg, R18次/分, 头颅CT提示颅内双凸形高密度影。诊断应考虑为

A.急性硬膜外血肿

B.急性硬膜下血肿

C.脑挫伤

D.脑震荡

E.急性脑内血肿

82.老年女性患者, 65岁, 因不慎摔倒致股骨颈骨折, 外旋50°, 适合该患者的治疗方法为

A.关节置换术

B.行内固定术

C.手法复位

D.石膏外固定

E.骨牵引术

83.患者女, 34岁, 既往月经不调, 月经周期1-3月, 胚胎移植术后停经45天, HCG阳性, 如何判断孕周

A.B超

B.胚胎移植时间

C.HCG值

D.雌激素变化

E.自身体温变化

84.男, 60岁。右半结肠切除术后2天, 便陈旧性血块100m, 中心静脉压50mmHg, BP90/60mmHg, 有心衰史, 恰当的治疗为

A.用扩血管药

B.补液

C.用强心药

D.补液试验

E.腹部CT

85.女, 20岁, 足癣多年, 近1周发热, 右小腿出现片状红斑, 腹股沟淋巴结肿大疼痛最可能的致病菌是

A.乙型溶血性链球菌

B.铜绿假单胞菌

C.梭状芽孢杆菌

D.金黄色葡萄球菌

E.表皮葡萄球菌

86.男, 60岁, 左侧腰部肿胀, 伴间歇性无痛性肉眼血尿3月余, IVU可见左肾中盖充盈不全。首先考虑的是

A.肾盂癌

B.肾盂肾炎

C.肾黄色肉芽肿

D.肾盏结石

E.肾结核

87.女性, 33 岁, 有不洁性交史, 近半月来有黄色液体流出, 宫颈充血, 考虑

- A.淋病
- B.艾滋病
- C.尖锐湿疣
- D.梅毒
- F. 子宫颈抱疹

88.女, 35 岁, 半年前母亲突然病故。此后失眠, 情绪低沉, 不愿与人交往。近 3 个月来独处时常听见有声音对她讲话, 说母亲病故与某人有关, 故多次给公安机关写信反映母亲被害之事, 后来又感到自己的思维、情感不由自己支配, 自己的想法还未说出已人人皆知, 常独自哭泣。神经系统检查未见异常, 有慢性肝炎病史 3 年, 目前肝功能 ALT80U/L。该患者没有出现的症状是

- A.被害妄想
- B.强制性思维
- C.情感低落
- D.思维被洞悉妄想
- E.言语性幻听

89.患者, 女, 10 个月, 发热, 伴间断呕吐 10 天。体检:精神可, 较兴奋, 方颅。脑脊液:外观毛玻璃样, 白细胞 $30 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 $0.60 \times 10/L$, 清蛋白 $0.43g/L$ 氯化物 $108mmol/L$, 糖 $2.5mmol/L$ 。可能的诊断是

- A.化性脑膜炎
- B.结核性脑膜炎
- C.病毒性脑炎
- D.流行性脑炎
- E.感染中毒性脑病

90.患者男, 63 岁。因剧烈胸痛 3 小时入院治疗。心电图示窦性心律, 心率 54 次/分钟 II、III、aVF 导联 ST 段抬高 $0.3mV$, 其余导联 ST 段正常。介入治疗前植入临时起搏器起搏心室, 以 60 次/分钟频率起搏时, 监测动脉血压由 $100/70mmHg$ 降低至 $85/60mmHg$ 。导致上述血压变化的最可能原因是

- A.起搏心律时外周血管阻力降低致血压下降
- B.合并右心室梗死, 右心室排血量减少致左心室充盈减少
- C.起搏心律时心率增快舒张期缩短导致回心血量减少
- D.起搏心律时, 心肌收缩力较弱致心排血量降低
- E.起搏心律时失去心房收缩对心室的充盈作用, 左心室充盈减少

91.初产妇, 37 周, 临产 2 小时后突发剧烈疼痛, 烦躁不安, 拒按, 导尿淡红色血性液体, 胎心 $100 \sim 124$ 次/分, 目前诊断考虑

- A.先兆子宫破裂
- B.子宫破裂
- C.前置胎盘
- D.胎盘早剥
- E.先兆临产

92.男, 40 岁, 咳嗽、咳痰半年, 加重 1 周无发热、盗汗、消瘦。查体:浅表淋巴结未触及, 右上肺散在湿罗音。为明确诊断, 应首选的检查是

- A.胸部 X 线片
- B.肺功能

- C.痰培养+药敏
- D.动脉血气分析
- E.痰涂片找抗酸杆菌

93.男, 20 岁, 龟头无痛性溃疡, 1~3 周前有不洁性行为, 查体:龟头可见直径 1cm 的圆形浅表溃疡, 触之觉硬, 不能杀灭该病原体的是

- A.干燥
- B.煮沸
- C.阳光
- D.消毒剂
- E.低温

94.患儿, 发热、咳嗽 5 天, 伴畏光、流泪, 1 天前患儿耳后、发际出现红色斑丘疹, 疹间可见正常皮肤, 不伴痒感, 渐蔓延至躯干四肢。本病最常见的并发症是

- A.心肌炎
- B.喉炎
- C.肺炎
- D.请等待更新
- E.请等待更新

95.女, 27 岁, G1P1, 顺产 2 周突发下肢痛伴发热 1 天, 无咳嗽, 咳痰, 乳房胀痛血 WRC $12 \times 10^9/L$, N0.91, 血常规正常最容易发生的并发症是

- A.子宫肌瘤囊性变
- B.妊娠合并阑尾炎
- C.子宫肌瘤蒂扭转
- D.子宫肌瘤红色样变
- E.产褥感染

96.男, 60 岁, 活动时气短 2 年, 既往高血压 15 年, 糖尿病 5 年, 超声心动图左心室扩大, 左室射血分数 40%, 改善预后

- A.氢氯噻嗪
- B.依那普利
- C.呋塞米
- D.硝苯地平
- E.单硝酸异山梨酯

97.男, 67 岁, 渐进性记忆力减退 4 年余生活不能完全自理, 出门不能找到回家的路, 既往体健, 查体无特殊, 可能的诊断的是

- A.心因性痴呆
- B.适应障碍
- C.轻度认知障碍
- D.帕金森病性痴呆
- E.阿尔茨海默病

98.男, 56 岁, 持续性胸痛 15 小时, 呼吸闲难 3 小时, 查体:血压 90/60mmHg, 心率 120 次/分, 心律齐, 心电图示 $V_1 \sim V_6$ 呈 QS 段, 患者最可能出现的特异性体征是

- A.下肢水肿
- B.第一心音亢进
- C.颈静脉怒张
- D.心尖部舒张杂音

E.舒张期奔马律

99.小儿呕吐不止，腹泻，10次/天，排稀水样黄色便，上医院给予治疗，首选的补液治疗是

A.2:1等张溶液

B.口服生理盐水

C.静脉注射0.9%氯化钠溶液

D.2:3:2钠溶液

E.1:3:5钠溶液

100.男，24岁，一小时前工作中右小腿被机器割伤，伤口无活动性出血，右小腿及右足血运正常，右侧足背前内侧感觉障碍，最可能损伤的神经是

A.股神经

B.胫神经

C.腓肠神经

D.腓总神经

E.隐神经

101.女，28岁，阴道分泌物增多3月。查体:阴道内稀薄白带。阴道pH值为5，阴道分泌物线索细胞阳性，患者首选的治疗药物是

A.甲硝唑

B.链霉素

C.红霉素

D.青霉素

E.左氧氟沙星

102.男，30岁，右小腿贯穿性枪伤，X线检查未发现骨折及异物残留，正确的处理是

A.清创，切除伤口周围皮肤3mm，缝合伤口;

B.清创，充分引流，包扎伤口，直至愈合;

C.清创，缝合伤口

D.切开弹道全程，清创，缝合伤口

E.清创，开放引流3~5天，延期缝合伤口

103.女性，79岁，膝关节疼痛，活动后加重，休息后减轻，冬天或潮湿时加重查体:膝关节内翻，WBC $1.2 \times 10^9/L$ ，RF(-)。该病可能为

A.疼痛性关节炎

B.骨关节炎

C.损伤性关节炎

D.创伤性关节炎

E.类风湿关节炎

104.女性，79岁，膝关节疼痛，活动后加重，休息后减轻，冬天或潮湿时加重查体:膝关节内翻，WBC $1.2 \times 10^9/L$ ，RF(-)。首选的检查是

A.高分辨ct

B.x线片

C.b超

D.MRI平扫

E.MRI增强

105.男性，63岁，天，加重六小时，既往高血压五年，查体:体温 $37.2^{\circ}C$ ，呼吸20次/分，血压90/55mmHg，口唇无发绀，双肺闻及少量湿罗音，心率56次/分，心律齐，无杂音，腹软，无压痛，肝脾肋下未触及。心电图:窦性心律II、III、aVF，V3R，V5R导联st弓背向上

抬高。为明确确诊最有价值的实验室检查

- A.血淀粉酶
- B.血常规
- C.血沉
- D.血肌钙蛋白
- E.D-二聚体

106.男性, 63岁, 发作性剑突下疼痛+天, 加重六小时, 既往高血压五年, 查体:体温 37.2°C, 呼吸 20 次/分, 血压 90/55mmHg, 口唇无发绀, 双肺闻及少量湿罗音, 心率 56 次/分, 心律齐, 无杂音, 腹软, 无压痛, 肝脾肋下未触及。心电图:窦性心律 II、II, aVF, V3R, V5R 导联 st 弓背向上抬高。最可能的疾病是

- A.急性胰腺炎
- B.急性肺气肿
- C.急性心肌梗死
- D.急性肺血栓栓塞
- E.急性心包炎

107.男性, 19岁, 出现皮肤紫癜 2 日, 下肢水肿, 尿蛋白(++), 皮肤表面红斑, 伴关节和腹痛。首选的检查是

- A.束臂试验
- B.Coombs 实验
- C.骨髓像检查
- D.胸部 X 线检查
- E.尿常规

108.男性, 19岁, 出现皮肤紫癜 2 日, 下肢水肿, 尿蛋白(++), 皮肤表面红斑, 伴关节和腹痛。首选的治疗是

- A.糖皮质激素
- B.免疫抑制剂
- C.阿托品
- D.抗凝剂
- E.抗生素

109.女, 20岁。2 年以来经常反复思考某个问题, 如:人思考问题多了会不会伤害脑细胞。虽然 知道想问题不会伤脑细胞但却不放心, 仍要 反复思虑, 感觉痛苦近半年来因为怕脏, 出现反复多次, 甚至长时间洗手, 因为浪费时间, 耽误学习和工作, 又难以控制而苦恼, 头颅 CT 检查正常。该患者最可能的诊断是

- A.分离障碍
- B.强迫障碍
- C.广泛性焦虑症
- D.精神分裂症
- E.抑郁症

110.女, 20岁。2 年以来经常反复思考某个问题, 如:人思考问题多了会不会伤害脑细胞。虽然 知道想问题不会伤脑细胞但却不放心, 仍要 反复思虑, 感觉痛苦近半年来因为怕脏, 出现反复多次, 甚至长时间洗手, 因为浪费时间, 耽误学习和工作, 又难以控制而苦恼, 头颅 CT 检查正常。该患者最适合选用的药物是

- A.氟西汀
- B.碳酸锂

- C.奥氮平
- D.请等待更新
- E.请等待更新

111.女, 17岁。皮肤出血点伴月经量过多1个月。查体:四肢和胸部皮肤散在出血点, 浅表淋巴结无肿大

肝脾肋下未触及。血常规:HB105g/L,WBC 6.1×10^9 /L,PLT 7×10^9 /L,骨髓细胞学检查:颗粒型巨细胞在1.5cm \times 2.0cm涂片膜上可见126个, 板型巨核细胞为0个。该患者最可能的诊断是

- A.急性白血病
- B.特发性血小板减少性紫癜
- C.再生障碍性贫血
- D.巨幼细胞贫血
- E.过敏性紫癜

112.女, 17岁。皮肤出血点伴月经量过多1个月。查体:四肢和胸部皮肤散在出血点, 浅表淋巴结无肿大

肝脾肋下未触及。血常规:HB105g/L,WBC 6.1×10^9 /L,PLT 7×10^9 /L,骨髓细胞学检查:颗粒型巨细胞在1.5cm \times 2.0cm涂片膜上可见126个, 板型巨核细胞为0个。首选的治疗是

- A.化疗
- B.输注浓缩血小板
- C.口服糖皮质激素
- D.补充维生素B₁₂、叶酸
- E.口服雄激素

113.男, 68岁,咳嗽、呼吸闲咳痰20年, 难2天, 来院, 查体:静脉怒张, 桶状胸, 双下肢水肿, 患者可能诊断

- A.慢性阻塞性肺疾病急性加重
- B.支气管哮喘
- C.肺癌
- D.支气管扩张
- E.请等待更新

114.男, 68岁,咳嗽、咳痰20年, 呼吸困难2天来院, 查体:颈静脉怒张, 桶状胸双下肢水肿, 患者当前治疗不包括

- A.解痉平喘
- B.氧疗
- C.祛痰止咳
- D.强心利尿
- E.抗感染

115.男, 68岁,咳嗽、咳痰20年, 呼吸困难2天来院, (假设检验)患者呼吸困难加重, PaO₂:78mmHg, PaCO₂:65mmHg, 应给予什么治疗

- A.有创机械通气
- B.无创机械通气
- C.持续性低浓度吸氧
- D.高浓度吸氧
- E.面罩吸氧

116.女性, 50岁, 近来月经不规律, 潮热, 烦躁, 查体:腹部检查未见异常, 妇科检查正常, 双附件未见异常增厚。可能考虑诊断

- A.绝经综合征
- B.老年性阴道炎
- C.细菌性阴道炎
- D.子宫内膜癌
- E.子宫内膜炎

117.女性, 50岁, 近来月经不规律, 潮热, 烦躁, 查体:腹部检查未见异常, 妇科检查正常, 双附件未见异常增厚。首选检查

- A.腹部 B 超
- B.阴道分泌物刮片
- C.性激素
- D.宫腔镜
- E.HCG

118.女性, 50岁, 近来月经不规律, 潮热, 烦躁, 查体:腹部检查未见异常, 妇科检查正常, 双附件未见异常增厚。若该患者在行激素治疗后, 出现月经淋漓不尽, 且分段诊刮发现子宫内膜异常增厚 0.3mm, 应与何疾病进行鉴别

- A.子宫内膜炎
- B.子宫内膜癌
- C.子宫腺肌症
- D.葡萄胎
- E.子宫肌瘤

119.患儿 7 岁, 下肢水肿, 血压 140/98mm/Hg, 高胆固醇血症, 蛋白尿(++), 尿 wbc-, 红细胞+。该患儿诊断

- A.微小肾病变
- B.急性肾小球肾炎
- C.单纯性肾病
- D.肾炎性肾病
- E.继发性肾病

120.患儿 7 岁, 下肢水肿, 血压 140/98mm/Hg, 高胆固醇血症, 蛋白尿(++), 尿 wbc-, 红细胞 +。最合理的治疗

- A.糖皮质激素
- B.利尿剂
- C.补钙
- D.他汀类
- E.低分子右旋糖酐

121.女性, 吃饭时突发右侧筷子脱落, 呼之不应, 瘫倒在地, 右侧肢体不能动, 肌张力?级, 既往有风湿性心瓣膜病, 诊断为

- A.脑血栓形成
- B.脑栓塞
- C.TIA
- D.蛛网膜下腔出血
- E.请等待更新

122.女性, 吃饭时突发右侧筷子脱落, 呼之不应, 瘫倒在地, 右侧肢体不能动, 肌张力?级, 既往有风湿性心瓣膜病, 最有意义的检查

- A.脑电图

- B.肌电图
C.头部 CT
D.请等待更新
E.请等待更新
- 123.肝硬化大量腹水患者长期使用呋塞米利尿可出现
A.代谢性酸中毒
B.代谢性碱中毒
C.呼吸性酸中毒
D.呼吸性碱中毒
E.代谢性酸中毒合并呼吸性酸中毒
- 124.肠痿患者可出现
A.代谢性酸中毒
B.代谢性碱中毒
C.呼吸性酸中毒
D.呼吸性碱中毒
E.代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒
- 125.属于脊柱型关节炎的是
A.骨关节炎
B.类风湿性关节炎
C.成人 still 病
D.痛风型关节炎
E.银屑病型关节炎
- 126.属于退行性关节炎是
A.骨关节炎
B.类风湿性关节炎
C.成人 still 病
D.痛风型关节炎
E.银屑病型关节炎
- 127.婴儿出生后各系统、器官的生长发育不平衡，呈先快后慢的是
A.神经系统
B.淋巴系统
C.生殖系统
D.呼吸系统
E.体格
- 128.小儿生长发育速度呈快、慢、快的是
A.神经系统
B.淋巴系统
C.生殖系统
D.呼吸系统
E.体格
- 129.高渗高血糖综合征选用药物是
A.口服药物
B.胰岛素皮下注射
C.胰岛素静脉滴注

D.口服降糖药+胰岛素皮下注射

E.单纯饮食+运动控制

130.妊娠合并 2 型糖尿病选用

A.口服药物

B.胰岛素皮下注射

C.胰岛素静脉滴注

D.口服降糖药+胰岛素皮下注射

E.单纯饮食+运动控制

131.合并严重肾衰竭的老年收缩期高血压患者的最适宜降压药

ACCB

B.ACEI

C.ARB

D. β 受体阻滞剂

E.噻嗪利尿剂

132.合并窦性心动过速的一级高血压患者最适宜降压药

ACCB

B.ACEI

C.ARB

D. β 受体阻滞剂

E.噻嗪利尿剂

133.按红细胞形态学，急性失血性贫血属于

A.小细胞低色素性贫血

B.小细胞正色素性贫血

C.正细胞低色素性贫血

D.正细胞正色素性贫血

E.大细胞低色素性贫血

134.按红细胞形态学，慢性失血性贫血属于

A.小细胞低色素性贫血

B.小细胞正色素性贫血

C.正细胞低色素性贫血

D.正细胞正色素性贫血

E.大细胞低色素性贫血

135.患者惶恐不安，坐立不安，十分紧张，该症状为

A.情绪高涨

B.易激惹

C.情绪不稳

D.焦虑

E.恐惧

136.患者常因极小的事情而产生较强烈的情绪反应，该症状为

A.河揣.情绪高涨

B.易激惹

C.情绪不稳

D.焦虑

E.恐惧

137.初产妇，25岁，孕37周，重度子痫前期，昨晚突然出现腹痛伴少量阴道出血最可能的诊断是

- A.前置胎盘
- B.胎盘早剥
- C.子宫破裂
- D.先兆子宫破裂
- E.先兆临产

138.初产妇，23岁，临产2小时后突发剧烈腹痛，烦躁不安，下腹拒按，导尿淡红色血性液体，胎心100-124次/分，既往子宫肌瘤切除手术史，最可能的诊断是

- A.前置胎盘
- B.胎盘早剥
- C.子宫破裂
- D.先兆子宫破裂
- E.先兆临产

答案：

- 1-5EABED
- 6-10DAECA
- 11-15CCDDB
- 16-20ECACA
- 21-25BBAAE
- 26-30BDBBB
- 31-35CAEEC
- 36-40EBDC
- 41-45DBADB
- 46-50BBCEA
- 51-55CACCD
- 56-60BCEBA
- 61-65EBEAB
- 66-70CBAAB
- 71-75ABBCD
- 76-80DDCAC
- 81-85AAADA
- 86-90AABBA
- 91-95ACECE
- 96-100BEEBD
- 101-105AEBBD
- 106-110CAABA
- 111-115BCADB
- 116-120ACBBA
- 121-125BCBAE
- 126-130AAECB
- 131-135EBDAD

136-140CBD

141-145

146-150

