

护考知识点口诀技巧汇总

烧伤面积： 三三三，五六七，十三十三二十一，双臀占五会阴一，小腿十三双足七。

小儿运动发育： 二抬四翻六会坐，七滚八爬周会走。

小儿预防接种： 出生乙肝卡介苗，二月脊灰炎正好，三四五月百日破，八月麻疹岁乙脑。

乳腺癌手术后肢体活动： 一(24小时)动手，三(1-3)动肘，功能锻炼朝上走，四天可以动动肩，直到举手高过头。

产后恢复： 产后一日底平脐，十日降至骨盆里，内膜修复需四周，胎盘附着六周毕。

首选青霉素治疗的疾病： 破伤风、猩红热、肺炎球菌感染、梅毒。

致病菌主要为金黄色葡萄球菌感染： 急性脓胸、疖、痈、手部感染，急性肝脓肿、急性乳腺炎、化脓性关节炎、急性血源性骨髓炎等急性感染。

恶性肿瘤的治疗方法： 除白血病、绒毛膜癌、浸润性葡萄胎外，其他均首选手术治疗。皮内注射(ID)进针五度角，做过敏试验须备1%盐水肾上腺素，忌用碘酊消毒，拔针后勿用棉签按压。肌肉注射(IM)：两岁以下婴幼儿不宜进行臀部肌肉注射。

葡萄糖酸钙的应用： 链霉素过敏、输库存血、高血钾引起的心肌抑制、甲状旁腺误切引起抽搐(发作时静注)、VitC缺乏性手足抽搐(镇静同时缓慢推注)、硫酸镁中毒。

碳酸氢钠的作用： 1%-2%的碳酸氢钠可提高沸点，去污防锈;1%-4%可用于口腔真菌感染，2%-4%可用于外阴阴道假丝酵母菌病的阴道冲洗，2%的碳酸氢钠可用于鹅口疮患儿口腔清洗。敌百虫农药中毒禁用碳酸氢钠洗胃(会被氢化成毒性更强的敌敌畏)。

不同浓度乙醇作用： 20%-30%乙醇：急性肺水肿时湿化给氧，从而降低肺泡内泡沫的表面张力;30%乙醇：湿润、松解头发缠结;25%-35%乙醇：乙醇擦浴;50%乙醇：皮肤按摩;75%皮区消毒(70%);95%乙醇燃烧法消毒和静脉炎湿敷等。